

## DM 19 - Déterminant de Cauchy – Cayley-Hamilton – Corrigé

## 1 Déterminant de Cauchy

1. S'il y a deux indices  $i \neq i'$  tels que  $a_i = a_{i'}$ , alors les lignes  $i$  et  $i'$  de  $C$  sont les mêmes, donc  $\Delta_n = 0$ .
2. La fraction rationnelle  $R(X)$  est de degré  $(n-1) - n = -1$ . Son dénominateur est de degré  $n$  et a pour racines  $-a_1, \dots, -a_n$ , toutes simples car les  $a_i$  sont deux à deux distincts. Par le théorème de décomposition en éléments simples, il existe des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  tels que

$$R(X) = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{X + a_k}.$$

3. Soit  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . On multiplie les deux membres de l'égalité précédente par  $X + a_k$ . Alors  $-a_k$  n'est plus un pôle des fractions obtenues ; on évalue en  $-a_k$  et on trouve :

$$\frac{\prod_{i=1}^{n-1} (b_i + a_k)}{\prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} (a_j - a_k)} = \lambda_k.$$

4. Considérons la combinaison linéaire  $\sum_{i=1}^n \lambda_i L_i$ . Son coefficient en colonne  $j$  est  $\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{a_i + b_j} = R(b_j)$ . Par construction des  $\lambda_i$ , on a  $R(b_j) = 0$  si  $j \leq n-1$ .

Considérons maintenant la matrice  $\tilde{C}$  obtenue en multipliant la dernière ligne de  $C$  par  $\lambda_n$ . Par linéarité par rapport à la dernière ligne,  $\det(\tilde{C}) = \lambda_n \Delta_n$ .

De plus, ajouter à la dernière ligne une combinaison linéaire des autres ne modifie pas le déterminant. Donc  $\det(\tilde{C})$  est aussi le déterminant de la matrice :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_{n-1}} & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \frac{1}{a_{n-1} + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1} + b_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1} + b_n} \\ 0 & \cdots & 0 & R(b_n) \end{pmatrix}$$

obtenue en modifiant la dernière ligne de  $\tilde{C}$  (donc  $\lambda_n L_n$ ) par  $\sum_{i=1}^n \lambda_i L_i$ .

Cette matrice est triangulaire par blocs (ou bien on développe selon la dernière ligne/colonne) et donc son déterminant vaut  $R(b_n) \Delta_{n-1}$ .

Donc,  $\lambda_n \Delta_n = R(b_n) \Delta_{n-1}$ .

5. Par hypothèse, tous les scalaires  $a_i + b_j$  sont non nuls. En particulier,  $\lambda_n \neq 0$  et on peut réécrire l'identité précédente sous la forme :

$$\frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} = \frac{R(b_n)}{\lambda_n} = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (a_j - a_n) \prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_j - b_n)}{\prod_{i=1}^{n-1} (b_i + a_n) \prod_{i=1}^n (b_n + a_i)}.$$

Le numérateur peut être réécrit  $\prod_{1 \leq j \leq n-1} (a_j - a_n)(b_j - b_n)$ . Le dénominateur est le produit des termes  $a_i + b_j$ , avec l'un des indices  $i$  ou  $j$  égal à  $n$ .

De plus,  $\Delta_n = \prod_{k=1}^n \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$ , avec par convention  $\Delta_0 = 1$  (déterminant de la matrice de taille 0). Avec un peu de réflexion, on conjecture que le produit télescopique donne la formule suivante :

$$\Delta_n = \frac{\prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}.$$

Si on n'est pas tout à fait convaincu, on peut montrer la formule par récurrence. On trouve bien  $\Delta_1 = \frac{1}{a_1 + b_1}$  (le produit du haut est vide) et il s'agit alors de vérifier que, si  $T_n$  est l'expression de droite, alors  $\frac{T_n}{T_{n-1}}$  donne bien l'expression trouvée pour  $\frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}$ , ce qui ne pose pas de difficultés.

Remarque : on constate immédiatement que le déterminant est nul ssi deux  $a_i$  ou deux  $b_i$  sont égaux. Seule une implication était évidente (comme pour la matrice de Vandermonde).

## 2 Théorème de Cayley-Hamilton

### 2.1 Matrice compagne

1. Une simple lecture matricielle nous apprend que  $C_P e_j = e_{j+1}$  si  $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$  et que  $C_P e_n = -\sum_{i=1}^n a_{i-1} e_i$ . On en déduit (récurrence immédiate) que :  $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, C_P^k e_1 = e_{k+1}$  et que  $C_P^n e_1 = C_P e_n = -\sum_{i=1}^n a_{i-1} e_i$ .

2. On calcule :

$$P(C_P) e_1 = \sum_{k=0}^{n-1} a_k C_P^k e_1 + C_P^n e_1 = \sum_{k=0}^{n-1} a_k e_{k+1} - \sum_{i=1}^n a_{i-1} e_i = 0.$$

3. Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , les matrices  $C_P^k$  et  $P(C_P)$  commutent. Donc, si  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$P(C_P) e_k = P(C_P) C_P^{k-1} e_1 = C_P^{k-1} P(C_P) e_1 = 0.$$

Comme  $P(C_P)$  s'annule sur tous les vecteurs de la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ ,  $P(C_P) = 0$ .

4.  $P$  est un polynôme unitaire de degré  $n$ , qui annule  $C_P$ . Pour montrer que c'est le polynôme minimal de  $C_P$ , il suffit de montrer qu'aucun polynôme non nul de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$  n'annule  $C_P$ .

Soit  $Q = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$  un polynôme de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ .

On a  $Q(C_P)e_1 = \sum_{k=0}^{n-1} a_k e^{k+1}$  d'après les questions précédentes. Par liberté de la famille  $(e_1, \dots, e_n)$ , ce vecteur est nul ssi tous les  $a_k$  sont nuls. Donc, le seul polynôme de degré  $\leq n-1$  annulant  $C_P$  est le polynôme nul.

Donc,  $P$  est le polynôme minimal de  $C_P$ .

## 2.2 Polynôme caractéristique

5. Tous les  $p_{i,j}$  sont des polynômes. Comme  $\chi_A$  est une combinaison linéaire de produits de  $p_{i,j}$  c'est aussi un polynôme.

De plus, les  $p_{i,j}$  sont de degré 1 ou 0 : 1 exactement quand  $i = j$ . On en déduit d'une part que chaque produit  $p_{\sigma(1),1} \dots p_{\sigma(n),n}$  est de degré au plus  $n$ , et qu'il est de degré  $n$  exactement quand  $\sigma = \text{id}_{[1,n]}$ .

Ceci montre que  $\chi_A$  est de degré  $n$  et que son coefficient dominant est le même que celui de  $\varepsilon(\text{id})p_{1,1} \dots p_{n,n}$ , c'est-à-dire 1.

6. Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) = 0 &\iff \det(\lambda I_n - A) = 0 \\ &\iff \lambda I_n - A \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \text{Ker}(\lambda I_n - A) \neq \{0\} \\ &\iff \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) - \{0\} : (\lambda I_n - A)X = 0 \\ &\iff \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) - \{0\} : AX = \lambda X \\ &\iff \lambda \text{ est valeur propre de } A. \end{aligned}$$

7. Si  $\chi_A$  est scindé à racines simples,  $A$  a  $n$  valeurs propres distinctes  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . On considère  $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{K}^n$  des vecteurs propres correspondants. On a alors montré dans le cours que la famille  $(v_1, \dots, v_n)$  est libre, donc c'est une base de  $\mathbb{K}^n$ , puisqu'elle est formée de  $n$  vecteurs et que  $\mathbb{K}^n$  est de dimension  $n$ .

Si on note  $D$  la matrice dans la base  $(v_1, \dots, v_n)$  de l'endomorphisme de  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associé à  $A$ ,  $D$  est la matrice diagonale  $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  (puisque pour tout  $k \in [1, n]$ ,  $Av_k = \lambda_k v_k$ ).

Et d'après le cours,  $A$  est semblable à  $D$ . On a  $A = P^{-1}DP$  si  $P$  est la matrice de passage de la base canonique  $(e_1, \dots, e_n)$  vers  $(v_1, \dots, v_n)$ .

La réciproque est fautive. La matrice nulle est semblable à une matrice diagonale (elle est elle-même diagonale) mais son polynôme caractéristique est  $X^n$ , qui n'est pas à racines simples.

8. Considérons  $A$  et  $B$  deux matrices semblables. Il existe donc  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $A = P^{-1}BP$ . Soit  $x \in \mathbb{K}$ . On a l'égalité

$$xI_n - A = P^{-1}(xI_n - B)P,$$

car  $P^{-1} \times xI_n \times P = xI_n$ . En prenant les déterminants, on a donc :

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A) = \det(P^{-1})\det(xI_n - B)\det(P) = \det(xI_n - B) = \chi_B(x),$$

car  $\det(P^{-1}) = \det(P)^{-1}$ . Ainsi, les applications polynomiales associées à  $\chi_A$  et  $\chi_B$  sont égales. Si  $\mathbb{K}$  est infini (on peut s'en contenter !), on sait que cela implique que les polynômes  $\chi_A$  et  $\chi_B$  sont égaux.

Si  $\mathbb{K}$  est fini, on remarque que  $\mathbb{K}$  peut être vu comme un sous-corps d'un corps infini  $\mathbb{L}$  (p. ex.  $\mathbb{K}(X)$ ). La même preuve montre alors que les applications polynomiales associées à  $\chi_A$  et  $\chi_B$ , vus comme des polynômes de  $\mathbb{L}[X]$ , sont égales, donc  $\chi_A$  et  $\chi_B$  sont égaux.

*Remarque : on rappelle que dans le cadre du programme, on peut toujours supposer que  $\mathbb{K}$  est égal à  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , voire exceptionnellement  $\mathbb{Q}$ . La subtilité avec les corps finis n'est donc pas très importante. Par contre, on prend garde à bien distinguer égalité entre polynômes et égalité entre fonctions polynomiales associées (même si à la fin, les deux sont équivalentes).*

### 9. Exemples :

- (a)  $A$  est la matrice d'un projecteur de rang  $r$ . On a vu qu'alors,  $A$  est semblable à la matrice diagonale  $D$  avec  $r$  valeurs 1 et  $n - r$  valeurs 0 sur la diagonale. Donc,

$$\chi_A = \chi_D = (X - 1)^r X^{n-r}.$$

- (b)  $B$  est la matrice d'une symétrie par rapport à un sous-espace de dimension  $r$ . Donc,  $B$  est semblable à la matrice diagonale  $D'$  avec  $r$  valeurs 1 et  $n - r$  valeurs  $-1$  sur la diagonale. Donc,

$$\chi_B = \chi_{D'} = (X - 1)^r (X + 1)^{n-r}.$$

10. On considère  $(f_1, \dots, f_r)$  une base de  $F$ , qu'on complète en une base  $(f_1, \dots, f_r, g_{r+1}, \dots, g_n)$  de  $E$ . Notons  $A_F$  la matrice de  $f_F$  dans la base  $(f_1, \dots, f_r)$  et  $A$  la matrice de  $f$  dans la base  $(f_1, \dots, f_r, g_{r+1}, \dots, g_n)$ . Alors,  $A$  s'écrit par blocs :

$$A = \begin{pmatrix} A_F & C \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

où  $C \in \mathcal{M}_{r, n-r}(\mathbb{K})$  et  $D \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{K})$ . Pour tout  $x \in \mathbb{K}$ , on a aussi :

$$xI_n - A = \begin{pmatrix} xI_r - A_F & C \\ 0 & xI_{n-r} - D \end{pmatrix}.$$

D'où l'on tire  $\det(xI_n - A) = \det(\chi_{I_r - A_F}) \det(xI_{n-r} - D)$ . En notant  $P$  l'application polynomiale  $x \mapsto \det(xI_{n-r} - D)$ , on a donc :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \chi_A(x) = \chi_{A_F}(x)P(x).$$

Comme précédemment, cette égalité entre applications polynomiales induit une égalité entre polynômes :  $\chi_A = \chi_{A_F}P$ . Donc  $\chi_{A_F}$  divise  $\chi_A$ .

### 2.3 Théorème de Cayley-Hamilton

11. Soit  $x \in \mathbb{K}$ . On considère la matrice  $C_P(x) = xI_n - C_P$ . On a :

$$C_P(x) = \begin{pmatrix} x & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & x & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & a_{n-1} + x \end{pmatrix}.$$

On calcule son déterminant en développant selon la première colonne : on a

$$\det(C_P(x)) = x \cdot \begin{vmatrix} x & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & \ddots & \vdots & a_2 \\ 0 & \ddots & x & \vdots \\ \vdots & \ddots & -1 & a_{n-1} + x \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & \ddots & \vdots & a_2 \\ 0 & \ddots & x & \vdots \\ \vdots & \ddots & -1 & a_{n-1} + x \end{vmatrix}.$$

Le deuxième déterminant se calcule en développant selon la première ligne : il vaut

$$a_0(-1)^{1+(n-1)}\det(-I_{n-2}) = a_0.$$

En notant  $Q$  le polynôme  $Q = X^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+1}X^k$ , on a donc :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \det(C_P(x)) = x \times \det(C_Q(x)) + a_0.$$

On peut alors procéder par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$  pour montrer que si  $P$  est un polynôme unitaire de degré  $n$ , alors  $\forall x \in \mathbb{K}, \chi_{C_P}(x) = P(x)$ .

Si  $n = 1$  et  $P = X + a_0$ ,  $C_P(x) = (a_0 + x)$  et donc  $\chi_{C_P}(x) = a_0 + x = P(x)$ .

Si le résultat est montré pour tout polynôme de degré  $n - 1$  et si  $P$  est de degré  $n$ , on a, avec les notations précédentes :  $\chi_{C_P}(x) = x \times \chi_{C_Q}(x) + a_0$ . Or, par hypothèse de récurrence,  $\chi_{C_Q}(x) = Q(x)$  et on a bien  $P(x) = xQ(x) + a_0$ , ce qui conclut.

On a donc montré que pour tout  $x \in \mathbb{K}$ ,  $\chi_{C_P}(x) = P(x)$ . Comme précédemment, on en déduit que cette égalité entre fonctions polynomiales induit une égalité polynomiale  $\chi_{C_P} = P$ .

On a montré précédemment que  $P(C_P) = 0$ , donc  $\chi(C_P)(C_P) = 0$ , ce qui montre le théorème de Cayley-Hamilton pour les matrices compagnes.

12. (a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors  $f(f^n(x)) = f^{n+1}(x) \in E_x$ . Comme  $E_x$  est engendré par les  $f_n(x)$ , ceci montre que  $f(E_x) \subset E_x$ .

Comme  $E$  est de dimension finie, la famille  $(f^n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas liée. On considère le plus grand entier  $r \in \mathbb{N}^*$  tel que  $(x, f(x), \dots, f^{r-1}(x))$  est libre. Alors,  $f^r(x)$  est combinaison linéaire de cette famille (sinon on contredirait la maximalité de  $r$ ). On peut donc trouver des scalaires  $a_0, \dots, a_{r-1}$  tels que

$$f^r(x) = \sum_{k=0}^{r-1} a_k f^k(x).$$

On note  $P$  le polynôme  $X^r - \sum_{k=0}^{r-1} a_k X^k$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On effectue la division euclidienne de  $X^n$  par  $P$  :

$$X^n = Q \times P + R,$$

avec  $\deg R \leq n - 1$ . On évalue cette égalité polynomiale en  $f$  :

$$f^n = Q(f) \circ P(f) + R(f),$$

puis on évalue en  $x$  :

$$f^n(x) = Q(f)(P(f)(x)) + R(f)(x) = R(f)(x),$$

car  $P(f)(x) = 0$ .

Or,  $R(f)(x) \in \text{Vect}(x, f(x), \dots, f^{r-1}(x))$ . Ceci montre que la famille  $(x, f(x), \dots, f^{r-1}(x))$  est aussi génératrice de  $E_x$  ; c'en est donc une base.

- (b) Pour tout  $i \in \llbracket 0, r-2 \rrbracket$ , on a  $f(f^i(x)) = f^{i+1}(x)$ . Et,  $f(f^{r-1}(x)) = \sum_{k=0}^{r-1} a_k f^k(x)$ , avec les notations précédentes.

La traduction matricielle de ces égalités est que, dans la base  $(x, f(x), \dots, f^{r-1}(x))$ , la matrice de  $f_{E_x}$  est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire la matrice compagne de  $P$  (avec les notations précédentes).

- (c) On vient de montrer que  $f_{E_x}$  est représenté dans la base  $(x, f(x), \dots, f^{r-1}(x))$  par une matrice compagne  $C_P$ , pour un certain polynôme  $P$ . On a  $\chi_{C_P}(C_P) = 0$ , d'après la question 11. Or, par définition,  $\chi_{f_{E_x}} = \chi_{C_P}$  ; donc  $\chi_{C_P}(C_P)$  est la représentation matricielle de  $\chi_{f_{E_x}}(f_{E_x})$  (dans la même base). Donc  $\chi_{f_{E_x}}(f_{E_x}) = 0$ .
13. On cherche à montrer que  $\chi_f(f) = 0$ . Cela revient à montrer que, pour tout  $x \in E$ ,  $\chi_f(f)(x) = 0$ . Soit  $x \in E$ .

Alors,  $x$  est dans  $E_x$ . Par la question précédente, on a donc  $\chi_{f_{E_x}}(f_{E_x})(x) = 0$ . Comme  $f$  et  $f_{E_x}$  coïncident sur  $E_x$ , on peut plus simplement écrire  $\chi_{f_{E_x}}(f)(x) = 0$ . De plus, on sait par la question 10 que  $\chi_{f_{E_x}}$  divise  $\chi_f$ . Notons  $P$  un polynôme tel que  $\chi_f = P \times \chi_{f_{E_x}}$ . En évaluant en  $f$ , puis en  $x$ , on a donc :

$$\chi_f(f)(x) = P(f)(\chi_{f_{E_x}}(f)(x)) = 0.$$

Ainsi, pour tout  $x$  dans  $E$ ,  $\chi_f(f)(x) = 0$ .

Donc,  $\chi_f(f) = 0$ , ce qui conclut la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton.