

## Systèmes linéaires et matrices

### 1 Pratique du pivot

#### Exercice 1. ♣ – ●○○ – Systèmes linéaires

Résoudre les systèmes linéaires suivants.

$$1. \begin{cases} 2x+3y-z=-1 \\ x+2y+3z=2 \\ 3x+4y-5z=-4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 4x+3y=2 \\ 2x+y=5 \\ 3x+2y=2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x+2y-z+3t=2 \\ -2x-4y+2z+t=3 \\ 3x+6y-3z+2t=1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} u+w=1 \\ v+w=0 \\ u+v=1 \\ 2u+3v=0 \end{cases}$$

#### Exercice 2. ♣ – ●○○ – Systèmes linéaires à paramètres

Soit  $a, b, m$  des réels. Résoudre les systèmes suivants, en discutant selon les valeurs des paramètres.

$$1. \begin{cases} 3x+y-z=-1 \\ 5x+2y-2z=a \\ 4x+y-z=b \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} ax+y+z=1 \\ x+ay+z=1 \\ (2a+1)x+3y+(a+2)z=3 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} mx+y+z=1 \\ x+my+z=m \\ x+y+mz=1 \\ x+y+z=m \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x+2y+az=1 \\ 3x+4y+2z=a \\ 2x+3y-z=1 \end{cases}$$

#### Exercice 3. ♣ – ●○○ – Inversion de matrices

Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles. Le cas échéant, calculer leur inverse.

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$3. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$4. \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 4. ♣ – ●○○ – Inversion de matrices à paramètres**

Pour chacune de ces matrices, discuter suivant les valeurs du réel  $m$  si elle est inversible, et donner le cas échéant son inverse.

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & 0 & m \\ m-1 & m-2 & 1-m \end{pmatrix} \qquad 2. \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

**Exercice 5. ●○○ – Conditions sur le graphe d'une fonction**

Soit  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . On considère  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto ae^x + bx + c$ .

Pour quelles valeurs de  $a, b$  et  $c$  a-t-on que le graphe de  $f$  contient le point  $(0, 1)$ , que sa tangente en ce point contient également le point  $(2, 3)$  et que le graphe admette une tangente horizontale au point d'abscisse  $\ln 3$  ?

**Exercice 6. ♣ – ●○○ – Décomposition en éléments simples**

Déterminer les triplets  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  (s'ils existent) tels que l'on ait les identités suivantes.

$$1. \forall x \in \mathbb{C} \setminus \cup_3, \frac{1}{x^3-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1};$$

$$2. \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 2, 3\}, \frac{1}{x^3-5x^2+6x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3};$$

$$3. \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}, \frac{x^2+x+1}{x-2} = ax+b + \frac{c}{x-2};$$

$$4. \forall x \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}, \frac{1}{x^3-2x^2+x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}.$$

**Exercice 7. ●○○ – Systèmes non linéaires**

Résoudre les systèmes suivants ( $x, y$  et  $z$  sont réels).

$$1. \begin{cases} xy=1 \\ \frac{x}{y}=2 \end{cases} \qquad 2. \begin{cases} xyz=1 \\ xy^2z^4=2 \\ xy^3z^9=3. \end{cases}$$

**2 Calcul matriciel****Exercice 8. ○○○ – Produit de matrices**

Effectuer tous les produits possibles de deux matrices (non nécessairement distinctes) choisies parmi les quatre suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 3 & 3 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 8 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 9.** ●○○ – *Matrice  $J_n$* 

On note  $J_n$  la matrice carrée de taille  $n$  dont tous les coefficients valent 1.

1. Déterminer  $J_n^k$ , pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .
2.  $J_n$  est-elle inversible ?

**Exercice 10.** ♣ – ●○○ – *Puissances de matrices*

Soient  $a, b, \theta \in \mathbb{R}$ . Calculer, pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ , la puissance  $n$ -ième des matrices suivantes.

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3. R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

$$2. B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

$$4. C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Exercice 11.** ●○○ – *Un calcul d'inverse*

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $-A^3 + A^2 + 5A - I_3$ .
2. En déduire que  $A$  est inversible et donner son inverse.

**Exercice 12.** ●○○ – *Produit de matrices symétriques*

Montrer que deux matrices symétriques commutent ssi leur produit est une matrice symétrique.

**Exercice 13.** ●●○○ – *Un calcul de commutant*

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Déterminer les matrices de } \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ qui commutent avec } A.$$

**Exercice 14.** ♣ – ●●○○ – *Triangulaire supérieure commutant avec sa transposée*

Que dire d'une matrice triangulaire supérieure de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  qui commute avec sa transposée ?

**Exercice 15.** ♣ – ●●○○ – *Matrice de racines de l'unité*

Soit  $n \geq 2$ . On note  $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$  et  $A = (\omega^{(p-1)(q-1)})_{1 \leq p, q \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On note  $\bar{A}$  la matrice dont les coefficients sont les conjugués de ceux de  $A$ .

1. Calculer  $A\bar{A}$ .
2. En déduire que  $A$  est inversible et donner son inverse.

### 3 Exercices plus théoriques

#### Exercice 16. ●○○ – Mini-maxi et Maxi-mini

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$  une matrice à coefficients réels. Montrer que

$$\min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} \geq \max_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq j \leq n} a_{i,j}.$$

#### Exercice 17. ●○○ – Une construction de $\mathbb{C}$

On définit  $C = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

1. Montrer que  $C$  est un sous-anneau commutatif de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .
2. Montrer que  $C$  est un corps.
3. Montrer que  $C$  est isomorphe au corps des nombres complexes.

#### Exercice 18. ●○○ – Commutant de matrices diagonales

1. Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  des éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts et  $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_n \end{pmatrix}$ .

Déterminer les matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  commutant avec  $D$ .

2. En déduire le centre de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  : c'est-à-dire l'ensemble des matrices  $A$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telles que

$$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AB = BA.$$

#### Exercice 19. ●○○ – Matrices nilpotentes

Une matrice  $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est nilpotente s'il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $N^k = 0$ .

1. A quelle condition une matrice triangulaire supérieure est-elle nilpotente ?
2. On suppose  $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  nilpotente. Montrer que  $I_n - N$  est inversible et donner son inverse.

#### Exercice 20. ♣ – ●●○ – Alternative pour les systèmes linéaires

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$  et  $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ . Montrer qu'exactlyement l'un des deux cas suivants advient :

1.  $\exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) : AX = B$  ;
2.  $\exists Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) : Y^T A = 0$  et  $Y^T B \neq 0$ .

**Exercice 21.** ♣ – ●●○ – *Matrices équivalentes*

Soient  $n$  et  $p$  deux entiers naturels non nuls,  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  et  $B$  sont équivalentes (en lignes-colonnes) si on peut passer de  $A$  à  $B$  par des opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes.

1. Démontrer que  $A$  et  $B$  sont équivalentes ssi il existe  $P$  dans  $GL_n(\mathbb{K})$  et  $Q$  dans  $GL_p(\mathbb{K})$  telles que  $A = PBQ$ .
2. Démontrer que  $A$  est équivalente à une matrice de la forme  $J_{n,p,r} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  où

$$J_{n,p,r} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & (0) & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

avec  $r$  nombres 1 sur la diagonale.

3. Démontrer que si  $n = p$  et  $A$  n'est pas inversible, alors  $A$  est équivalente à une matrice triangulaire supérieure stricte.

**Exercice 22.** ♣ – ●●○ – *Matrices à diagonale dominante*

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que

$$\forall i \in [1, n], |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j \in [1, n] \\ j \neq i}} |a_{i,j}|.$$

Montrer que  $A$  est inversible.

## Indications

**Exercice 7.** On distinguera soigneusement selon les signes de  $x$ ,  $y$  et  $z$ .

**Exercice 10.** En pratique, deviner la formule puis la montrer par récurrence. Pour 2., on peut être plus malin.

**Exercice 21.** Une opération élémentaire sur les lignes/colonnes correspond à multiplier à gauche/à droite par une matrice inversible. Par ailleurs, l'algorithme du pivot de Gauss montre que toute matrice inversible est produit de matrices d'opérations élémentaires.

**Exercice 22.** Considérer un  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$  tel que  $AX = 0$ . Si par l'absurde  $X$  était non nul, on pourrait considérer un indice  $i$  tel que  $|x_i|$  est maximal.