

## Dérivabilité

### 1 Calculs

#### Exercice 1. ○○○ – Propriétés de la dérivée

Que dire de la dérivée d'une fonction paire ? impaire ? périodique ?

#### Exercice 2. ●○○ – Calculs de dérivées $n$ -èmes

Calculer, pour tout entier naturel  $n$ , la dérivée  $n$ -ème des fonctions suivantes :

- |  |  |
|--|--|
| 1. $f : x \mapsto a^x$ (où $a > 0$ ) ;       | 4. $k : x \mapsto \exp(x\sqrt{3}) \cos(x)$ ; |
| 2. $g : x \mapsto x \exp(x)$ ;               | 5. $l : x \mapsto x^2 \sin(x)$ .             |
| 3. $h : x \mapsto \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ ; |  |

#### Exercice 3. ♣ – ●○○ – Équation d'une tangente

Montrer que les courbes d'équation  $y = x^2$  et  $y = \frac{1}{x}$  ont une unique tangente commune et en donner son équation.

#### Exercice 4. ●○○ – Valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

Soit  $n$  un entier. On considère  $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto x^n(1-x)^n$ .

1. Déterminer  $f_n^{(n)}$  et calculer le coefficient devant  $x^n$  dans cette expression.
2. En déduire la valeur de  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ .

#### Exercice 5. ●●○ – Étude de la classe d'une fonction

Étudier la classe des fonctions  $f$  et  $g$  définies par

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \sin x & \text{si } x > 0 \\ x^2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} ; g(x) = \begin{cases} x + a + be^x & \text{si } x > 0 \\ \cos x - x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

**Exercice 6.** ♣ – ●●○ – *Dérivée seconde d'une réciproque*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  l'application définie par  $f(x) = e^x + x$ .

1. Montrer que  $f$  est bijective.
2. Montrer que  $f^{-1}$  est dérivable et déterminer la valeur de  $(f^{-1})'(1)$ .
3. Montrer que  $f^{-1}$  est deux fois dérivable et donner la valeur de  $(f^{-1})''(1)$ .

## 2 Dérivabilité en un point

**Exercice 7.** ●○○ – *Une variante du taux d'accroissement*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable en  $x_0$ . Calculer  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0}$ .

**Exercice 8.** ♣ – ●○○ – *Une autre variante*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable en  $x_0$ . Soient  $a, b > 0$ . Calculer  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + bh) - f(x_0 - ah)}{(a + b)h}$ .

**Exercice 9.** ●●○ – *Dérivabilité de la valeur absolue et du max*

Soient  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonction dérivables en  $x_0$ . Donner une condition nécessaire et suffisante

1. Sur  $f$  pour que  $|f|$  soit dérivable en  $x_0$ .
2. Sur  $f$  et  $g$  pour que  $\max(f, g)$  soit dérivable en  $x_0$ .

**Exercice 10.** ●●○ – *Recollement de fonctions dérivables*

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ . Étudier la dérivabilité de la fonction  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } x \in [0, 1/2] \\ f(2x - 1) & \text{sinon} \end{cases}$$

**Exercice 11.** ♣ – ●●○ – *Limite de  $\sum f\left(\frac{k}{n^2}\right)$*

Soit  $f$  une fonction dérivable en 0, telle que  $f(0) = 0$ .

1. Déterminer la limite de  $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
2. En déduire la limite de  $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

## 3 Théorème de Rolle

**Exercice 12.** ●○○ – *Annulation de  $f^{(n)}$*

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $n$  fois dérivable.

Montrer que si  $f$  s'annule  $n + 1$  fois, alors  $f^{(n)}$  s'annule.

**Exercice 13.** ●○○ – *Rolle itéré*

Soient  $n \geq 1$  et  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $(n + 1)$  fois dérivable sur  $[0, 1]$ . On suppose que  $f(1) = 0$  et que  $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n)}(0) = 0$ .

Montrer qu'il existe  $c \in ]0, 1[$  tel que  $f^{(n+1)}(c) = 0$ .

**Exercice 14.** ●○○ – *Équation  $P(x) = e^x$* 

Soit  $P$  un polynôme. Montrer que l'équation  $P(x) = e^x$  n'a qu'un nombre fini de solutions sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 15.** ●○○ – *Où est Rolle ?*

Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . Montrer qu'il existe  $x \in ]0, 1[$  tel que  $4ax^3 + 3ax^2 + 2cx = a + b + c$ .

**Exercice 16.** ●●○○ – *Rolle à l'infini*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. On suppose que  $f$  tend vers une même limite  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$  en  $\pm\infty$ . Montrer qu'il existe  $c \in \mathbb{R}$  tel que  $f'(c) = 0$ .

**Exercice 17.** ♣ – ●●○○ – *Tangente passant par l'origine*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. On suppose que  $f(0) = f'(0) = 0$  et qu'il existe  $a \neq 0$  tel que  $f(a) = 0$ .

Montrer qu'il existe  $x \neq 0$  tel que la tangente en  $x$  au graphe de  $f$  passe par l'origine.

**Exercice 18.** ♣ – ●●●○ – *Trouvez la bonne fonction*

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $f(0) = f'(0) = f(1) = f'(1) = 0$ .

Montrer qu'il existe  $c \in [0, 1]$  tel que  $f''(c) = f(c)$ .

## 4 Accroissements finis

**Exercice 19.** ●○○ – *Inégalité des accroissements finis*

Montrer les inégalités suivantes :

1.  $\forall x, y \in \mathbb{R} : |\operatorname{Arctan}(x) - \operatorname{Arctan}(y)| \leq |x - y|$  ;
2.  $\forall x \in \mathbb{R}_+ : x \leq e^x - 1 \leq xe^x$  ;
3.  $\forall x \in \mathbb{R} : 0 \leq \operatorname{ch}(x) - 1 \leq x \operatorname{sh}(x)$ .

**Exercice 20.** ●○○ – *Équivalent de la série harmonique*

1. Montrer que, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :  $\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}$ .
2. En déduire que la suite de terme général  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  tend vers  $+\infty$  et en donner un équivalent.
3. Déterminer la limite de  $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ .

**Exercice 21. ●●○ – Fonctions  $\alpha$ -Hölderiennes**

Soit  $\alpha > 0$ . Une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est dite  $\alpha$ -Hölderienne si

$$\exists C > 0 : \forall x, y \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha.$$

Si  $\alpha > 1$ , quelles sont les fonctions  $\alpha$ -Hölderiennes ?

**Exercice 22. ♣ – ●●○ – Règle de l'Hôpital**

1. Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur  $[a, b]$ , dérivables sur  $]a, b[$ . Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  tel que

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

2. Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$  et soit  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$  adhérent à  $I$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f = \lim_{x \rightarrow x_0} g = 0$  et que  $g$  et  $g'$  ne s'annulent pas sur  $I - \{x_0\}$ . Soit  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . Montrer

$$\text{que si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

3. En déduire les limites  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{c^x - d^x}$ , où  $a, b, c, d > 0$  et  $c \neq d$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x - \sin(1/x)}{e^x - e^{1/x}}$ .

**Exercice 23. ♣ – ●●○ – Une limite sympathique**

Calculer la limite de la suite  $\left( \frac{n^2}{\ln n} (\sqrt[n]{n} - \sqrt[n+1]{n+1}) \right)_n$ .

**Exercice 24. ●●○ – Comportement à l'infini d'une fonction et de sa dérivée.**

Soit  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  une fonction dérivable.

- On suppose  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . Que peut-on dire de  $\lim_{+\infty} f'$  ?
- On suppose  $\lim_{+\infty} f = \ell \in \mathbb{R}$ . Que peut-on dire de  $\lim_{+\infty} f'$  ?
- Soit  $\alpha > 0$ . On suppose que  $f' \geq \alpha$ . Que peut-on dire de  $\lim_{+\infty} f$  ?
- On suppose que  $\lim_{+\infty} f' = \ell > 0$ . Que peut-on dire de  $\lim_{+\infty} f$  ?
- On suppose que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell \in \mathbb{R}$ . Que peut-on dire de  $\lim_{+\infty} f'$  ?
- On suppose que  $\lim_{+\infty} f' = \ell$ . Que peut-on dire de  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  ?

**Exercice 25. ♣ – ●●○ – Une inégalité avec des polynômes trigonométriques**

Soient  $a_1, \dots, a_n$  des réels et  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=1}^n a_k \sin(kx)$ . On suppose que pour tout  $x$  réel, on a  $|f(x)| \leq |\sin x|$ . Montrer que  $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1$ .

**Exercice 26.** ♣ – ●●○ – *Un raffinement de l'égalité des accroissements finis*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $f''(0) \neq 0$ . Montrer qu'il existe  $\alpha > 0$  tel que

$$\forall x \in ]-\alpha, \alpha[ - \{0\}, \exists ! \theta_x \in ]0, 1[ : f(x) = f(0) + x f'(\theta_x x).$$

Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} \theta_x = 1/2$ .

## 5 Autres exercices

**Exercice 27.** ●○○ –  $\sup_n \sqrt[n]{n}$

Calculer  $\sup_{n \in \mathbb{N}^*} \sqrt[n]{n}$ .

**Exercice 28.** ●●○ – *Nombre fini de points d'annulation*

Soit  $f$  une fonction dérivable de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que, pour tout  $x$  de  $[0, 1]$  tel que  $f(x) = 0$ ,  $f'(x) \neq 0$ . Montrer que  $f$  ne s'annule qu'un nombre fini de fois.

**Exercice 29.** ●●○ – *Un lemme de factorisation*

Soit  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $f'(0) = 0$ .

Montrer qu'il existe  $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = g(x^2)$ .

**Exercice 30.** ●●○ – *Un contre-exemple*

On considère la fonction  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 2x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Montrer que  $f$  admet un prolongement continu sur  $\mathbb{R}$ , que l'on notera  $\tilde{f}$ .
2. Montrer que  $\tilde{f}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et donner sa dérivée.
3. Montrer qu'il n'existe aucun voisinage de 0 sur lequel  $f$  est croissante.
4. En déduire que  $f$  n'est pas de classe  $\mathcal{C}^1$ .

**Exercice 31.** ●●○ – *Fonction plateau*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = e^{-1/x}$  si  $x > 0$  et  $f(x) = 0$  sinon.

1. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe une fonction polynomiale  $P_n$  telle que  $\forall x > 0, f^{(n)}(x) = e^{-1/x} P_n(1/x)$ .
2. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Soit  $S$  un segment non trivial de  $\mathbb{R}$ . Montrer qu'il existe  $h \in C^\infty(\mathbb{R})$  non nulle telle que  $h$  est nulle sur  $\mathbb{R} - S$ .

**Exercice 32.** ♣ – ●●○ – *Dérivée d'une fonction positive*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  positive et de classe  $\mathcal{C}^1$ . Montrer qu'il existe  $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telle que  $\lim_n f'(x_n) = 0$ .

**Exercice 33.** ♣ – ●●○ – *Premier retour à zéro*

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . On suppose que  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) > 0$  et  $f(1) < 0$ .  
Montrer qu'il existe un premier temps de retour de  $f$  à 0, c'est-à-dire :

$$\exists t_0 \in ]0, 1[ : f(t_0) = 0 \text{ et } \forall t \in ]0, t_0[, f(t) \neq 0.$$

Montrer que cette propriété est fautive si on suppose seulement  $f'(0) \geq 0$ .

**Exercice 34.** ♣ – ●●○ – *Théorème de Darboux*

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. Montrer que la dérivée  $f'$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires :

$$\forall a, b \in I, \forall y \in [f'(a), f'(b)], \exists x \in [a, b] : f'(x) = y.$$

**Exercice 35.** ♣ – ●●○ –  $P + P' + \dots + P^{(n)}$

Soit  $P$  une application polynomiale de degré  $n$ . On note  $Q : x \mapsto P(x) + P'(x) + \dots + P^{(n)}(x)$ .  
Montrer que si  $P$  est à valeurs positives, alors  $Q$  aussi.

## Indications

**Exercice 3.** Écrire les équations des tangentes aux deux courbes en deux points (a priori distincts)  $x_1$  et  $x_2$ .

**Exercice 7.** Travailler l'expression pour lever l'indétermination ; ou utiliser un développement limité.

**Exercice 9.** Pour 2., peut-on se ramener à 1. ?

**Exercice 11.** Approcher  $f$  par son DL à l'ordre 1 en 0 ; bien montrer que le terme d'erreur tend vers 0 quand  $n \rightarrow +\infty$

**Exercice 17.** Faire un dessin et bien mettre le problème en équation. Attention ! on ne suppose pas  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$

**Exercice 28.** Reasonner par contraposée. Si  $f$  a une infinité de points d'annulation, considérer une suite formée par une infinité distincte de ces points et en extraire une sous-suite convergente.

**Exercice 32.** Distinguer selon que  $f'$  s'annule ou pas.

**Exercice 33.** Considérer la borne inférieure des  $t > 0$  tels que  $f(t) = 0$ . Pourquoi cette borne existe-t-elle ? est-elle différente de 0 ? est-elle atteinte ?

**Exercice 34.** Comme pour la preuve du TVI, considérer le cas particulier où  $f'(a)f'(b) \leq 0$  et où on cherche  $x \in [a, b]$  tel que  $f'(x) = 0$ . Faire un dessin.