

## Nombres réels et inégalités

### 1 Inégalités sur les nombres réels

**EXERCICE 1.** ●○○ *Somme et somme des inverses*

Soient  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+^*$ . Montrer que  $\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}\right) \geq n^2$  ;

1. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz ;
2. En développant et regroupant astucieusement les termes.

**EXERCICE 2.** ♣/◇ – ●●○ *Lemme de Titu*

1. Soient  $a_1, a_2, b_1, b_2$  des réels strictement positifs. Montrer que  $\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} \geq \frac{(a_1 + a_2)^2}{b_1 + b_2}$ .
2. En déduire plus généralement le lemme de Titu : si  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$  sont des réels strictement positifs, alors  $\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + \dots + a_n)^2}{b_1 + \dots + b_n}$ .
3. Retrouver ce résultat par application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

**EXERCICE 3.** ◇ – ●○○ *Une inégalité avec des puissances*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ , soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $\left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2^{n+1}$ .

**EXERCICE 4.** ♣/◇ – ●●○ *Inégalités de Nesbitt et Shapiro*

1. Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$ .
  - (a) Montrer que  $3(ab + ac + bc) \leq (a + b + c)^2$ .
  - (b) Déduire l'inégalité de Nesbitt du lemme de Titu :  $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ .
2. Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$ .
  - (a) Montrer que  $2\left(a(b+c) + b(c+d) + c(d+a) + d(a+b)\right) \leq (a+b+c+d)^2$ .
  - (b) Déduire l'inégalité suivante de Shapiro du lemme de Titu :

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2.$$

**EXERCICE 5.** ♣/◇ – ●●○ *Une majoration de  $\prod(1+a_k)$*

Soient  $a_1, \dots, a_n > -1$  des nombres réels tels que  $S = \sum_{k=1}^n a_k \geq 0$ . Montrer que  $\prod_{k=1}^n (1+a_k) \leq \sum_{i=0}^n \frac{S^i}{i!}$ .

**EXERCICE 6.** ♣ - ●●○  $\sum a_k$  et  $\sum \varepsilon_k a_k$   
Soient  $a_1, \dots, a_n$  des nombres réels.

1. Montrer qu'il existe  $m \in [0, n]$  tel que  $\left| \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|$ .
2. Montrer que  $\max_{1 \leq k \leq n} |a_k| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n = \pm 1} \left| \sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right|$ .

## 2 Valeur absolue et partie entière

**EXERCICE 7.** ◇ - ●○○ *Incertitudes sur la somme et le produit*  
On approche  $n$  réels  $x_1, \dots, x_n$  par des réels  $\xi_1, \dots, \xi_n$ .

1. Majorer l'erreur commise en approchant  $x_1 + \dots + x_n$  par  $\xi_1 + \dots + \xi_n$ , en fonction des erreurs  $\varepsilon_i = |x_i - \xi_i|$ .
2. Même question avec le produit, la majoration dépendant aussi des  $x_i$ .

**EXERCICE 8.** ◇ - ●●○ *(In)équations avec valeurs absolues*  
Résoudre sur  $\mathbb{R}$  :

1.  $|x - 7| = |4x - 1|$  ;
2.  $|x - 7| = 4x - 1$  ;
3.  $|3x + 1| > |x + 2|$  ;
4.  $|2x - 4| = |x + 3|$  ;
5.  $|x^2 - 2| \leq 2x + 1$  ;
6.  $|x - 2| + |3x + 1| < 4$ .

**EXERCICE 9.** ◇ - ●○○ *Variations sur l'inégalité triangulaire*  
Soient  $x$  et  $y$  deux réels. Montrer que

1.  $|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$  ;
2.  $1 + |xy - 1| \leq (1 + |x - 1|)(1 + |y - 1|)$ .

**EXERCICE 10.** ●○○ *Équations avec parties entières*  
Résoudre sur  $\mathbb{R}$  :

1.  $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$  ;
2.  $\lfloor x + \sqrt{2} \rfloor - \lfloor x \rfloor = 2$ .

**EXERCICE 11.** ●○○ *Parité d'une partie entière*  
Soit  $n \geq 1$ .

1. Montrer que  $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$  est un entier pair.
2. En déduire que  $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor$  est un entier impair.

**EXERCICE 12.** ♣/◇ - ●●○ *Une autre équation avec parties entières*  
Résoudre sur  $\mathbb{R}$ ,  $\lfloor 3x - 2 \rfloor = \lfloor 2x + 1 \rfloor$ .

**EXERCICE 13.** ♣ – ●●○ *Deux identités avec la partie entière*

1. Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Montrer que  $\lfloor \sqrt{x} \rfloor = \lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor$  ;
2. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , soit  $n \geq 1$  un entier. Montrer que  $\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \rfloor = \lfloor x \rfloor$ .

**EXERCICE 14.** ◇ – ●●○ *Somme de parties entières*

Soit  $x$  un réel, soit  $m \geq 1$  un entier. Montrer que  $\lfloor mx \rfloor = \sum_{k=0}^{m-1} \lfloor x + \frac{k}{m} \rfloor$ .

### 3 Topologie des réels

**EXERCICE 15.** ●○○ *Borne supérieure, borne inférieure*

Déterminer, si elles existent, les bornes supérieure et inférieure des ensembles suivants. Préciser si les bornes sont atteintes.

1.  $A = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$  ;
2.  $B = \left\{ \left| \frac{\cos n}{n} \right|, n \in \mathbb{N}^* \right\}$  ;
3.  $C = \left\{ 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{m}, (n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$  ;
4.  $D = \left\{ \frac{nm}{n^2 + m^2 + 1}, (n, m) \in \mathbb{N}^2 \right\}$ .

**EXERCICE 16.** ♣ – ●○○ *Somme et produit de parties denses*

Soient  $A, B \subset \mathbb{R}$  deux parties, avec  $A$  dense dans  $\mathbb{R}$  et  $B$  non vide.

1. Montrer que  $A + B = \{a + b, (a, b) \in A \times B\}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .
2. A quelle condition sur  $B$ ,  $AB = \{ab, (a, b) \in A \times B\}$  est-elle dense dans  $\mathbb{R}$  ?

**EXERCICE 17.** ◇ – ●●○ *Densité des  $\sqrt{n} - \sqrt{m}$*

1. Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de limite  $+\infty$  telles que  $\lim_n (u_{n+1} - u_n) = 0$  et  $\lim_n (v_{n+1} - v_n) = 0$ .  
Montrer que  $\{u_n - v_m, (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .
2. En déduire que  $\{\sqrt{n} - \sqrt{m}, (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 18.** ♣/◇ – ●●○ *Densité de  $\cos(\ln n)$*

1. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$ .
2. En déduire que  $\{\cos(\ln n), n \in \mathbb{N}^*\}$  est dense dans  $[-1, 1]$ .

**EXERCICE 19.** ♣/◇ – ●●○ *Théorème des chipolatas*

Soit  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite d'intervalles de  $\mathbb{R}$  telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $I_n \cap I_{n+1} \neq \emptyset$ .

Montrer que  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

## Indications

**Exercice 2.** Pour 3., définir  $x_i$  et  $y_i$  de sorte que  $\frac{a_i^2}{b_i} = x_i^2$  et  $a_i = x_i y_i$ .

**Exercice 3.** Se ramener à une seule variable réelle.

**Exercice 4.** Pour les questions (b), les fractions du type  $\frac{a}{b+c}$  ne sont pas encore écrites sous la bonne forme pour appliquer le lemme de Titu.

**Exercice 5.** Penser à l'inégalité arithmético-géométrique.

**Exercice 7.** Pour le produit, passer de  $x_1 \dots x_n$  à  $\xi_1 \dots \xi_n$  en  $n$  étapes.

**Exercice 8.** On pourra dans certains cas faire un tableau donnant les signes des quantités pertinentes en fonction de  $x$ .

**Exercice 9.** Pour 2., réécrire les quantités en fonction de  $x-1$  et  $y-1$ .

**Exercice 12.** Commencer par montrer qu'il suffit de considérer les  $x$  appartenant à un intervalle de longueur finie. Puis, faire un tableau résumant les valeurs prises par les deux membres.

**Exercice 14.** Faire une disjonction de cas selon la partie fractionnaire de  $x$ .

**Exercice 17.** Les hypothèses sur  $(u_n)$  se traduisent en

- $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, u_n \geq A$  ;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, |u_{n+1} - u_n| \leq \varepsilon$ .

De même pour  $(v_n)$ . Les  $u_n$  sont arbitrairement grands mais de plus en plus resserrés ; de même pour les  $v_m$ . Exploiter cela.

**Exercice 18.** Utiliser la périodicité de  $\cos$  et le fait que les valeurs  $\ln n$  sont de plus en plus grandes et de plus en plus resserrées.

**Exercice 19.** Le montrer pour deux intervalles, puis pour un nombre fini, puis passer à l'infini. La caractérisation des intervalles de  $\mathbb{R}$  peut aider.