

## DM 12 - Interpolation polynomiale

Dans ce problème, on étudie à quel point les polynômes interpolateurs d'une fonction  $f$  donnent une bonne approximation de la fonction quand le nombre de points d'interpolation augmente.

### 1 Estimation fondamentale

Si  $f$  est une fonction à valeurs réelles définie sur  $[a, b]$  et si  $\underline{x} = (x_0, \dots, x_n)$  est un  $(n + 1)$ -uplet de points deux à deux distincts dans  $[a, b]$ , on note  $L_{f, \underline{x}}$  l'unique polynôme dans  $\mathbb{R}_n[X]$  tel que  $L_{f, \underline{x}}(x_i) = f(x_i)$ , pour tout  $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$

- Soit  $u$  un point de  $[a, b]$  distinct des  $x_i$ . Montrer qu'il existe une constante  $K_u$  telle que

$$g : x \mapsto f(x) - L_{f, \underline{x}}(x) - K_u \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

s'annule en  $x_0, \dots, x_n$  et en  $u$ .

- On suppose maintenant  $f$  de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$ .

Montrer qu'il existe un réel  $c_u \in [a, b]$  tel que  $g^{(n+1)}(c_u) = 0$ .

- En déduire l'identité suivante :  $f(u) - L_{f, \underline{x}}(u) = \frac{f^{(n+1)}(c_u)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (u - x_i)$ .

On note  $P_{\underline{x}}$  le polynôme  $\prod_{i=0}^n (X - x_i)$ .

- Montrer la majoration  $\|f - L_{f, \underline{x}}\|_{\infty} \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_{\infty}}{(n+1)!} \|P_{\underline{x}}\|_{\infty}$ .

### 2 Fonctions à croissance raisonnable

On fixe un entier  $n$  et on considère le  $(n + 1)$ -uplet  $\underline{x} = (x_0, \dots, x_n)$  donné par

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, x_k = a + k \frac{b-a}{n}.$$

- Montrer la majoration  $\|P_{\underline{x}}\|_{\infty} \leq \frac{n!}{4} \left( \frac{b-a}{n} \right)^{n+1}$ .

Une fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^{\infty}$  sur le segment  $[a, b]$  est dite à *croissance raisonnable* s'il existe deux constantes  $C > 0$  et  $r \geq b - a$  telles que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \|f^{(n)}\|_{\infty} \leq C \frac{n!}{r^n}$ .

- Montrer que la fonction  $\exp$  a une croissance raisonnable sur tout segment  $[a, b]$ .

- Si  $\alpha > 0$ , on définit la fonction  $f_{\alpha} : x \mapsto \frac{1}{\alpha^2 + x^2}$  sur le segment  $[-1, 1]$ .

- a) Déterminer les valeurs des dérivées successives de  $f_\alpha$  en 0.
  - b) En déduire que si  $\alpha$  est suffisamment petit, la fonction  $f_\alpha$  n'est pas à croissance raisonnable sur  $[-1, 1]$ .
8. On suppose que  $f$  a une croissance raisonnable sur le segment  $[a, b]$ . Montrer qu'il existe une constante  $C > 0$  telle que :  $\|f - L_{f, \underline{x}}\|_\infty \leq C \frac{n!}{n^n}$ .
9. En déduire que si  $f$  a une croissance raisonnable sur le segment  $[a, b]$ , alors  $\|f - L_{f, \underline{x}}\|_\infty$  tend vers 0 quand  $n$  tend vers l'infini.

### 3 Phénomène de Runge

Dans cette partie, on montre que les fonctions  $f_\alpha$  introduites dans la partie précédente ne sont pas bien interpolées par des polynômes, ce qui est suggéré par la question 9. C'est le *phénomène de Runge*.

On modifie les points d'interpolation utilisés de la façon suivante. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et pour tout  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ , on note  $a_{k,n} = \frac{2k+1}{2n}$ . Les  $2n$  points  $\pm a_{k,n}$  permettent de définir un polynôme interpolateur  $R_{n,\alpha}$  : c'est l'unique polynôme de  $\mathbb{R}_{2n-1}[X]$  tel que

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, R_{n,\alpha}(\pm a_{k,n}) = f_\alpha(\pm a_{k,n}).$$

10. Montrer que  $R_{n,\alpha}$  définit une fonction polynomiale paire. En déduire que son degré est inférieur ou égal à  $2n-2$ .

On définit le polynôme  $Q_{n,\alpha} = 1 - (X^2 + \alpha^2)R_{n,\alpha}$ .

11. Montrer qu'il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $\forall x \in [-1, 1], Q_{n,\alpha}(x) = \lambda \prod_{k=0}^{n-1} (x^2 - a_{k,n}^2)$ .
12. Déterminer la valeur de  $\lambda$  en considérant  $Q_{n,\alpha}(\alpha i)$ .

13. En déduire que pour tout  $x \in [-1, 1], f_\alpha(x) - R_{n,\alpha}(x) = \frac{(-1)^n}{x^2 + \alpha^2} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{x^2 - a_{k,n}^2}{\alpha^2 + a_{k,n}^2}$ .

On souhaite montrer que, si  $\alpha$  est suffisamment petit,  $|f_\alpha(1) - R_{n,\alpha}(1)| \rightarrow +\infty$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ .

14. On note  $h_\alpha$  la fonction  $t \mapsto \ln\left(\frac{1-t^2}{\alpha^2+t^2}\right)$
- (a) Montrer que  $h_\alpha$  est continue et décroissante sur  $[0, 1[$ .

Pour  $\varepsilon \in ]0, 1/2[$ , on note  $J_{\alpha,\varepsilon} = \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} h_\alpha(t) dt$ . Sous réserve d'existence, on note  $J_\alpha$  la limite de  $J_{\alpha,\varepsilon}$  quand  $\varepsilon \rightarrow 0^+$ .

- (b) Montrer que  $J_{\alpha,\varepsilon} = \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} \ln u du + \int_{1+\varepsilon}^{2-\varepsilon} \ln u du - \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} \ln(\alpha^2 + t^2) dt$ .

(c) En déduire que  $J_\alpha$  est bien défini et vaut  $2\ln 2 - \ln(1 + \alpha^2) - 2\alpha \arctan\left(\frac{1}{\alpha}\right)$ .

(d) En déduire que  $J_\alpha > 0$  si  $\alpha$  est suffisamment petit.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $S_{n,\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h_\alpha(a_{k,n})$ .

(e) Montrer que  $J_{\alpha,1/2n} + \frac{1}{n} h_\alpha\left(1 - \frac{1}{2n}\right) \leq S_{n,\alpha} \leq \frac{1}{n} h_\alpha\left(\frac{1}{2n}\right) + J_{\alpha,1/2n}$ .

(f) En déduire que  $S_{n,\alpha} \rightarrow J_\alpha$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ .

(g) Conclure.

## 4 Interpolation en les nœuds de Tchebychev

Du point de vue de l'interpolation polynomiale, le choix de points d'interpolation espacés de façon régulière n'est pas le plus pertinent. Étant fixé  $n \in \mathbb{N}^*$ , il est naturel – au vu de la question 7 – de chercher un  $n+1$ -uplet  $\underline{x} = (x_0, \dots, x_n)$  minimisant la quantité  $\|P_{\underline{x}}\|_\infty$ .

15. a) Montrer qu'il existe, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , un unique polynôme  $T_n \in \mathbb{R}[X]$  tel que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

Préciser le degré et le coefficient dominant de  $T_n$ .

b) Calculer  $T_0$  et  $T_1$ . Montrer la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}: T_{n+2} + T_n = 2XT_{n+1}.$$

c) Déterminer les racines de  $T_n$  et en déduire une factorisation de  $T_n$ .

On se place désormais sur le segment  $[a, b] = [-1, 1]$ .

16. Montrer que  $\|T_n\|_\infty = 1$ . Montrer qu'il existe exactement  $n+1$  points  $-1 = y_0 < y_1 < \dots < y_n = 1$  en lesquels  $T_n$  vaut  $\pm 1$ . Préciser la valeur de  $T_n(y_k)$ .

17. Soit  $P$  un polynôme unitaire de degré  $n$ . En considérant le polynôme  $Q = P - \frac{T_n}{2^{n-1}}$  et les valeurs de  $Q$  en les points  $y_k$ , montrer que  $\|P\|_\infty \geq \frac{1}{2^{n-1}}$ .

Ceci montre que, parmi les polynômes unitaires  $P$  de degré  $n$ ,  $\frac{T_n}{2^{n-1}}$  est le seul minimisant  $\|P\|_\infty$  sur  $[-1, 1]$ . Cela justifie d'utiliser les racines de  $T_n$  pour l'interpolation polynomiale d'une fonction sur  $[-1, 1]$  – ou sur un autre segment à l'aide d'une transformation affine.