

DM 15 - Matrices à coefficients entiers – Corrigé

1 Généralités et exemples

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ contient la matrice I_n , élément neutre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$;
 - Si $A = (a_{i,j})_{i,j}$ et $B = (b_{i,j})_{i,j}$ sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, alors $A - B = (a_{i,j} - b_{i,j})_{i,j}$ aussi.
 - De même, $AB = \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{j,k} \right)_{i,k}$ est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ est un sous-anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$.

- On note $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Elle est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$. De plus, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (récurrence immédiate). Donc, les puissances A^k sont deux à deux distinctes dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$; en particulier $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ est infini.

On généralise pour $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ en considérant $A = I_n + E_{1,2}$ (matrice de transvection). Alors A est inversible d'inverse $I_n - E_{1,2}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = I_n + kE_{1,2}$.

- L'égalité $M^m = I_n$ se réécrit $M \times M^{m-1} = M^{m-1}M = I_n$. Donc, si $M^m = I_n$, M est inversible, d'inverse M^{m-1} .
- L'inclusion $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ est vraie par définition. De plus, si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tel que $AB = BA = I_n$. En particulier, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$ donc $A \in \text{GL}_n(\mathbb{Q})$. Donc, $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) \subset \text{GL}_n(\mathbb{Q}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

La matrice $A = 2I_n$ est dans $\text{GL}_n(\mathbb{Q}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (son inverse est $\frac{1}{2}I_n$). Comme l'inverse de A n'est pas dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, $A \notin \text{GL}_n(\mathbb{Z})$.

- On suppose $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. Si $\det A = ad - bc = \pm 1$, on sait que A est inversible (dans $\text{GL}_n(\mathbb{Q})$) et que $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Donc, si $\det A = \pm 1$, $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$.

Réciproquement, si $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$, on a $\det A \in \mathbb{Z}$ et $\det A^{-1} \in \mathbb{Z}$. Or $\det A^{-1} = \frac{d}{ad - bc} \frac{a}{ad - bc} - \frac{-c}{ad - bc} \frac{-b}{ad - bc} = \frac{ad - bc}{(ad - bc)^2} = \frac{1}{\det A}$. Donc $\det A$ est un entier, dont l'inverse est entier. Donc $\det A = \pm 1$.

Remarque : plus généralement, si $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. On généralisera...

6. Matrices de permutation.

- (a) Comme P_σ est une matrice avec uniquement des coefficients 0 et 1, elle appartient à $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Pour montrer que $P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$, il suffit de montrer que $P_\sigma P_{\sigma^{-1}} = P_{\sigma^{-1}} P_\sigma = I_n$. Cela résulte de l'égalité : $\forall \sigma, \tau \in \mathcal{S}_n, P_{\sigma \circ \tau} = P_\sigma P_\tau$, montrée à la question suivante.
- (b) Montrons que $\forall \sigma, \tau \in \mathcal{S}_n, P_{\sigma \circ \tau} = P_\sigma P_\tau$. Soient $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$. Soient $i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On calcule :

$$\begin{aligned} [P_\sigma P_\tau]_{i,k} &= \sum_{j=1}^n [P_\sigma]_{i,j} [P_\tau]_{j,k} \\ &= \sum_{j=1}^n \delta_{i,\sigma(j)} \delta_{j,\tau(k)} \\ &= \delta_{i,\sigma(\tau(k))}. \end{aligned}$$

Donc, $\forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket, [P_\sigma P_\tau]_{i,k} = [P_{\sigma \circ \tau}]_{i,k}$. Donc $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma \circ \tau}$. En prenant $\tau = \sigma^{-1}$, cela montre que P_σ est inversible d'inverse $P_{\sigma^{-1}}$ (laissé en suspens à la question précédente), donc $P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$. Donc, $\Psi : \mathcal{S}_n \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un morphisme de groupes. Pour montrer que Ψ est injective, on étudie son noyau. Si une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ est dans $\text{Ker } \Psi$, alors $P_\sigma = I_n$, donc $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \delta_{i,\sigma(j)} = \delta_{i,j}$. En prenant $i = j$, on obtient que $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \delta_{j,\sigma(j)} = 1$, c'est-à-dire $\sigma(j) = j$. Donc $\sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$. Donc $\text{Ker } \Psi = \{\text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}\}$, donc Ψ est injective.

7. Groupe diédral D_{12} .

- (a) Par définition, D_{12} est une partie de $\text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ et elle contient clairement $\text{id}_{\mathbb{C}}$. Soient $g, f \in D_{12}$. L'égalité $f(H) = H$ donne $f^{-1}(H) = H$ en prenant l'image par f^{-1} des deux membres. Donc, $g \circ f^{-1}(H) = g(H) = H$. Soient $z, w \in \mathbb{C}$. En notant $u = g^{-1}(z)$ et $v = g^{-1}(w)$, on a $|g(u) - g(v)| = |u - v|$, donc

$$|z - w| = |u - v| = |f(u) - f(v)| = |f \circ g^{-1}(z) - f \circ g^{-1}(w)|.$$

Donc, $f \circ g^{-1} \in D_{12}$, donc D_{12} est un sous-groupe de $\text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$.

- (b) Soit $f \in D_{12}$. Comme $1, \alpha \in H$ et que $f(H) \subset H$, $f(1)$ et $f(\alpha)$ sont dans H . De plus, $|f(\alpha) - f(1)| = |\alpha - 1| = |e^{i\pi/3} - 1| = 2 \sin(\pi/6) = 1$. Il est clair géométriquement (et on peut justifier par le calcul) que deux de H à distance 1 sont consécutifs.
- (c) Montrons d'abord l'injectivité. Si f et g sont dans D_{12} et vérifient $f(1) = g(1)$ et $f(\alpha) = g(\alpha)$, alors $f = g$. En effet, $(1, \alpha)$ est une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$; donc f et g sont déterminés par ce qu'elles valent en 1 et α . Montrons la surjectivité. On considère r la rotation de centre O et d'angle $\pi/3$; s la symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses. On montre rapidement que r et s sont dans D_{12} ; comme D_{12} est un groupe, il contient les éléments r^i et $r^i \circ s$, pour $i \in \llbracket 0, 5 \rrbracket$. En considérant les images de 1 et α , on constate que ces 12 éléments sont distincts. Comme il y a 12 paires de sommets consécutifs dans H , on a nécessairement la surjectivité annoncée.
- (d) Par ce qui précède, D_{12} est de cardinal 12. Il contient 6 rotations (dont l'identité) et 6 symétries axiales (3 axes passant par les sommets opposés ; 3 par les milieux des côtés opposés).

- (e) Avec les notations de la question c), on a $r(1) = \alpha$ et $r(\alpha) = \alpha^2 = \alpha - 1$; $s(1) = 1$, $s(\alpha) = -\alpha + 1$. En notant R et S les matrices de r et s dans la base $\mathbf{e}$, on a donc :

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, R et S sont dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ (elles sont à coefficients entiers et déterminant 1 ou -1) ; comme on a vu que r et s engendraient D_{12} et que $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ est un groupe, l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathbf{e}}(f)$ envoie bien D_{12} dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$. C'est un morphisme de groupes par restriction et corestriction de l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathbf{e}}(f)$ de $\text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ dans $\text{GL}_2(\mathbb{R})$. Enfin, cette application est injective car le morphisme précédent de $\text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ dans $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ est un isomorphisme de groupes.

2 Ordre des éléments de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$

8. Notons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On a donc $\text{Tr } A = a + d$ et $\det A = ad - bc$. On calcule :

$$\begin{aligned} \chi_A(A) &= A^2 - (\text{Tr } A)A + (\det A)I_2 \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} - (a + d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + (ad - bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \chi_A(A) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

9. Il existe $V \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{C}) - \{0\}$ tel que $AV = \lambda V$ ssi il existe $V \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{C}) - \{0\}$ tel que $(A - \lambda I_2)V = 0$ ssi $(A - \lambda I_2)$ est non inversible.
C'est équivalent à $\det(A - \lambda I_2) = 0$. Or,

$$\det(A - \lambda I_2) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = \chi_A(\lambda).$$

Donc λ est racine de χ_A ssi il existe $V \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{C}) - \{0\}$ tel que $AV = \lambda V$.

On considère donc un tel V . On a $AV = \lambda V$, donc par récurrence immédiate : $A^k V = \lambda^k V$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. En particulier, pour $k = m$: $V = A^m V = \lambda^m V$. Comme V est non nul, ceci implique $\lambda^m = 1$.

10. La trace de A est un entier car $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. De plus, comme $\chi_A = X^2 - (\text{Tr } A)X + \det A$, $\text{Tr } A$ est la somme des deux racines (éventuellement confondues, éventuellement complexes) de χ_A . Or, la question précédente, montre qu'une racine de χ_A est une racine de l'unité, donc de module 1. En notant λ_1, λ_2 les racines de χ_A , on a donc :

$$|\text{Tr}(A)| = |\lambda_1 + \lambda_2| \leq |\lambda_1| + |\lambda_2| = 2.$$

Donc $\text{Tr } A \in \llbracket -2, 2 \rrbracket$.

11. Comme $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$, on sait que $\det A = \pm 1$. De plus, on vient de montrer que $\text{Tr } A \in \llbracket -2, 2 \rrbracket$. On distingue maintenant selon le nombre de racines réelles de χ_A .

- Si χ_A a une racine réelle double, celle-ci est 1 ou -1 d'après la question précédente. Et alors $\chi_A = P_1$ ou P_2 .

- Si χ_A a deux racines réelles distinctes, ce sont nécessairement -1 et 1 et $\chi_A = P_3$.
- Si χ_A n'a pas de racines réelles, ses racines sont complexes conjuguées. Notons-les λ et $\bar{\lambda}$. Alors $|\text{Tr } A| = |\lambda + \bar{\lambda}| < |\lambda| + |\bar{\lambda}| = 2$ donc $\text{Tr } A = \pm 1$ et $\det A = \lambda \bar{\lambda} = 1$. Donc $\chi_A = P_4, P_5$ ou P_6 .

12. On pose :

$$\begin{aligned} \bullet A_1 &= I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; & \bullet A_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; & \bullet A_5 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \\ \bullet A_2 &= -I_2; & \bullet A_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; & \bullet A_6 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

En calculant trace et déterminant, on constate que pour chaque $i \in [1, 6]$, $\chi_{A_i} = P_i$. Et chaque $A_i \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. Il suffit donc de montrer que chacun des A_i est d'ordre fini. Des calculs rapides montrent que l'ordre de A_1 est 1 ; l'ordre de A_2 et A_3 est 2 ; l'ordre de A_4 est 4 ; l'ordre de A_5 est 6 et l'ordre de A_6 est 3.

13. Soit $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$ une matrice d'ordre fini, noté m . On a donc $A^m = I_2$. De plus, on sait que $\chi_A(A) = 0$ et on sait que χ_A est l'un des 6 polynômes énumérés précédemment. On raisonne selon la valeur de χ_A :

- Si $\chi_A = P_1$, on a $(A - I)^2 = 0$. Or,

$$A^m = ((A - I) + I)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (A - I)^k = I + m(A - I).$$

On en déduit donc, comme $m \geq 1$, que $A - I = 0$, donc $A = I_2$ et A est d'ordre 1.

- De même, si $\chi_A = P_2$, on montre que $A = -I_2$.
- Si $\chi_A = P_3$, on a $A^2 - I_2 = 0$, donc A est d'ordre fini divisant 2 (en fait 2).
- Si $\chi_A = P_4$, on a $A^2 + I_2 = 0$. Donc $A^4 - I_2 = (A^2 + I_2)(A^2 - I_2) = 0$. Donc A est d'ordre fini divisant 4 (en fait 4).
- Si $\chi_A = P_5$, on montre que $A^6 = I_2$. En effet,

$$X^6 - 1 = (X^2 - 1)(X^4 + X^2 + 1) = (X^2 - 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + X + 1).$$

Donc, comme $\chi_A(A) = 0$ et que $X^6 - 1$ est factorisable par χ_A , $A^6 - I_2 = 0$. Donc A est d'ordre fini divisant 6 (en fait 6).

- Si $\chi_A = P_6$, on a de même (en plus simple) :

$$A^3 - I_2 = (A - I_2)(A^2 + A + I_2) = 0,$$

donc $A^3 = I_2$ et A est d'ordre fini divisant 3 (en fait 3).

Remarque : il y a une différence de traitement entre les deux premiers cas et les autres. Pour les 4 derniers cas, il suffit de connaître χ_A pour montrer que A est d'ordre fini. Pour les deux premiers, ce n'est pas suffisant puisque I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont le même polynôme caractéristique, mais que les deux matrices ont respectivement un ordre égal à 1 et à l'infini. Ceci sera plus clair l'an prochain, avec l'étude de la réduction des endomorphismes.

3 Sous-groupes finis de $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$

14. (a) On note r le minimum des valuations p -adiques des coefficients de $M - I_n$ (comme $M \neq I_n$, $M - I_n$ a au moins un coefficient non nul et donc r est fini). Par hypothèse, $r \geq 1$. On note $N = p^{-r}(M - I_n)$. On a $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (car tout coefficient de $M - I_n$ est divisible par p^r) et $N \notin p\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (car au moins un coefficient de $M - I_n$ n'est pas divisible par p^{r+1}). Donc r et N conviennent.

- (b) On a $M^m = I_n$ donc

$$I_n = (I_n + p^r N)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} p^{rk} N^k.$$

(car I_n et $p^r N$ commutent)

Donc, $mp^r N = - \sum_{k=2}^m \binom{m}{k} p^{rk} N^k = -p^{2r} \sum_{k=2}^m \binom{m}{k} p^{r(k-2)} N^k$. Donc $mp^r N \in p^{2r} \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

En divisant par p^r , on a donc $mN \in p^r \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Comme $N \notin p\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, un des coefficients de N n'est pas divisible par p , donc est premier avec p . Comme m fois ce coefficient est divisible par p^r , p^r divise m . En particulier, p divise m .

- (c) $(M')^k = I_n \iff M^{pk} = I_n \iff m \mid pk \iff m' \mid k$. Donc M' est d'ordre m' . On calcule :

$$\begin{aligned} M' &= M^p \\ &= (I_n + p^r N)^p \\ &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} p^{rk} N^k \\ &= I_n + p^{r+1} N + \sum_{k=2}^p \binom{p}{k} p^{rk} N^k \\ &= I_n + p^{r+1} \left(N + \sum_{k=2}^p \binom{p}{k} p^{r(k-1)-1} N^k \right). \end{aligned}$$

On pose $N' = N + \sum_{k=2}^p \binom{p}{k} p^{r(k-1)-1} N^k$. Pour $k \in \llbracket 2, p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$. Pour $k = p$, on a $r(p-1) - 1 \geq 2r - 1 \geq 1$ car p est supposé ≥ 3 . Donc, p divise tous les coefficients des matrices dans la somme. Donc, les coefficients de N' sont congrus à ceux de N modulo p . En particulier, $N' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) - p\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $M' = I_n + p^{r+1} N'$.

- (d) M' vérifie les mêmes hypothèses que M ($M' \neq I_n$ d'après la conclusion de la question précédente), donc le même raisonnement donne $p \mid m'$, c'est-à-dire $p^2 \mid m$. En réitérant, on obtient que $p^k \mid m$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme m est supposé ≥ 1 , c'est absurde. Donc $M - I_n \notin p\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

15. On a $\phi(I_n) = I_n$, où I_n désigne à gauche la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et à droite celle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On a :

$$\phi(M + N) = \overline{M + N} = (\overline{m_{i,j} + n_{i,j}})_{i,j} = (\overline{m_{i,j}} + \overline{n_{i,j}})_{i,j} = \overline{M} + \overline{N} = \phi(M) + \phi(N).$$

Soient $i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a :

$$\phi(MN)_{i,k} = \overline{MN}_{i,k} = \sum_{j=1}^n \overline{m_{i,j} n_{j,k}} = \sum_{j=1}^n \overline{m_{i,j}} \times \overline{n_{j,k}} = \left(\overline{M} \times \overline{N} \right)_{i,k} = [\phi(M)\phi(N)]_{i,k}.$$

Donc $\phi(MN) = \phi(M)\phi(N)$. Donc ϕ est un morphisme d'anneaux.

Comme tout morphisme d'anneaux, ϕ induit un isomorphisme du groupe des inversibles de l'anneau de départ, vers le groupe des inversibles de l'anneau à l'arrivée ; donc de $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ dans $\text{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

16. Soit G un sous-groupe fini de $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$. Alors, $\phi|_G : G \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est un morphisme de groupes, par restriction. Soit $M \in G$ tel que $M \in \text{Ker } \phi$. Alors $\overline{M} = I_n$ (matrice identité à coefficients dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$). Cela revient à dire que $M - I_n \in p\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Or, comme M est élément d'un groupe fini, son ordre est fini. D'après la question 1., seule $M = I_n$ vérifie alors $M - I_n \in p\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Donc, $\text{Ker } \phi|_G = \{I_n\}$, donc ϕ est injective.

Ainsi, G est en bijection avec $\phi(G) \in \text{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Comme $|\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})| = p^{n^2}$, on a $|G| \leq p^{n^2}$. En particulier, $|G| \leq 3^{n^2}$.

17. On commence par compter le nombre de produits xy égaux à $\bar{0}$, $\bar{1}$ et $\bar{2}$, avec $x, y \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Il y a 9 produits xy ; 5 valent $\bar{0}$ (dès que x ou y est nul), 2 valent $\bar{1}$ ($\bar{1} \times \bar{1}$ et $\bar{2} \times \bar{2}$) et 2 valent $\bar{2}$ ($\bar{1} \times \bar{2}$ et $\bar{2} \times \bar{1}$).

Soit alors $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$. M est inversible ssi $\det M \neq \bar{0}$ ssi $ad \neq bc$. Avec le comptage fait ci-dessus et le principe de soustraction, on compte

$$3^4 - 5^2 - 2^2 - 2^2 = 48$$

telles matrices. Donc $|\text{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})| = 48$.

D'après la question précédente, il existe un morphisme injectif ϕ de G dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$. Alors, $|G| = |\phi(G)|$ et par le théorème de Lagrange, $|\phi(G)|$ divise $|\text{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})| = 48$.

18. On calcule $A^2 = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{2} \end{pmatrix}$, puis $A^4 = (A^2)^2 = \begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{2} \end{pmatrix}$ et finalement $A^8 = (A^4)^2 = I_2$. La dernière égalité montre que l'ordre de A divise 8, comme A , A^2 et A^4 sont différentes de I_2 , cet ordre est exactement 8.

Considérons maintenant $B \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$ d'ordre fini. D'après l'exercice précédent, B est d'ordre 1, 2, 3, 4 ou 6. Donc $\phi_3(B)^k = I_2$, pour un $k \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Donc, l'ordre de $\phi_3(B) \in \text{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ est un diviseur d'un élément dans $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, donc est un élément de $\{1, 2, 3, 4, 6\}$. En particulier, $\phi_3(B)$ n'est pas d'ordre 8.

Ainsi, la matrice A ne peut pas être dans l'image $\phi_3(G)$, si G est un sous-groupe fini de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$. Donc, $\phi_3(G)$ est un sous-groupe strict de $\text{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$. Donc $|G| = |\phi_3(G)|$ est un diviseur strict de 48.