Correction du TD d'application

I Exploitation de courbes de distribution

L'acide citrique $C_6H_8O_7$ est présent dans le jus de citron. C'est un tétra-acide noté H_4Cit , dont la 4^e acidité n'est pas observée dans l'eau. Les courbes représentées représentent le pourcentage de chacune des espèces lorsque le pH varie.

- 1) Associer à chaque courbe l'espèce correspondante.

Réponse

- 2) Déterminer par lecture graphique les pK_A des trois premières acidités.

Réponse

$$pK_{A,1} \approx 3 \quad ; \quad pK_{A,2} \approx 4,8 \quad ; \quad pK_{A,3} \approx 6,4$$

- 3) Le pH mesuré d'un jus de citron est de 2,5. Donner sa composition en terme de pourcentage de chaque espèce.

Réponse

$$\alpha(H_4Cit) \approx 69\% \quad ; \quad \alpha(H_3Cit^-) \approx 29\% \quad ; \quad \alpha(H_2Cit^{2-}) \approx 2\%$$

II Diacide fort

On considère une solution d'acide sulfurique H_2SO_4 de concentration $c_0 = 0,010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

- 1) En considérant que l'acide sulfurique est un diacide fort, calculer le pH de la solution.

Réponse

Un acide fort a une réaction totale avec l'eau :

Équation		$H_2SO_{4(aq)}$	+	$H_2O_{(l)}$	→	$SO_4^{2-}_{(aq)}$	+	$2H_3O^+_{(aq)}$
Initial	$x = 0$	c_0		excès		0		0
Final	$x_f = x_{\max}$	0		excès		c_0		$2c_0$

Ainsi,

$$[H_3O^+]_{\text{eq}} = 2c_0 \Leftrightarrow \boxed{\text{pH} = -\log(2c_0/c^\circ)} \Rightarrow \underline{\text{pH} = 1,7}$$

- 2) En réalité, la première acidité de l'acide sulfurique est forte, et la seconde a un $pK_A(\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}) = 1,9$. Déterminer le pH en tenant compte de cette modification.

Réponse

Seule la première réaction $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} = \text{HSO}_4^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ est totale, ce qui donne $[\text{H}_3\text{O}^+] = c_0 = [\text{HSO}_4^-_{(\text{aq})}]$. On part de cet état pour la seconde :

Équation		$\text{HSO}_4^-_{(\text{aq})}$	+	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	→	$\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$	+	$\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$
Initial	$x = 0$	c_0		excès		0		c_0
Final	$x_f = x_{\text{eq}}$	$c_0 - x_{\text{eq}}$		excès		x_{eq}		$c_0 + x_{\text{eq}}$

On calcule avec $K_A = 10^{-1,9}$:

$$K_A = \frac{x_{\text{eq}}(c_0 + x_{\text{eq}})}{(c_0 - x_{\text{eq}})c^\circ} \Leftrightarrow x_{\text{eq}}^2 + x_{\text{eq}}(c_0 + c^\circ K_A) - c_0 c^\circ K_A = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = (c_0 + c^\circ K_A)^2 + 4K_A c_0 c^\circ$$

$$\Rightarrow x_{\text{eq},\pm} = \frac{-(c_0 + c^\circ K_A) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

$x_+ > 0 \Rightarrow$

$$x_{\text{eq}} = 4,6 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Or,

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{c_0 + x_{\text{eq}}}{c^\circ}\right) \Rightarrow \text{pH} = 1,8$$

Ce qui reste globalement acide fort.

III États d'équilibres et stabilité

L'ion phosphate PO_4^{3-} est une base faible, qui intervient dans les couples $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$ de $pK_A = 12,3$. On l'introduit en solution aqueuse à la concentration initiale $c_0 = 1 \times 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

- 1) Déterminer la composition du système à l'équilibre, ainsi que le pH.

Réponse

Pour trouver la réaction en jeu, on trace l'échelle de pK_A . La réaction prépondérante est celle entre la base la plus forte, PO_4^{3-} , et l'acide le plus fort, ici l'eau. Ainsi :

Équation		$\text{PO}_4^{3-}_{(\text{aq})}$	+	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	→	$\text{HPO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$	+	$\text{HO}^-_{(\text{aq})}$
Initial	$x = 0$	c_0		excès		0		0
Final	$x_f = x_{\text{eq}}$	$c_0 - x_{\text{eq}}$		excès		x_{eq}		x_{eq}

Réaction défavorisée (γ) : $K^\circ = 10^{pK_a - pK_e} = 10^{-1,7}$; or

$$K^\circ = \frac{x_{\text{eq}}^2}{(c_0 - x_{\text{eq}})c^\circ} \Leftrightarrow x_{\text{eq}}^2 + K^\circ c^\circ x_{\text{eq}} - K^\circ c^\circ c_0 = 0$$

FIGURE TM4 ET 5.1 – Échelle pK_A

$$\Rightarrow \Delta = (K^\circ c^\circ)^2 + 4K^\circ c^\circ c_0 \quad \text{et} \quad x_{\text{eq},\pm} = -\frac{K^\circ c^\circ \pm \sqrt{\Delta}}{2} \Rightarrow \begin{cases} x_{\text{eq},-} = -5,6 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \\ x_{\text{eq},+} = 3,2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{cases}$$

La réaction étant en sens direct forcément (pas de réactifs au début), on prend la solution positive, et ainsi

$$x_{\text{eq}} = 3,2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Soit $[\text{PO}_4^{2-}]_{\text{eq}} = 6,3 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $[\text{HPO}_4^{2-}]_{\text{eq}} = 3,2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} = [\text{HO}^-]_{\text{eq}} \Leftrightarrow \text{pH} = 12,8$

On considère ensuite les couples acido-basiques suivants :

$$pK_{A,1}(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-) = 3,7 \quad pK_{A,2}(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5$$

- 2) Tracer un diagramme de prédominance contenant les domaines des 4 espèces à considérer.

- 3) Déterminer si deux mélanges suivants sont stables (aucune réaction quantitative n'a lieu) :

a - $n_{\text{HCOOH},0} = 1 \text{ mol}$ et $n_{\text{HClO},0} = 1 \text{ mol}$ dans $V = 1 \text{ L}$

Réponse

Les deux acides ont des domaines joints, ils ne peuvent donc **pas** réagir totalement entre eux. S'il y a une réaction, ça sera avec l'eau comme base ; or, les deux acides sont faibles donc leurs réaction avec l'eau sont limitées. On peut s'en convaincre avec une échelle en pK_A : réaction prépondérante défavorisée, mélange stable.

b - $n_{\text{ClO}^-,0} = 1 \text{ mol}$ et $n_{\text{HCOOH},0} = 1 \text{ mol}$ dans $V = 1 \text{ L}$

Réponse

ClO^- et HCOOH ont des domaines disjoints. Ils peuvent donc réagir quantitativement (i.e. totalement) ensemble, selon la valeur de K . Ici, on trouve $K = 10^{|\Delta pK_A|}$ puisque réaction favorisée/domaines disjoints/ γ direct, soit $K = 10^{3,8} > 10^3$. La réaction sera donc totale, et le **mélange n'est pas stable**.

IV Acide carbonique

On considère l'acide carbonique, un diacide ($pK_{A,1} = 6,4$ et $pK_{A,2} = 10,3$) dans l'eau.

- 1) Écrire les équilibres liant les espèces des couples $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$

Réponse

- 2) Exprimer les constantes d'acidité associées aux deux couples en fonction de concentrations à l'équilibre.

Réponse

$$K_1 = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}[\text{HCO}_3^-]_{\text{eq}}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{eq}}c^0} \quad \text{et} \quad K_2 = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}[\text{CO}_3^{2-}]_{\text{eq}}}{[\text{HCO}_3^-]_{\text{eq}}c^0}$$

3) Préciser sur un axe gradué en pH les domaines de prédominance des différentes espèces.

Réponse

4) Écrire la réaction entre H_2CO_3 et CO_3^{2-} . Quelle est la valeur de la constante d'équilibre ?

Réponse

Par différence, on trouve :

5) Déterminer l'espèce majoritaire dans les trois solutions S_1 , S_2 et S_3 caractérisées par :

a) $\text{pH}_{S_1} = 3$

b) $[\text{H}_3\text{O}^+]_{S_2} = 1 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

c) $[\text{HO}^-]_{S_3} = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

Réponse

a) Si $\text{pH} = 3$, H_2CO_3 prédomine ;

b) Si $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, alors $\text{pH} = 8$ et HCO_3^- prédomine ;

c) Si $[\text{HO}^-] = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, alors $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ puisque d'après le produit ionique de l'eau on a

$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]}{c^{\circ 2}} = 10^{-14}$$

D'où $\text{pH} = 12$ et CO_3^{2-} prédomine.

À retenir

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

V Solubilités dans l'eau pure de différents précipités

Déterminer la solubilité dans l'eau pure s de chacun des composés ci-dessous, en supposant que les ions formés lors de la dissociation des solides ne réagissent pas avec l'eau et que l'ion Zn^{2+} apparaît dans chaque dissolution.

1) $\text{ZnCO}_{3(\text{s})}$ de $\text{p}K_{s,1} = 10,8$.

Réponse

On trouve

$$c^{\circ 2} K_s = [\text{Zn}^{2+}]_{\text{eq}} [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{eq}} \Leftrightarrow c^{\circ 2} K_s = s^2$$

$$\Leftrightarrow s = c^{\circ} \sqrt{K_s} \Rightarrow s = 3,98 \times 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2) $\text{Zn}(\text{CN})_{2(\text{s})}$ de $\text{p}K_{s,2} = 12,6$.

Réponse

On trouve

$$c^{\circ 3} K_s = [\text{Zn}^{2+}]_{\text{eq}} [\text{CN}^-]_{\text{eq}}^2 \Leftrightarrow c^{\circ 3} K_s = s(2s)^2 = 4s^3$$

$$\Leftrightarrow s = c^{\circ} \left(\frac{K_s}{4} \right)^{1/3} \Rightarrow s = 3,97 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

- 3)
- $Zn_3(PO_4)_2(s)$
- de
- $pK_{s,3} = 32,0$
- .

Réponse

On trouve

$$c^{\circ 5} K_s = [Zn^{2+}]_{eq}^3 [PO_4^{3-}]_{eq}^2 \Leftrightarrow c^{\circ 5} K_s = (3s)^3 (2s)^2 = 108s^5$$

$$\Leftrightarrow s = c^{\circ} \left(\frac{K_s}{108} \right)^{1/5} \Rightarrow s = 1,56 \times 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

☆☆ VI | Domaine d'existence de l'hydroxyde de fer II

On considère l'hydroxyde de fer II $Fe(OH)_2$ de $pK_s = 15$.

- 1) Quelle est la valeur de
- $pOH = -\log \frac{[HO^-]}{c^{\circ}}$
- de début de précipitation de
- $Fe(OH)_2$
- à partir d'une solution en ions
- Fe^{2+}
- à la concentration
- $c_0 = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- ?

Réponse

Équation :

Condition d'existence limite :

$$\frac{[Fe^{2+}]_0 [HO^-]_{lim}^2}{c^{\circ 3}} = K_s \Leftrightarrow \frac{[HO^-]_{lim}}{c^{\circ}} = \sqrt{K_s \frac{c^{\circ}}{c_0}}$$

$$\Rightarrow [HO^-]_{eq} = 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \Leftrightarrow pOH = 6,5$$

- 2) En déduire le pH de début de précipitation.

Réponse

$$K_e = \frac{[H_3O^+]_{eq} [HO^-]_{eq}}{c^{\circ 2}} \Leftrightarrow pK_e = pH + pOH \Leftrightarrow pH = pK_e - pOH \Rightarrow pH = 7,5$$

- 3) Indiquer sur un diagramme, avec le pH en abscisse, les domaines de prédominance des ions
- Fe^{2+}
- et d'existence du solide.

Réponse

Le solide existe si les concentrations en ions sont suffisamment importantes. Donc, s'il y a assez des OH, on aura $Fe(OH)_{2(s)}$; en l'occurrence, c'est pour $pH = 7,5$ que le premier grain de solide apparaît.

☆☆ VII | Iodure de plomb

- 1) Une solution contient initialement des ions
- Pb^{2+}
- à la concentration
- $c = 1 \times 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- , et des ions iodure
- I^-
- de même concentration. On donne
- $pK_s(PbI_2) = 8$
- .

a – Déterminer les concentrations en ions Pb^{2+} et I^- dans l'état final.**Réponse**

Équation		$Pb_{(aq)}^{2+}$	+	$2I_{(aq)}^-$	=	$PbI_{2(s)}$
Initial	$\xi = 0$	cV		cV		0
Final	$\xi_f = \xi_{max}$	$cV - \xi_{max}$		$cV - 2\xi_{max}$		ξ_{max}

$$K^\circ = \frac{1}{K_s} = 10^8 \quad \text{et} \quad Q_{r,i} = \frac{c^{\circ 3}}{c^3} = 10^3 \ll 10^8$$

La réaction se fait donc dans le **sens direct** et est **totale**. On suppose donc que l'état final est $\xi_f = \xi_{\max}$, et on cherche $\xi_{\max}$:

$$\begin{cases} cV - \xi_{\max} = 0 \\ cV - 2\xi_{\max} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \xi_{\max} = cV \\ \xi_{\max} = \frac{cV}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\xi_{\max} = \frac{cV}{2}}$$

Ainsi

$$\boxed{n_{\text{PbI}_2, f} = \frac{cV}{2} \quad ; \quad [\text{I}^-]_f = \varepsilon \quad ; \quad [\text{Pb}^{2+}]_f = \frac{c}{2}}$$

Important

On vérifie l'hypothèse de totalité en calculant ε :

$$K = \frac{c^{\circ 2}}{\varepsilon \frac{c}{2}} \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{2}{Kc} = 2 \times 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \ll \frac{c}{2}$$

C'est bien vérifié ✓!

b – Même question si $c = 2 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

Réponse

$$c = 2 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \Rightarrow Q_{r,i} = 1,25 \times 10^{14} > K^\circ$$

On devrait donc aller dans le sens indirect, ce qui n'est pas possible : le système n'évolue pas.

2) a – Déterminer la solubilité de l'iodure de plomb dans de l'eau pure.

Réponse

Équation		$\text{PbI}_2(\text{s})$	=	$\text{Pb}_{(\text{aq})}^{2+}$	+	$2\text{I}_{(\text{aq})}^-$
Initial	$\xi = 0$	n		0		0
Final	$\xi_f = \xi_{\text{eq}}$	$n - \xi_{\text{eq}}$		ξ_{eq}		$2\xi_{\text{eq}}$

2 Par définition, $n_{\text{dis,max}} = \xi_{\text{eq}} = sV \Rightarrow \begin{cases} [\text{Pb}^{2+}]_{\text{eq}} = s \\ [\text{I}^-]_{\text{eq}} = 2s \end{cases}$

3 Or, $K_s = \frac{[\text{Pb}^{2+}]_{\text{eq}} \times [\text{I}^-]_{\text{eq}}^2}{c^{\circ 3}} = 4 \left(\frac{s}{c^\circ} \right)^3$

$$\Rightarrow \boxed{s = c^\circ \left(\frac{10^{-pK_s}}{4} \right)^{1/3}} \Rightarrow \underline{s = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} = 0,92 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

b – Même question dans une solution d'iodure de sodium (Na^+, I^-) de concentration $c = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Réponse

Équation		$\text{PbI}_2(\text{s})$	=	$\text{Pb}_{(\text{aq})}^{2+}$	+	$2\text{I}_{(\text{aq})}^-$
Initial	$\xi = 0$	n		0		cV
Final	$\xi_f = \xi_{\text{eq}}$	$n - \xi_{\text{eq}}$		ξ_{eq}		$cV + 2\xi_{\text{eq}}$

2 Par définition, $n_{\text{dis,max}} = \xi_{\text{eq}} = sV \Rightarrow \begin{cases} [\text{Pb}^{2+}]_{\text{eq}} = s \\ [\text{I}^-]_{\text{eq}} = c + 2s \end{cases}$

3 Or, $c^{\circ 3} K_s = s(c + 2s)^2 = sc^2 + 4cs^2 + 4s^3$

La résolution d'équation d'ordre 3 n'est pas au programme. On doit trouver une astuce nous permettant de négliger quelque chose. Ici, on peut supposer que $s \ll c$: en effet, dans le meilleur des cas avec le calcul précédent on a $s = 1,2 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et l'effet d'ion commun ne fait que baisser la solubilité, pas l'augmenter. Comme $c = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, cette hypothèse est plausible.

Dans ce cas, $c + 2s \approx c$, et ainsi

$$K_s = sc^2 \Leftrightarrow \boxed{s = \frac{K_s}{c^2}} \Rightarrow \underline{s = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}}$$

Ce qui vérifie par la même occasion l'hypothèse.