

Devoir en temps libre n° 1

Exercice 1. (*) Pour tout x réel, on pose

$$G(x) = \int_0^{\cos^2(x)} \operatorname{Arccos}(\sqrt{t}) \, dt + \int_0^{\sin^2(x)} \operatorname{Arcsin}(\sqrt{t}) \, dt.$$

- a. Montrer que la fonction G est bien définie. Vérifier également qu'elle est π -périodique et paire.
- b. Montrer que la fonction G est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et exprimer sa dérivée sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.
- c. Montrer que la fonction $\operatorname{Arccos} + \operatorname{Arcsin}$ est constante sur $[-1, 1]$, égale à $\pi/2$. Préciser la valeur de la constante.
- d. En déduire la valeur de $G(x)$ pour une valeur de x bien choisie.
- e. Donner une expression de $G(x)$ valable pour tout x réel.

Exercice 2. (*) Soient $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

- a. Montrer que le rang de $A \times B$ est majoré par 2.

Dans la suite, on suppose qu'il existe x réel tel que

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- b. Trouver la valeur de x puis déterminer des bases de $\operatorname{Im}(AB)$ et de $\operatorname{Ker}(AB)$.
- c. Montrer que A et B sont de rang 2.
- d. En déduire les égalités $\operatorname{Ker}(B) = \operatorname{Ker}(AB)$ et $\operatorname{Im}(A) = \operatorname{Im}(AB)$.
- e. Trouver des matrices A et B vérifiant les hypothèses de l'énoncé.

Exercice 3. (*) Pour tout entier $n \geq 2$, on considère la fonction polynomiale

$$f_n : x \mapsto x^n + x,$$

définie de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

a. Pour tout entier $n \geq 2$, prouver que l'équation $f_n(x) = 1$ possède une unique solution dans $[0, 1]$. Cette solution est notée x_n .

b. Pour tout entier $n \geq 2$, comparer les nombres $f_n(x_n)$ et $f_{n+1}(x_n)$. En déduire une inégalité entre x_n et x_{n+1} .

c. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

d. Au moyen d'une démonstration par l'absurde, justifier que la limite de cette suite vaut 1.

On pose $y_n = 1 - x_n$.

e. Pour tout entier $n \geq 2$, justifier l'égalité $\ln(y_n) = n \ln(1 - y_n)$.

f. Prouver que $\ln(y_n)$ est équivalent à $-\ln(n)$ quand n tend vers $+\infty$ et en déduire que y_n est équivalent à $\ln(n)/n$.

Exercice 4. (**) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $M(n)$ le plus grand des entiers m tels que $\binom{m}{n-1} > \binom{m-1}{n}$.

Trouver la limite de $M(n)/n$ quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 5. (*) Polynômes de Tchebychev

On définit une suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes réels en posant

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad \forall n \geq 2, \quad T_n = 2XT_{n-1} - T_{n-2}.$$

Les T_n sont les *polynômes de Tchebychev de première espèce*.

Partie I — étude des polynômes de Tchebychev

Question 1. Calculer les polynômes T_2, T_3, T_4 .

Question 2. Pour tout n dans \mathbb{N} et tout t réel, prouver l'égalité $T_n(\cos(t)) = \cos(nt)$.

Pour tout n dans \mathbb{N} , justifier que T_n est le seul polynôme vérifiant cette identité.

Question 3. Trouver le degré et le coefficient dominant de T_n .

Question 4. Étudier la parité de T_n .

Question 5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre l'équation $T_n(\cos(t)) = 0$. En déduire la factorisation de T_n .

Question 6. Factoriser également le polynôme T'_n .

Question 7. À l'aide de la formule de Moivre, exprimer $\cos(nt)$ comme un polynôme en $\cos(t)$ et en déduire une formule explicite de T_n .

Quelles propriétés démontrées ci-dessus pourraient être redémontrées à partir de cette formule ?

Partie II — étude d'un produit scalaire

Pour tout couple (P, Q) d'éléments de $\mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P, Q) = \int_0^\pi P(\cos(t)) Q(\cos(t)) dt$.

Question 8. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

Question 9. Soient P un polynôme pair et Q un polynôme impair. Montrer que P et Q sont orthogonaux pour φ .

Question 10. Vérifier que $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille orthogonale de $\mathbb{R}[X]$ pour ce produit scalaire.

Question 11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout élément $a = (a_0, \dots, a_{n-1})$ de \mathbb{R}^n , on pose

$$F_n(a) = \int_0^\pi \left(\cos^n(t) - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cos^k(t) \right)^2 dt.$$

Montrer que la fonction F_n possède un minimum sur \mathbb{R}^n et trouver sa valeur.

Exercice 6. ()** On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *additive*, ce qui signifie qu'elle vérifie l'identité

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y).$$

a. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, prouver la relation $f(nx) = nf(x)$.

b. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $q \in \mathbb{Q}$, prouver la relation $f(qx) = qf(x)$.

c. Dans cette question, on suppose que f est continue en 0. Montrer alors que f est continue sur \mathbb{R} puis prouver l'identité

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = f(1) \times x.$$

d. Dans cette question, on suppose que f est monotone. Obtenir la même conclusion qu'à la question précédente.

Exercice 7. Piocher parmi les exercices des fiches de TD qui n'ont pas été traités en classe.