

Chapitre 11 — probabilités

1 Probabilité sur un ensemble fini : révisions et compléments

Parcours du poly associé.

2 Ensembles dénombrables

2.1 Définition et exemples

Définition d'un ensemble dénombrable : c'est un ensemble en bijection avec $\mathbb{N}$.

Exemples : l'ensemble $\mathbb{Z}$, l'ensemble des nombres pairs, toute partie infinie de $\mathbb{N}$.

Tout ensemble infini qui s'injecte dans $\mathbb{N}$ est dénombrable. Exemples : les ensembles $\mathbb{N}^k$ et $\mathbb{Q}$.

2.2 Exemples d'ensembles non dénombrables

L'ensemble $\{a, b\}^{\mathbb{N}}$, l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$, l'ensemble $\mathbb{R}$.

3 Espaces probabilisés

3.1 Tribu

Une *tribu* sur un ensemble Ω est un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ qui possède Ω pour élément, stable par passage au complémentaire et par réunion dénombrable.

Propriétés : $\emptyset \in \mathcal{A}$, stabilité par intersection dénombrable, stabilité par réunion finie, stabilité par intersection finie.

L'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω .

Un *espace probabilisable* est un couple d'ensembles $(\Omega, \mathcal{A})$ tel que $\mathcal{A}$ soit une tribu sur Ω . Les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés *événements*.

Système complet d'événements dénombrable.

3.2 Probabilité sur un espace probabilisable

Une *probabilité* sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$ est une fonction $\mathbb{P}$ définie sur $\mathcal{A}$, à valeurs réelles positives, telle que $\mathbb{P}(\Omega)$ soit égal à 1 et telle que la relation

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

soit valable pour toute suite $(A_n)_{n \geq 0}$ d'événements deux à deux incompatibles (propriété de σ -additivité).

Le triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est alors un *espace probabilisé*.

Les formules présentées dans le cas d'un espace probabilisé fini demeurent vraies dans ce contexte.

Continuité croissante. Si $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante (pour l'inclusion) d'événements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Continuité décroissante. Si $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite décroissante (pour l'inclusion) d'événements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Sous-additivité. Si $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite quelconque d'événements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

3.3 Conditionnement et indépendance

Définition de $\mathbb{P}(A|B)$, également notée $\mathbb{P}_B(A)$, dans le cas où $\mathbb{P}(B)$ est non nul. La fonction $\mathbb{P}_B$ est alors une probabilité sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A})$.

Formule des probabilités composées.

Système complet dénombrable d'événements. Formules des probabilités totales

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_{A_n}(B) \mathbb{P}(A_n)$$

dans le cas où la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. La formule reste valable dans le cas où la suite $(A_n)_{n \geq 0}$ vérifie les hypothèses plus faibles $\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = 0$ si $i \neq j$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1$.

Formule de Bayes.

Indépendance de deux événements. Si $\mathbb{P}(B)$ n'est pas nul, l'indépendance de A et B équivaut à $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$.

Indépendance mutuelle d'une famille finie d'événements. L'indépendance des événements deux par deux ne suffit pas s'il y a au moins trois événements.

4 Variables aléatoires discrètes

4.1 Variable aléatoire discrète

Une *variable aléatoire discrète* X sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$ est une fonction définie sur Ω telle que l'univers image $X(\Omega)$ soit fini ou dénombrable et telle que pour tout x de $X(\Omega)$, l'image réciproque $X^{-1}(\{x\})$ soit un élément de $\mathcal{A}$ (c'est-à-dire un événement).

Pour toute partie U de l'univers image $X(\Omega)$, l'ensemble $X^{-1}(U)$ est un événement.

L'événement $X^{-1}(U)$ est noté $[X \in U]$ ou $\{X \in U\}$ ou $\{X \in U\}$.

4.2 Loi d'une variable aléatoire discrète

Loi d'une variable aléatoire discrète.

Fonction de répartition. Croissance. Limites.

Théorème d'existence (admis) : si X prend ses valeurs dans $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ et si $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de nombres réels positifs dont la somme vaut 1, alors il existe sur $(\Omega, \mathcal{A})$ une probabilité $\mathbb{P}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = x_n) = p_n.$$

4.3 Couple de variables aléatoires discrètes

Loi conjointe. Lois marginales.

Loi conditionnelle de Y sachant $[X = x]$.

4.4 Indépendance

Dire que les variables aléatoires X et Y sont *indépendantes* signifie

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]) = \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y).$$

Si X et Y sont indépendantes, alors, pour toutes parties A de $X(\Omega)$ et B de $Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}([X \in A] \cap [Y \in B]) = \mathbb{P}(X \in A) \times \mathbb{P}(Y \in B).$$

Si X et Y sont indépendantes, alors, pour toutes fonctions f et g telles que $f(X)$ et $g(Y)$ soient bien définies, les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Variables aléatoires mutuellement indépendantes.

Suites de variables aléatoires mutuellement indépendantes. Jeu de pile ou face infini.

5 Moments

5.1 Espérance

On note $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ l'univers image de la variable aléatoire X . Dire que la variable aléatoire X est *d'espérance finie* signifie que la série de terme général $x_n \mathbb{P}(X = x_n)$ est absolument convergente. Si tel est le cas, *l'espérance* de la variable aléatoire X est la somme de cette série, notée $\mathbb{E}(X)$.

On admet que si on change la numérotation des éléments de l'univers image $X(\Omega)$, alors la valeur de l'espérance reste inchangée.

Dans le cas où X est à valeurs dans $\mathbb{N}$, l'espérance de X est reliée à la fonction de répartition par la formule

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n).$$

Critère de domination (pas au programme) : si $|X| \leq Y$ et si Y est d'espérance finie, alors X est d'espérance finie aussi.

5.2 Théorème du transfert

Soit f une fonction définie sur l'univers image $X(\Omega)$. La variable aléatoire $f(X)$ est d'espérance finie si, et seulement si, la série de terme général $f(x_n) \mathbb{P}(X = x_n)$ converge absolument. Si c'est le cas, on obtient alors

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(x_n) \mathbb{P}(X = x_n).$$

5.3 Propriétés algébriques

Linéarité de l'espérance. Positivité, croissance.

Formule $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ dans le cas où X et Y sont indépendantes.

Si X^2 est d'espérance finie, alors X l'est aussi.

Si X^2 et Y^2 sont d'espérance finie, alors XY l'est aussi.

5.4 Variance et covariance

Variance et écart-type d'une variable aléatoire discrète X telle que X^2 soit d'espérance finie.

Identité $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$.

Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev.

Covariance. Variance d'une somme finie. Cas où les variables aléatoires sont deux à deux indépendantes.

Coefficient de corrélation. Encadrement $|\rho(X, Y)| \leq 1$ (inégalité de Cauchy-Schwarz).

5.5 Série génératrice d'une variable aléatoire à valeurs entières

La *série génératrice* d'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ est la série entière

$$\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X = n) t^n.$$

Le rayon de convergence vaut au moins 1. La *fonction génératrice* de X est alors la fonction

$$G_X : t \mapsto \mathbb{E}(t^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) t^n.$$

L'existence de $\mathbb{E}(X)$ équivaut à la dérivabilité de G_X en 1. Dans ce cas, l'espérance de X vaut $G'_X(1)$.

L'existence de $\mathbb{V}(X)$ équivaut à l'existence de $G''_X(1)$. Formule donnant $\mathbb{V}(X)$.

Fonction génératrice G_{X+Y} dans le cas où X et Y sont indépendantes.

6 Lois usuelles

6.1 Loi géométrique

Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. Fonction génératrice, espérance et variance.

Elle modélise le rang du premier succès dans une suite illimitée d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p .

Caractérisation comme loi sans mémoire

$$\mathbb{P}(X > n + k | X > n) = \mathbb{P}(X > k).$$

6.2 Loi de Poisson

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Fonction génératrice, espérance et variance.

Somme de deux variables indépendantes suivant une loi de Poisson.

6.3 Complément : loi binomiale négative

Loi de la somme $X_1 + \dots + X_m$, où les X_i sont mutuellement indépendantes et suivent la loi $\mathcal{G}(p)$.

Interprétation : rang du m -ième succès dans une suite infinie de pile ou face.

7 Propriétés asymptotiques

7.1 Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi. On suppose que $(X_1)^2$ est d'espérance finie.

On note $m = \mathbb{E}(X_1)$ et $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - m \right| \geq \varepsilon \right) = 0.$$

Interprétation : la moyenne expérimentale est probablement proche de la moyenne théorique.

7.2 Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson

Soit $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $]0, 1[$. Soit $\lambda > 0$. On suppose que np_n tend vers λ quand n tend vers $+\infty$.

Pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, on considère une variable aléatoire X_n de loi $\mathcal{B}(n, p_n)$. Alors, pour tout k dans $\mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Programme de colles n° 8 (du lundi 23 janvier au vendredi 3 février 2017)

Tout ce chapitre.

Pas de questions de cours imposées.
