I endomorphismes symétriques

Définition (1)

Soit $(E, \langle | \rangle)$ un espace euclidien réel réel. On dit qu'un endomorphisme u de E est **symétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | y \rangle = \langle x | u(y) \rangle \quad (1)$$

Définition (1)

Soit $(E, \langle | \rangle)$ un espace euclidien réel réel. On dit qu'un endomorphisme u de E est **symétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | y \rangle = \langle x | u(y) \rangle \quad (1)$$

Définition (1)

Soit $(E, \langle | \rangle)$ un espace euclidien réel réel. On dit qu'un endomorphisme u de E est **symétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | y \rangle = \langle x | u(y) \rangle \quad (1)$$

Exemple (1)

Les homothéties vectorielles, les projecteurs et les symétries orthogonales sont des endomorphismes symétriques.

Réciproquement, les projecteurs et les symétries symétriques sont orthogonaux

1 endomorphismes symétriques

Définition (1)

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien réel réel. On dit qu'un endomorphisme u de E est **symétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | y \rangle = \langle x | u(y) \rangle \quad (1)$$

Exemple (1)

Les homothéties vectorielles, les projecteurs et les symétries orthogonales sont des endomorphismes symétriques.

Réciproquement, les projecteurs et les symétries symétriques sont orthogonaux

Démonstration.

$\forall (x, y) \in E^2 \langle x - p(x) | p(y) \rangle = 0 = \langle p(x) | y - p(y) \rangle$ D'où..
 $s_F = 2p_F - Id_E$ d'où..

Théorème (2. Structure)

L'ensemble $S(E)$ des endomorphismes symétriques de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Théorème (2. Structure)

L'ensemble $S(E)$ des endomorphismes symétriques de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Démonstration.

$$\forall (u, v) \in S(E)^2 \forall \lambda \in \mathbb{R} \langle (\lambda u + v)(x) | y \rangle = ..$$

Théorème (2. Structure)

L'ensemble $S(E)$ des endomorphismes symétriques de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Démonstration.

$$\forall (u, v) \in S(E)^2 \forall \lambda \in \mathbb{R} \langle (\lambda u + v)(x) | y \rangle = ..$$

Théorème (2. Structure)

L'ensemble $S(E)$ des endomorphismes symétriques de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Démonstration.

$\forall (u, v) \in S(E)^2 \forall \lambda \in \mathbb{R} \langle (\lambda u + v)(x) | y \rangle = ..$

Théorème (3. Caractérisation)

*Un endomorphisme de E est symétrique si et seulement si sa matrice relativement à une **base orthonormée** est symétrique .*

Théorème (2. Structure)

L'ensemble $S(E)$ des endomorphismes symétriques de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Démonstration.

$$\forall (u, v) \in S(E)^2 \forall \lambda \in \mathbb{R} \langle (\lambda u + v)(x) | y \rangle = ..$$

Théorème (3. Caractérisation)

Un endomorphisme de E est symétrique si et seulement si sa matrice relativement à une **base orthonormée** est symétrique .

Démonstration.

$$\forall (i, j) \in |1, n|^2 \langle s(e_i) | e_j \rangle = \langle e_i | s(e_j) \rangle .. \text{Réciproquement..}$$

II automorphismes orthogonaux

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y) \rangle = \langle x|y \rangle$.

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y) \rangle = \langle x|y \rangle$.

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y) \rangle = \langle x|y \rangle$.

Exemple

Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y)\rangle = \langle x|y\rangle$.

Exemple

Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y) \rangle = \langle x|y \rangle$.

Exemple

Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux

Théorème

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y) \rangle = \langle x|y \rangle$.

Exemple

Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux

Théorème

- 1 *Un endomorphisme u de E est orthogonal $\iff$ il conserve la norme*

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y)\rangle = \langle x|y\rangle$.

Exemple

Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux

Théorème

- 1 *Un endomorphisme u de E est orthogonal $\iff$ il conserve la norme*
- 2 *Un endomorphisme orthogonal de E est en fait un automorphisme. u est un automorphisme orthogonal de E*

II automorphismes orthogonaux

Définition (Endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien)

Définition : On dit qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est orthogonal lorsque $\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x)|u(y)\rangle = \langle x|y\rangle$.

Exemple

Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux

Théorème

- 1 *Un endomorphisme u de E est orthogonal $\iff$ il conserve la norme*
- 2 *Un endomorphisme orthogonal de E est en fait un automorphisme. u est un automorphisme orthogonal de E*
- 3 *$O(E)$: ensemble des automorphismes orthogonaux de E .
 $(O(E), \circ)$ est un groupe : groupe orthogonal de E*

II automorphismes orthogonaux

Démonstration.

① Si u est orthogonale : $\forall x \in E \quad \|u(x)\|^2 = \|x\|^2$.

Réciproquement, on utilise la polarisation :

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | u(y) \rangle =$$

$$\frac{1}{4} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) = \dots$$

Théorème

Un endomorphisme de E est orthogonal $\iff$ Il transforme une (toute) base orthonormale de E en une base orthonormale.

II automorphismes orthogonaux

Démonstration.

① Si u est orthogonale : $\forall x \in E \quad \|u(x)\|^2 = \|x\|^2$.

Réciproquement, on utilise la polarisation :

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | u(y) \rangle =$$

$$\frac{1}{4} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) = \dots$$

② $\forall x \in E \quad u(x) = 0_E \iff \|u(x)\| = 0 \iff \dots$

Théorème

Un endomorphisme de E est orthogonal $\iff$ Il transforme une (toute) base orthonormale de E en une base orthonormale.

II automorphismes orthogonaux

Démonstration.

① Si u est orthogonale : $\forall x \in E \quad \|u(x)\|^2 = \|x\|^2$.

Réciproquement, on utilise la polarisation :

$$\forall (x, y) \in E^2 \langle u(x) | u(y) \rangle =$$

$$\frac{1}{4} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) = ..$$

② $\forall x \in E \quad u(x) = 0_E \iff \|u(x)\| = 0_E \iff \dots$

③ On montre que c'est un sous-groupe de $(GL(E), \circ)$, c'est-à-dire qu'il est non vide, stable par $\circ$ et passage à l'inverse.

Théorème

Un endomorphisme de E est orthogonal $\iff$ Il transforme une (toute) base orthonormale de E en une base orthonormale.

Matrices orthogonales

Définition

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale $\iff$ l'endomorphisme canoniquement associé est orthogonal (pour le produit scalaire canonique). Ensemble des matrices orthogonales $O(n)$

Matrices orthogonales

Définition

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale $\iff$ l'endomorphisme canoniquement associé est orthogonal (pour le produit scalaire canonique). Ensemble des matrices orthogonales $O(n)$

Théorème

$$M \in O(n) \iff {}^tMM = I_n \iff M^tM = I_n$$

$$M \in O(n) \iff M \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } M^{-1} = {}^tM$$

$M \in O(n) \iff$ les colonnes de M forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$

Matrices orthogonales

Définition

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale $\iff$ l'endomorphisme canoniquement associé est orthogonal (pour le produit scalaire canonique). Ensemble des matrices orthogonales $O(n)$

Théorème

$$M \in O(n) \iff {}^tMM = I_n \iff M^tM = I_n$$

$$M \in O(n) \iff M \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } M^{-1} = {}^tM$$

$M \in O(n) \iff$ les colonnes de M forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$

Définition

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale $\iff$ l'endomorphisme canoniquement associé est orthogonal (pour le produit scalaire canonique). Ensemble des matrices orthogonales $O(n)$

Théorème

$$M \in O(n) \iff {}^tMM = I_n \iff M^tM = I_n$$

$$M \in O(n) \iff M \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } M^{-1} = {}^tM$$

$M \in O(n) \iff$ les colonnes de M forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$

Démonstration.

$$({}^tMM)_{i,j} = \langle u(e_i) | u(e_j) \rangle$$

1

Théorème

$M \in O(n) \Rightarrow \det(M) \in \{-1, 1\}$ (*Réciproque fausse*)

1

Théorème

$M \in O(n) \Rightarrow \det(M) \in \{-1, 1\}$ (*Réciproque fausse*)

Démonstration.

${}^tMM = I_n$ donc $\det({}^tMM) = 1 = \det(M)^2$ □

1

Théorème

$M \in O(n) \Rightarrow \det(M) \in \{-1, 1\}$ (*Réciproque fausse*)

Démonstration.

${}^tMM = I_n$ donc $\det({}^tMM) = 1 = \det(M)^2$ □

1

2

Théorème

$M \in O(n) \Rightarrow \det(M) \in \{-1, 1\}$ (Réciproque fausse)

Démonstration.

${}^tMM = I_n$ donc $\det({}^tMM) = 1 = \det(M)^2$ □

1

Théorème

$(O(n), \cdot)$ est un groupe appelé groupe orthogonal d'ordre n . En particulier : $(A, B) \in O(n)^2 \Rightarrow AB \in O(n)$ et $A \in O(n) \Rightarrow A^{-1} \in O(n)$

2

Théorème

$M \in O(n) \Rightarrow \det(M) \in \{-1, 1\}$ (Réciproque fausse)

Démonstration.

${}^tMM = I_n$ donc $\det({}^tMM) = 1 = \det(M)^2$ □

1

Théorème

$(O(n), \cdot)$ est un groupe appelé groupe orthogonal d'ordre n . En particulier : $(A, B) \in O(n)^2 \Rightarrow AB \in O(n)$ et $A \in O(n) \Rightarrow A^{-1} \in O(n)$

2

3

Théorème

$M \in O(n) \Rightarrow \det(M) \in \{-1, 1\}$ (Réciproque fausse)

Démonstration.

${}^tMM = I_n$ donc $\det({}^tMM) = 1 = \det(M)^2$ □

1

Théorème

$(O(n), \cdot)$ est un groupe appelé groupe orthogonal d'ordre n . En particulier : $(A, B) \in O(n)^2 \Rightarrow AB \in O(n)$ et $A \in O(n) \Rightarrow A^{-1} \in O(n)$

2

Théorème

$SO(n) = \{r \in O(n) \mid \det(r) = 1\}$ est un sous-groupe de $O(n)$.

3

Propriétés

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

- 1 Une famille $B' \in E^n$ est une base orthonormée ssi $\text{Mat}_B(B') \in O(n)$.

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

- ① Une famille $B' \in E^n$ est une base orthonormée ssi $\text{Mat}_B(B') \in O(n)$.
- ② $u \in \mathcal{L}(E)$ est orthogonale $\iff \text{Mat}_B(u) \in O(n)$

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

- 1 Une famille $B' \in E^n$ est une base orthonormée ssi $\text{Mat}_B(B') \in O(n)$.
- 2 $u \in \mathcal{L}(E)$ est orthogonale $\iff \text{Mat}_B(u) \in O(n)$
- 2 Changement de base orthonormale : $X = PX'$ (coordonnées).
 $\text{Mat}_{B'}(u) = {}^t P \text{Mat}_B(u) P$ où $P = P_{B \rightarrow B'}$

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

- 1 Une famille $B' \in E^n$ est une base orthonormée ssi $\text{Mat}_B(B') \in O(n)$.
- 2 $u \in \mathcal{L}(E)$ est orthogonale $\iff \text{Mat}_B(u) \in O(n)$
- 2 Changement de base orthonormale : $X = PX'$ (coordonnées).
 $\text{Mat}_{B'}(u) = {}^t P \text{Mat}_B(u) P$ où $P = P_{B \rightarrow B'}$
- 3 Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

- 1 Une famille $B' \in E^n$ est une base orthonormée ssi $\text{Mat}_B(B') \in O(n)$.
- 2 $u \in \mathcal{L}(E)$ est orthogonale $\iff \text{Mat}_B(u) \in O(n)$
- 2 Changement de base orthonormale : $X = PX'$ (coordonnées).
 $\text{Mat}_{B'}(u) = {}^t P \text{Mat}_B(u) P$ où $P = P_{B \rightarrow B'}$
- 3 Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.
- 4 $SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$: ensemble des rotations vectorielles.

Propriétés

Théorème

E espace euclidien, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}^*$, B base orthonormée de E .

- 1 Une famille $B' \in E^n$ est une base orthonormée ssi $\text{Mat}_B(B') \in O(n)$.
- 2 $u \in \mathcal{L}(E)$ est orthogonale $\iff \text{Mat}_B(u) \in O(n)$
- 2 Changement de base orthonormale : $X = PX'$ (coordonnées).
 $\text{Mat}_{B'}(u) = {}^t P \text{Mat}_B(u) P$ où $P = P_{B \rightarrow B'}$
- 3 Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.
- 4 $SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$: ensemble des rotations vectorielles.
- 5 Si s est une réflexion, alors $\det(s) = -1$

b]

Théorème (4.Diagonalisation des endomorphismes symétriques)

Tout endomorphisme symétrique s est diagonalisable. Les valeurs propres de s sont réelles Les sous-espaces propres sont en somme directe orthogonale. Il existe une base orthonormale de vecteurs propres

Démonstration.

Contentons-nous d'examiner les deux derniers points. Soit

$(\lambda, \mu) \in sp(u)^2, \lambda \neq \mu.$

$\forall (x, y) \in E_\lambda(u) \times E_\mu(u) \langle u(x)|y \rangle = \langle \lambda x|y \rangle = \langle x|u(y) \rangle = \langle x|\mu y \rangle$

d'où.... . Pour construire une base orthonormée de vecteurs propres, il suffit alors de considérer une base orthonormale de chaque sous-espace propre, et..

3) Applications aux matrices carrées réelles symétriques

- 1 Toute matrice symétrique carrée réelle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale

3) Applications aux matrices carrées réelles symétriques

- 1 Toute matrice symétrique carrée réelle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale
- 2 Plus précisément, il existe D diagonale réelle telle que.
 $D = {}^t P A P$ où $P \in O(n)$

3) Applications aux matrices carrées réelles symétriques

- 1 Toute matrice symétrique carrée réelle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale
- 2 Plus précisément, il existe D diagonale réelle telle que.
 $D = {}^t P A P$ où $P \in O(n)$
- 3 A revoir $O(2), SO(2), SO(3)$ (cours 1 année)