

PC Lakanal - Mathématiques - DS N°3 - sujet soft

Durée : 4 heures

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Ce sujet est constitué d'un problème d'analyse, et d'un (gros) exercice d'algèbre. Il comporte 5 pages

Les calculatrices sont interdites

Problème

On s'intéresse ici à des suites et séries de fonctions en liaison avec des intégrales.

Dans la partie **I**, on calcule indépendamment deux intégrales particulières (les questions 1 et 2 pour l'une, la question 3 pour l'autre) qui interviennent dans les parties **II** et **III**. Les parties **II** et **III** sont indépendantes.

Partie I : calculs préliminaires

- Justifier l'existence de l'intégrale $K = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$.
- Pour tout $A > 0$, justifier l'existence de l'intégrale $D(A) = \int_0^A \frac{\sin(t)}{t} dt$.
- Grâce à une intégration par parties, prouver que $D(A)$ a une limite (réelle) quand A tend vers $+\infty$, égale à K , c'est-à-dire que : $K = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} D(A)$.
- Justifier que l'application $L: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} e^{-tx} dt$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
- Montrer que, pour tout réel $a > 0$, l'application L est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intervalle $[a, +\infty[$. Établir ensuite que l'application L est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
- Justifier que les fonctions $t \mapsto \frac{1 - \cos(t)}{t^2}$ et $t \mapsto \frac{1 - \cos(t)}{t}$ sont bornées sur $]0, +\infty[$.
Établir alors que les fonctions $x \mapsto |xL'(x)|$ et $x \mapsto |xL(x)|$ sont majorées sur $\mathbb{R}_+^*$.
En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} L'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} L(x) = 0$.
- Pour tout réel $x > 0$, exprimer $L''(x)$ sans utiliser d'intégrale.
On pourra remarquer que $\cos(t) = \operatorname{Re}(e^{it})$.
- En déduire $L'(x)$ pour $x > 0$, puis $L(x)$ pour $x \geq 0$. Conclure que $K = \frac{\pi}{2}$.
- Justifier que la fonction $u \mapsto \frac{\ln(u)}{u-1}$ est intégrable sur $]0, 1[$.
- Pour tout $k \in \mathbb{N}$, justifier l'existence et calculer $\int_0^1 u^k \ln(u) du$.
- Grâce à un développement en série de $\frac{1}{1-u}$ pour $u \in]0, 1[$ et en précisant le théorème utilisé, justifier que :

$$\int_0^1 \frac{\ln(u)}{u-1} du = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^2}.$$

Par ailleurs, on donne sans avoir à le justifier : $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Partie II : étude de quelques suites d'intégrales

- Rappeler avec précision le théorème de convergence dominée.

13. On considère ici une application continue $f: [0, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 f(t^n) dt$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

14. On suppose ici de plus que $u \mapsto \frac{f(u)}{u}$ est intégrable sur $]0, 1]$.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n$. On pourra transformer nI_n grâce à un changement de variable.

15. Application 1.

Déterminer un équivalent quand $n \rightarrow +\infty$ de $\int_0^1 \sin(t^n) dt$ (grâce à une intégrale).

On considère maintenant que $f: [0, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ est une application continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

16. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Grâce à un changement de variable approprié, justifier l'existence de $A_n = \int_1^{+\infty} f(t^n) dt$.

17. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nA_n$ (grâce à une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer).

18. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, et tout $A > 1$, on pose $C_n(A) = \int_1^A \sin(t^n) dt$.

Grâce à un changement de variable et une intégration par parties, exprimer $C_n(A)$ en fonction de $\int_1^{A^n} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} u^{\frac{1}{n}} du$ et de A .

19. En déduire que $C_n(A)$ a une limite quand $A \rightarrow +\infty$, prouvant l'existence de $\int_1^{+\infty} \sin(t^n) dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

20. Application 2.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^{+\infty} \sin(t^n) dt$ grâce à K calculée en **I-2.5**.

Partie III : étude de séries de fonctions

21. Un premier exemple. On pose quand c'est possible, $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^n$.

a. Pour tout $x \in]-1, 1[$, calculer $F(x)$ ainsi que $F'(x)$.

b. Déterminer $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} F(x)$, $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (1-x)F(x)$, $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (1-x)F'(x)$ et $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (1-x)^2 F'(x)$.

22. Un deuxième exemple. Dans cette question, pour tout $x \in]-1, 1[$, on pose cette fois : $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^n}$.

a. Soit $a \in]0, 1[$. Prouver la convergence normale de cette série de fonctions sur le segment $[-a, a]$.

En déduire que F est définie et continue sur $] -1, 1[$.

b. Montrer que, pour tout $x \in]0, 1[$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{1-x^n}{1-x} \leq n$.

En déduire $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} F(x)$ et $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (1-x)F(x)$.

23. Dans cette question, f est une application réelle continue et croissante sur $[0, 1[$ avec $f(0) = 0$ et telle que $u \mapsto \frac{f(u)}{u}$ soit intégrable sur $]0, 1[$.

Soit $x \in]0, 1[$.

a. Justifier l'existence de $G(x) = \int_0^{+\infty} f(x^t) dt$ et l'égalité $G(x) = -\frac{1}{\ln(x)} \int_0^1 \frac{f(u)}{u} du$.

b. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, justifier l'encadrement :

$$\int_n^{n+1} f(x^t) dt \leq f(x^n) \leq \int_{n-1}^n f(x^t) dt.$$

c. En déduire l'existence de $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f(x^n)$, ainsi qu'un encadrement de $F(x)$ par deux intégrales dépendant de x .

- d. Conclure avec soin que $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (1-x)F(x) = \int_0^1 \frac{f(u)}{u} du$.

24. Un dernier exemple.

Pour tout $x \in]-1, 1[$, on pose enfin cette fois : $F(x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1-x^n)$.

- a. Montrer que F est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[$ et exprimer sa dérivée sous la forme d'une série de fonctions.
- b. Grâce à **Q23.d.**, montrer que $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} (1-x)F(x) = \int_0^1 \frac{\ln(u)}{u-1} du$ étudiée en **Q11**.
- c. Par une méthode similaire à celle de **Q23**, montrer que :

$$\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} \left((1-x)^2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^n}{1-x^n} \right) = \int_0^1 \frac{\ln(u)}{u-1} du.$$

En déduire $\lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} ((1-x)^2 F'(x))$.

Fin du problème