

Liste d'exercices

Séries entières

Exercice 1

Déterminer, dans chacun des cas suivants, le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$.

1. (a_n) admet une limite finie non nulle.

2. (a_n) est périodique non nulle

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = \sum_{d|n} d^2$

4. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{n^n}{n!}$

5. $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = (\ln n)^{-\ln n}$

6. $a_n = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+2)}{n!}$.

7. $a_0 = a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n$.

8. $\forall n \in \mathbb{N}, a_{2n} = a^n, a_{2n+1} = b^n$,
avec $0 < a < b$.

Exercice 2

Les affirmations suivantes sont – elles vraies ou fausses ? En donner une démonstration ou un contre – exemple.

1. $\sum a_n z^n$ et $\sum (-1)^n a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

2. $\sum a_n z^n$ et $\sum (-1)^n a_n z^n$ ont même domaine de convergence.

3. Si $\sum a_n z^n$ a un rayon de convergence infini, alors elle converge normalement sur \mathbb{R} .

4. Si $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $[-R, R]$, alors elle converge normalement sur $B_F(0, R)$ dans \mathbb{C} .

5. Si $\sum a_n z^n$ converge sur $[-R, R]$, alors elle converge sur $B_F(0, R)$ dans \mathbb{C} .

Exercice 3

Pour x réel, on pose $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. Montrer que f est de classe $C^{+\infty}$ sur \mathbb{R} .

Exercice 4

Déterminer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n-1}$

2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n \sin(n\theta)}{2^n}$

3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+1)(n+3)}$

4. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{4n^2-1}$

5. $\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n+1} x^n$

Exercice 5

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\left(\sum \frac{\sin(\alpha n)}{n} x^n \right)_{n \geq 1}$.
 2. Calculer la somme de cette série entière sur son intervalle ouvert de convergence.
-

Exercice 6

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

1. Rayon de convergence et calcul de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
 2. Développement en série entière de $x \mapsto \frac{e^x}{(1-x)^2}$.
-

Exercice 7

Développer en série entière la fonction qui à x associe :

1. $\ln(1 + x + x^2)$.
2. $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.
3. $\frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}$.
4. $\frac{1}{2x^3 - x - 1}$.
5. $\frac{1-x}{(1+2x-x^2)^2}$.
6. $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$.
7. $\arctan(x+1)$.
8. $\int_0^x \frac{\ln(t^2 - \frac{5}{2}t + 1)}{t} dt$.
9. $\left(\frac{(1+x)\sin x}{x} \right)^2$.
10. $\int_x^{2x} e^{-t^2} dt$.

On précisera le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Exercice 8

1. Que dire du rayon de convergence d'une somme de deux séries entières ? Le démontrer.
2. Déterminer le développement en série entière et le rayon de convergence de :

$$f: x \mapsto \ln(1+x) + \ln(1-2x).$$

3. Que peut-on dire pour $x = \frac{1}{4}$? $x = \frac{1}{2}$? $x = -\frac{1}{2}$?
-

Exercice 9

Soient a et b deux complexes distincts non nuls. Développer en série entière la fonction $x \mapsto \frac{1}{(x-a)(x-b)}$.

Exercice 10

Soit a un réel non nul. Développer en série entière la fonction $x \mapsto \ln(\sqrt{x^2 - 2x \operatorname{ch} a} + 1)$.

Exercice 11

Soit pour $n \geq 0$, $a_n = \frac{(-1)^n \binom{2n}{n}}{2n-1}$.

1. Prouver la relation : $(n+1)a_{n+1} = -2(2n-1)a_n$.
 2. Trouver le rayon de convergence de la série entière $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
 3. Trouver une équation différentielle du premier ordre vérifiée par f .
 4. En déduire f .
 5. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{4^n}$.
-

Exercice 12

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} (2x - x^2)^n$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
 2. Déterminer le plus grand intervalle contenant 0 sur lequel f est développable en série entière.
-

Exercice 13

Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{\cos x}$ est développable en série entière au voisinage de 0.

On pourra raisonner par analyse – synthèse, en commençant par supposer f développable en série entière, et en considérant un produit de Cauchy adéquat.

Exercice 14

Rayon de convergence R de la série entière $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sum_{k=1}^n k^{-\alpha}}$. Etudier la convergence en R et en $-R$.

Exercice 15

Calculer en utilisant une série entière : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}}$.

Exercice 16

On considère la série entière de la variable complexe z : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$.

1. Calculer la somme $f(z)$ de cette série lorsque $|z| = r \in [0, 1[$ est fixé.
 2. En déduire les sommes $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos n \theta}{n}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n \theta}{n}$ lorsque $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.
-

Exercice 17

Pour tout réel x , on pose $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1 + t^2 + t^4}$.

Développer la fonction f en série entière au voisinage de 0 . Quel est le rayon de convergence de la série obtenue ?

Exercice 18*

1. Domaine de définition de la fonction f définie par la formule : $f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+z}$.
2. Développer f en série entière.

Donner le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Exercice 19

Via une équation différentielle convenable, développer en série entière la fonction $x \mapsto \arcsin^2 x$.

Exercice 20

Soit a un nombre complexe tel que $|a| < 1$. Développer en série entière la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par la formule : $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sin(a^n z)$.

Exercice 21

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 1$, et par la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = u_n u_1 + u_{n-1} u_2 + \dots + u_2 u_{n-1} + u_1 u_n$$

Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{9}\right)^n u_n = \frac{1}{3}$.

Exercice 22

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = \frac{(-1)^n}{2n-1} \binom{2n}{n}$.

- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)a_{n+1} = -2(2n-1)a_n$.
- Déterminer le rayon de convergence de la série entière $(\sum a_n x^n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- On note f la somme de cette série entière sur son intervalle ouvert de convergence. Trouver une équation différentielle linéaire du premier ordre vérifiée par f .
- En déduire f .
- Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{4^n}$.

Exercice 23

Déterminer les solutions développables en série entière au voisinage de 0 de l'équation différentielle :

$$4x y'' + 2y' + y = 0.$$

Exercice 24

Déterminer les solutions développables en série entières au voisinage de 0 de l'équation différentielle :

$$x^2 y'' + x^2 y' - 2 y = 0.$$

Exercice 25

Résoudre l'équation différentielle (E) : $y'' + x y = 0$, avec les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

(On donnera la solution sous la forme de la somme d'une série entière.)

Exercice 26

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = u_1 = 1, \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = u_n + \frac{2}{n+1} u_{n-1}.$$

1. Montrer que pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{n+3}{n+1}$.
2. Montrer que $\left(\frac{u_n}{n^2}\right)$ est décroissante.
3. En déduire le rayon de convergence de la série entière de terme général $u_n x^n$.

On note f sa somme.

4. Déterminer une équation différentielle satisfaite par f , et calculer f .
-

Exercice 27

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt$. On donne : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} u_n$.

On considère l'équation différentielle : (E) : $(x^2 - 1) y''(x) + 3x y'(x) + y(x) = 0$.

1. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^n(t)$. En utilisant le théorème de convergence dominée, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
 2. Soient $r > 0$ et $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-r, r[$. Montrer que S est solution de (E) sur $]-r, r[$ si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} a_n$.
 3. Calculer le rayon de convergence de $\sum u_{2n} x^{2n}$, et montrer que $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_{2n} x^{2n}$ est solution de (E) sur $]-1, 1[$.
 4. Même question pour $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_{2n+1} x^{2n+1}$.
-

Exercice 28

Calculer l'intégrale $a_n = \int_0^1 t^n (1-t)^n dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis étudier sur \mathbb{R} la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Exercice 29

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{t}{1+t^2} \right)^n dt$. Rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$?

Exercice 30

Soit la fonction F définie par : $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ixt}}{\operatorname{ch}(t)} dt$.

Montrer que la série de Taylor de F converge simplement vers F sur un intervalle $]-a, a[$ avec $a > 0$. Préciser le rayon de convergence.

Exercice 31

Soit $g : x \mapsto \frac{\ln(1-x)}{1-x}$.

- Montrer que g est développable en série entière au voisinage de 0. On donnera une expression de ce développement faisant intervenir $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
 - Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.
 - Déterminer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n H_n}{n+1}$.
-

Exercice 32

Montrer que $\cos(1)$ est irrationnel.

Exercice 33

Soit pour $n \in \mathbb{N}$: $I_n = \int_1^e \ln^n(x) dx$

- Montrer que la suite (I_n) converge. Quelle est sa limite ?
 - Nature des séries $\sum I_n^\alpha$ et $\sum (-1)^n I_n$.
 - Rayon de convergence et somme de $\sum I_n x^n$.
-

Exercice 34

Soient $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de réels positifs, toutes deux convergentes, de limites respectives a et b . Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite complexe telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \alpha_n u_{n+1} + \beta_n u_n.$$

Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n z^n$ est supérieur ou

égal à la racine positive du polynôme $bX^2 + aX - 1$.

Exercice 35

1. Déterminer l'ensemble de définition D de $f: x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n+i n^2 x}$.
 2. f est-elle continue sur D ? f est-elle de classe C^∞ sur D ?
 3. f est-elle développable en série entière en 0?
-

Exercice 36

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \{1, n\}$. On note I_n le nombre d'applications $f: E \rightarrow E$ telles que $f \circ f = Id_E$, et l'on pose $I_0 = 1$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 2$, $I_n = I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$.
 2. Donner une équation différentielle vérifiée par la fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{I_n}{n!} x^n$.
 3. En déduire une expression de I_n (sous forme d'une somme finie).
-

Exercice 37

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note B_n le nombre de partitions d'un ensemble E à n éléments, c'est-à-dire le nombre d'ensembles $\{A_1, \dots, A_r\}$ d'éléments de $\mathcal{P}(E)$ non vides, deux à deux disjoints et dont la réunion est égale à E .

On notera que $B_0 = 1$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$.
- Ecrire une fonction `bell(n)` donnant $(B_k)_{0 \leq k \leq n}$.
- Montrer que le rayon de convergence de la série entière de terme général $\frac{B_n}{n!} x^n$ est strictement positif.
- Soit $f: x \in]-R, R[\mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

En déduire f , puis une expression de B_n .