

# Correction TD diffusion particules

## I. Coefficient de diffusion d'une encre

L'équation de diffusion s'écrit  $\frac{\partial n}{\partial t} = D\Delta n$  soit en analyse dimensionnelle  $\frac{n}{t} = D\frac{n}{d^2}$  d'où  $d^2 = Dt$ . On trace donc la distance  $d^2$  en fonction du temps  $t$ . Cela donne une droite passant par l'origine et de pente  $D$ .

On trouve par une régression linéaire  $D = 1,6.10^{-3} \text{ m}^2.s^{-1}$

## II. Coefficient de diffusion de $CO_2$ dans l'air

1.  $[j_D] = \text{particules.m}^{-2}.s^{-1}$  et  $[n] = \text{particules.m}^{-3}$ .

2. La loi de Fick s'écrit  $\vec{j}_D = -D\overrightarrow{\text{grad}n}(x) = -D\frac{dn}{dx}\vec{e}_x$ : elle signifie que les particules diffusent des fortes vers les faibles densités de particules soit ici selon  $+Ox$ .

On a  $\frac{dn}{dx} = -\frac{j_D}{D}$  soit  $n(x) = -\frac{j_D x}{D} + A$ .

On utilise les conditions aux limites:  $n(x=0) = n(0) = A$  donc  $n(x) = -\frac{j_D x}{D} + n(0)$ .

3. On a  $n(x=L) = n(L) = -\frac{j_D L}{D} + n(0)$ , on en déduit  $D = \frac{j_D L}{n(0) - n(L)} = 2,36.10^{-5} \text{ m}^2.s^{-1}$ : c'est le bon ordre de grandeur pour la diffusion dans un gaz.

4. Le nombre de molécules de  $CO_2$  qui traversent une surface  $S$  pendant  $\Delta t = 60 \text{ s}$  s'écrit  $N = j_D S \Delta t = 4,61.10^{-16}$  particules.


## III. Diffusion par une paroi poreuse

4- On considère le système élémentaire de section  $S$  compris entre  $x$  et  $x + dx$ :

Nombre de particules qui entrent entre  $t$  et  $t + dt$ :  $\delta N_e = j_D(x)\pi a^2 dt$

Nombre de particules qui sortent par diffusion entre  $t$  et  $t + dt$ :  $\delta N_s = j_D(x + dx)\pi a^2 dt$

Nombre de particules qui sortent par la paroi poreuse entre  $t$  et  $t + dt$ :  $\delta N_l = j(x)2\pi a dx dt$




En régime stationnaire le nombre de particules est constant dans le système donc le nombre de particules reçues est égal au nombre de particules perdues soit  $\delta N_e = \delta N_s + \delta N_l$  soit  $0 = (j_D(x + dx) - j_D(x))\pi a^2 dt + j(x)2\pi a dx$  donc avec  $dx$  petit  $0 = \frac{dj_D}{dx} dx \pi a^2 dt + j(x)2\pi a dx dt$  donne  $\frac{dj_D}{dx} + \frac{2K}{a}(n - n_{ext}) = 0$ .

On applique la loi de Fick  $j_D = -D\frac{dn}{dx}$  et on doit résoudre l'équation différentielle  $-D\frac{d^2 n}{dx^2} + \frac{2K}{a}(n - n_{ext}) = 0$

ou  $\frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{2K}{aD}(n - n_{ext}) = 0$ .

## IV. A l'extérieur d'un noyau sphérique

1. Le volume compris entre les sphères de rayons  $r$  et  $r + dr$  s'écrit  $d\tau = 4\pi r^2 dr$  (surface de la petite sphère fois l'épaisseur). Ici le système se trouve à l'intérieur du noyau soit  $r$  et  $r + dr$  sont supérieurs à  $R$ .



2. Le nombre de particules qui entrent dans le système est le nombre de particules qui traversent la sphère de rayon  $r$  soit  $\delta N_e = j_D(r,t)4\pi r^2 dt$ .

Le nombre de particules qui sortent du système est le nombre de particules qui traversent la sphère de rayon  $r + dr$  soit  $\delta N_s = j_D(r + dr, t)4\pi(r + dr)^2 dt$ .

Le nombre de particules dans le système à l'instant  $t$  est  $N(t) = n(r, t)4\pi r^2 dr$ .

Le nombre de particules dans le système à l'instant  $t + dt$  est  $N(t + dt) = n(r, t + dt)4\pi r^2 dr$ .

**3.** La conservation du nombre de neutrons s'écrit  $N(t + dt) - N(t) = \delta N_e - \delta N_s$ .

d'où  $n(r, t + dt) - n(r, t)4\pi r^2 dr = -(j_D(r + dr, t)(r + dr)^2 - j_D(r, t)r^2)4\pi dt$

avec  $dt$  et  $dr$  petits on fait les DL:  $\frac{\partial n}{\partial t} 4\pi r^2 dr dt = -\frac{\partial(j_D(r, t)r^2)}{\partial r} 4\pi dr dt$

soit  $\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial(j_D(r, t)r^2)}{\partial r}$


**4.** En régime stationnaire  $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$  soit  $\frac{\partial(j_D(r, t)r^2)}{\partial r} = 0$  ce qui signifie que  $j_D(r, t)r^2 = A$  une constante

soit  $j_D(r, t) = \frac{A}{r^2}$ . Par identification avec l'énoncé  $n = 2$ .

**5.** En régime stationnaire, le nombre de particules reçues est égal au nombre de particules perdues soit  $\delta N_e = \delta N_s$  soit  $j_D(r + dr, t)4\pi(r + dr)^2 dt = j_D(r, t)4\pi r^2 dt$  et  $j_D(r + dr, t)(r + dr)^2 = j_D(r, t)r^2$  donc la fonction  $j_D(r, t)r^2$  est constante.

## V. A l'intérieur du noyau sphérique

**1.** Le volume compris entre les sphères de rayons  $r$  et  $r + dr$  s'écrit  $d\tau = 4\pi r^2 dr$  (surface de la petite sphère fois l'épaisseur). Ici le système se trouve à l'intérieur du noyau soit  $r$  et  $r + dr$  sont inférieurs à  $R$ .



**2.** Le nombre de particules qui entrent dans le système est le nombre de particules qui traversent la sphère de rayon  $r$  soit  $\delta N_e = j_D(r, t)4\pi r^2 dt$ .

Le nombre de particules qui sortent du système est le nombre de particules qui traversent la sphère de rayon  $r + dr$  soit  $\delta N_s = j_D(r + dr, t)4\pi(r + dr)^2 dt$ .

Le nombre de particules produites dans le système entre  $t$  et  $t + dt$  est  $\delta N_p = p4\pi r^2 dr dt$ .

Le nombre de particules dans le système à l'instant  $t$  est  $N(t) = n(r, t)4\pi r^2 dr$ .

Le nombre de particules dans le système à l'instant  $t + dt$  est  $N(t + dt) = n(r, t + dt)4\pi r^2 dr$ .

**3.** La conservation du nombre de neutrons s'écrit  $N(t + dt) - N(t) = \delta N_e - \delta N_s + \delta N_p$ .

d'où  $n(r, t + dt) - n(r, t)4\pi r^2 dr = -(j_D(r + dr, t)(r + dr)^2 - j_D(r, t)r^2)4\pi dt + p4\pi r^2 dr dt$

avec  $dt$  et  $dr$  petits on fait les DL:  $\frac{\partial n}{\partial t} 4\pi r^2 dr dt = -\frac{\partial(j_D(r, t)r^2)}{\partial r} 4\pi dr dt + p4\pi r^2 dr dt$

soit  $\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial(j_D(r, t)r^2)}{\partial r} + p$

**4.** **4.a.** En régime stationnaire  $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$  soit  $\frac{d(j_D(r, t)r^2)}{dr} = pr^2$ .

**4.b.** La loi de Fick s'écrit  $\vec{j}_D = -D \overrightarrow{\text{grad}} n(r) = -D \frac{dn}{dr} \vec{e}_r$  soit  $j_D = -D \frac{dn}{dr}$  d'où l'équation à résoudre  $\frac{d}{dr} (r^2 \frac{dn}{dr}) = -\frac{pr^2}{D}$ .

**4.c.** On primitive l'équation précédente par rapport à  $r$ :  $r^2 \frac{dn}{dr} = -\frac{pr^3}{3D} + A$  qui donne en divisant par  $r^2$ :  $\frac{dn}{dr} = -\frac{pr}{3D} + \frac{A}{r^2}$ .

On primitive à nouveau:  $n(r) = -\frac{pr^2}{6D} - \frac{A}{r} + B$ .

L'énoncé nous donne la condition aux limites  $n(r = 0) = n_0$  or on observe que dans l'expression de  $n(r)$  en


$r = 0$  le terme  $A/r$  diverge, on doit donc poser  $A = 0$  pour que  $n(r)$  existe en  $r = 0$  soit  $n(r = 0) = 0 + B = n_0$  donc  $n(r) = -\frac{pr^2}{6D} + n_0$ .

On en déduit la densité à la périphérie du noyau  $n(r = R) = -\frac{pR^2}{6D} + n_0$ .

5. En régime stationnaire, le nombre de particules reçues est égal au nombre de particules perdues soit  $\delta N_e = \delta N_s$  soit  $j_D(r + dr, t)4\pi(r + dr)^2 dt = j_D(r, t)4\pi r^2 dt$  et  $j_D(r + dr, t)(r + dr)^2 = j_D(r, t)r^2$  donc la fonction  $j_D(r, t)r^2$  est constante.

6. On reprend l'exercice en se plaçant immédiatement en régime stationnaire.

Soit le système compris entre les deux sphères de rayons  $r$  et  $r + dr$  avec  $r$  et  $r + dr$  inférieurs à  $R$ .



en régime stationnaire, le nombre de particules dans le système est constant donc le nombre de particules reçues est égal au nombre de particules perdues soit  $\delta N_e + \delta N_p = \delta N_s$ .

Le nombre de particules qui entrent dans le système est le nombre de particules qui traversent la sphère de rayon  $r$  soit  $\delta N_e = j_D(r)4\pi r^2 dt$ .

Le nombre de particules qui sortent du système est le nombre de particules qui traversent la sphère de rayon  $r + dr$  soit  $\delta N_s = j_D(r + dr)4\pi(r + dr)^2 dt$ .

Le nombre de particules produites dans le système entre  $t$  et  $t + dt$  est  $\delta N_p = p4\pi r^2 dr dt$ .

On a donc  $(j_D(r + dr)(r + dr)^2 - j_D(r)r^2)4\pi dt = p4\pi r^2 dr dt$  soit pour  $dr$  petit  $\frac{d}{dr}(j_D(r)r^2)4\pi dr dt = p4\pi r^2 dr dt$  donc  $\frac{d}{dr}(j_D(r)r^2) = pr^2$ .

A résoudre comme précédemment.


## VI. Protection nucléaire

1. On considère le système élémentaire de section  $S$  compris entre  $x$  et  $x + dx$ :

Nombre de particules qui entrent entre  $t$  et  $t + dt$ :  $\delta N_e = j_D(x)Sdt$

Nombre de particules qui sortent par diffusion entre  $t$  et  $t + dt$ :  $\delta N_s = j_D(x + dx)Sdt$

Nombre de particules qui sont absorbées entre  $t$  et  $t + dt$ :  $\delta N_a = \frac{n(x)}{\tau}Sdxdt$



En régime stationnaire le nombre de particules est constant dans le système donc le nombre de particules reçues est égal au nombre de particules perdues soit  $\delta N_e = \delta N_s + \delta N_a$  soit  $0 = (j_D(x + dx) - j_D(x))Sdt + \frac{n(x)}{\tau}Sdxdt$  donc avec  $dx$  petit  $0 = \frac{dj_D}{dx}dxSdt + \frac{n(x)}{\tau}Sdxdt$  donne  $\frac{dj_D}{dx} + \frac{n(x)}{\tau} = 0$ .

2. On applique la loi de Fick  $j_D = -D\frac{dn}{dx}$  et on doit résoudre l'équation différentielle  $-D\frac{d^2n}{dx^2} + \frac{n(x)}{\tau}$  ou encore  $\frac{d^2n}{dx^2} - \frac{1}{\tau D}n = 0$  ou  $\frac{d^2n}{dx^2} - \frac{n}{\delta} = 0$

On écrit l'équation caractéristique:  $r^2 - \frac{1}{\delta^2} = 0$  soit  $r^2 = \frac{1}{\tau D}$  et  $r = \pm\sqrt{\frac{1}{\tau D}}$ .

La solution est  $n(x) = Ae^{x/\delta} + Be^{-x/\delta}$ .

3. On trouve  $A$  et  $B$  avec les conditions aux limites. La particularité de cet exercice est que l'on ne donne pas  $n$  en  $x = 0$  et en  $x = L$  mais on donne:

$$n(x = 0) = n_0 = A + B$$

$$\text{et } \phi = j_D(x = 0)S \text{ avec } j_D(x) = -D \frac{dn}{dx} = -\frac{D}{\delta}(Ae^{x/\delta} - Be^{-x/\delta}) \text{ soit } \phi = \frac{-DS}{\delta}(A - B).$$

$$\text{On résout le système } A + B = n_0 \text{ et } B - A = \frac{DS}{\delta\phi}.$$

$$\text{On fait la somme } 2B = n_0 + \frac{DS}{\delta\phi} \text{ et on fait la différence } 2A = n_0 - \frac{DS}{\delta\phi}.$$

## VII. Correction : oxydation d'un métal

1.  $L(t)$  varie très lentement donc sur une petite échelle de temps, la longueur  $L(t)$  peut être considérée constante d'où l'hypothèse d'un régime quasi-stationnaire.

On considère un cylindre d'axe  $Ox$  compris entre  $x$  et  $x + dx$ . Entre  $t$  et  $t + dt$ , le nombre de particules qui entrent dans ce cylindre est  $j(x, t)Sdt$  et le nombre de particules qui en sortent est  $j(x + dx, t)Sdt$ . En régime stationnaire ces nombres de particules sont égaux soit  $j(x) = j(x + dx) = \text{constante}$ .

On applique la loi de Fick  $\vec{j} = j\vec{e}_x = -D\overrightarrow{\text{grad}}n$  soit  $j = -D\frac{dn}{dx} = \text{constante}$ . On a donc  $\frac{dn}{dx}$  qui est constant (soit  $n(x)$  est une fonction affine) et qui s'écrit  $\frac{n(x = L) - n(x = 0)}{L} = \frac{C_1 - C_0}{L}$ .

$$\text{Ainsi on a } j = D\frac{C_0 - C_1}{L} > 0.$$

2. Les atomes de métal qui diffusent dans la couche d'oxyde et qui arrivent en  $x = L$  s'oxydent et font augmenter le volume de la couche de métal.

Un atome oxydé occupe le volume  $\Omega$  et ici il y a pendant  $dt$ ,  $jSdt$  atomes de métal qui diffusent à travers la surface en  $x = L$ , donc pendant  $dt$  le volume de la couche de métal augmente de  $jSdt\Omega = D\frac{C_0 - C_1}{L}Sdt\Omega$ .

Du point de vue macroscopique, le volume de la couche de métal à l'instant  $t$  est  $L(t)S$  et le volume de cette couche de métal à l'instant  $t + dt$  est  $SL(t + dt)$ . Donc la variation de volume de la couche de métal est  $SL(t + dt) - SL(t) = S\frac{dL}{dt}dt$ .

On écrit que les deux expressions de variation de volume sont égales soit  $D\frac{C_0 - C_1}{L}Sdt\Omega = S\frac{dL}{dt}dt$  et on en déduit l'équation différentielle vérifiée par  $L(t)$ :  $\frac{dL}{dt} = \Omega D\frac{C_0 - C_1}{L}$ . On la résout en séparant les variables soit:

$$\int_0^{L(t)} LdL = \int_0^t \Omega D(C_0 - C_1)dt \text{ d'où } L(t)^2 = \Omega D(C_0 - C_1)t \text{ et donc } L(t) = \sqrt{2\Omega D(C_0 - C_1)t}.$$

3. On évalue le temps de croissance de la couche c'est d'après l'étude précédente:  $t_c = \frac{L(t)^2}{2\Omega D(C_0 - C_1)}$ .

On évalue le temps de diffusion d'un atome de métal dans la couche d'oxyde à partir de l'équation de diffusion:  $\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$  donne  $\frac{1}{t_d} = \frac{D}{L(t)^2}$  donc  $t_d = \frac{L(t)^2}{D}$ .

On peut considérer que le régime est quasi stationnaire à condition que le temps de diffusion soit très grand devant le temps d'accroissement de la couche  $t_d \gg t_c$  conduit à  $C_0 - C_1 \gg \frac{1}{2\Omega}$ .