

Programme des colles de la semaine du 10 novembre 2025

Nombres complexes. Calculs de primitives

Questions de cours

1. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire (dans $\mathbb{C}$).
2. Montrer que : $\forall(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2, e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$.
3. Donner, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la liste des n racines n -ièmes de l'unité et démontrer le résultat.
4. Énoncer et démontrer le résultat sur les relations coefficients-racines relatives à une équation polynomiale de degré 2.
5. Montrer que si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et si $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable sur I , alors $f : t \mapsto e^{\varphi(t)}$ est dérivable sur I et déterminer l'expression de la dérivée.
6. Expliquer comment calculer une primitive de $\ln$ à l'aide du théorème fondamental de l'intégration et d'une intégration par parties.
7. Énoncer les formules d'intégration par parties et de changement de variable.
8. Proposer une interprétation géométrique de l'intégrale $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx$ permettant de deviner sa valeur, avant de faire le calcul *via* le changement de variable $x = \sin(t)$ (ou $x = \cos(t)$).

Nombres complexes

1. Définition des nombres complexes donnés par partie réelle et partie imaginaire. Somme, produit. Énoncé de formules déjà vues sur les nombres réels : somme de termes d'une suite géométrique ; factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$ ($a, b \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}^*$) ; formule du binôme de Newton.
2. Conjugué d'un nombre complexe ; propriétés usuelles¹ : conjugué, d'une somme, d'un produit, de l'inverse, caractérisation des réels, des imaginaires purs, formules : $\forall z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.
3. Module d'un nombre complexe. Interprétation géométrique.
4. Propriétés¹ :
 - (a) $\forall z \in \mathbb{C}, |z| = 0 \iff z = 0$.
 - (b) $\forall z \in \mathbb{C}, |z| = |\bar{z}|$.
 - (c) $\forall z \in \mathbb{C}, |-z| = |z|$.
 - (d) $\forall z \in \mathbb{C}, |z|^2 = z\bar{z}$.
 - (e) Le module prolonge la valeur absolue déjà définie sur $\mathbb{R}$.
 - (f) $\forall x \in \mathbb{R}_+, |x| = x$, donc : $\forall z \in \mathbb{C}, ||z|| = |z|$.
 - (g) $\forall z \in \mathbb{C}, |\operatorname{Re} z| \leq |z|, |\operatorname{Im} z| \leq |z|$.
5. Module d'un produit¹ ou d'un quotient.
6. Inégalité triangulaire et cas d'égalité¹.
7. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, notation $e^{i\theta}$.
8. Formules d'Euler¹.
9. Pour tout $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2, e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$.
10. Formule de Moivre¹.
11. Savoir-faire : linéarisation d'expressions trigonométriques.
12. Savoir-faire : usage de l'angle moitié pour transformer l'expression d'une somme de nombres complexes de module 1.
13. Forme trigonométrique d'un nombre complexe : $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$.
14. Arguments d'un nombre complexe non nul z ; argument principal (dans $] -\pi, \pi]$) noté $\arg(z)$.
15. Propriétés¹ :
 - (a) $\forall z \in \mathbb{C}^*, \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$;

1. Résultat démontré en cours.

- (b) Si z et $z' \in \mathbb{C}^*$, $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$;
 (c) Si z et $z' \in \mathbb{C}^*$, $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \pmod{2\pi}$;
 (d) Si $z \in \mathbb{C}^*$, $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \pmod{2\pi}$;
16. Deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont même module et même argument modulo 2π .
17. Savoir-faire : transformer une expression de la forme $a \cos(t) + b \sin(t)$, avec $a, b, t \in \mathbb{R}$ tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, en une expression de la forme $r \cos(t - \varphi)$, avec $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\varphi \in \mathbb{R}$. On a $a + ib = re^{i\varphi}$.
18. Racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité
- (a) Résolution¹ de l'équation $z^n = 1$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.
- (b) En notant $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, propriétés¹ :
- i. on a : $\omega^n = 1$.
 ii. Les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité sont $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$.
 iii. Si $n \geq 2$, on a : $1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0$, autrement dit : $\sum_{z \in U_n} z = 0$.
19. (a) Méthode pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe.
 (b) Résolution des équations polynomiales de degré 2 à coefficients complexes.
 (c) Relations coefficients-racines¹.
20. Exponentielle complexe
- (a) Définition
 (b) Propriétés¹
- i. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a $|\exp(z)| = e^{\operatorname{Re}(z)}$ et $\operatorname{Im}(z)$ est un argument de $\exp(z)$.
 ii. Pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $\exp(z + z') = \exp(z) \exp(z')$.
 iii. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$.
 iv. Pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $\exp(z) = \exp(z')$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $z - z' = 2i\pi k$.
21. (a) Fonctions d'une variable réelle à valeurs complexes. Une telle fonction est dérivable si ses parties réelle et imaginaire le sont. Les formules pour la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient, restent valables.
 (b) Dérivabilité et dérivée¹ de $t \mapsto e^{\varphi(t)}$, où $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable sur un intervalle I .
22. Nombres complexes et géométrie plane
- (a) Affixe d'un vecteur
 (b) Interprétation géométrique des transformations $z \mapsto z + z_0$, $z \mapsto ze^{i\theta_0}$, où $z_0 \in \mathbb{C}$ et $\theta_0 \in \mathbb{R}$ sont fixés.
 (c) Si A, B, C, D sont quatre points du plan tels que $A \neq B$ et $C \neq D$, d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D :
- le réel $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$;
 — les droites (AB) et (CD) sont parallèles ssi les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires
 ssi $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0 \pmod{\pi}$ ssi $\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$.
 — les droites (AB) et (CD) sont orthogonales ssi l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π
 ssi $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ ssi $\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$.

Calculs de primitives

On considère des fonctions d'une variable réelle, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

- Primitive d'une fonction. Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors l'ensemble des primitives de f est l'ensemble des fonctions de la forme $F + c$, où $c \in \mathbb{K}$.
- Si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction admettant une primitive, si $a \in I$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, il existe une unique¹ primitive F de f sur I vérifiant $F(a) = \alpha$.
- Liste de primitives usuelles.
- Propriétés pour l'instant admises de l'intégrale
 - Définition intuitive comme l'aire (algébrique) sous la courbe de la fonction intégrée
 - Linéarité de l'intégrale
 - Relation de Chasles
 - Positivité de l'intégrale. Cas d'une fonction continue et positive d'intégrale nulle.
 - Croissance de l'intégrale

- (f) Inégalité triangulaire pour les intégrales.
5. Théorème fondamental de l'intégration. Conséquence : une fonction continue sur I admet des primitives sur I .
 6. Intégration par parties
 7. Changement de variable
 8. Méthode pour calculer une primitive d'une fonction de la forme $t \mapsto e^{\alpha t} \cos(\omega t)$ ou $t \mapsto e^{\alpha t} \sin(\omega t)$ avec $\alpha, \omega \in \mathbb{R}^*$.
 9. Méthode pour calculer une primitive d'une fonction de la forme $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.