

Programme des colles de la semaine du 2 février 2026

Arithmétique. Déivation

Questions de cours

- Montrer que, pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\text{PGCD}(a, b + ak) = \text{PGCD}(a, b)$.
- Montrer que : si $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ et $m \in \mathbb{N}^*$, on a l'équivalence : $m = \text{PPCM}(a, b) \iff \begin{cases} a|m \text{ et } b|m \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, (a|n \text{ et } b|n) \implies m|n \end{cases}$
- Montrer que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier.
- Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.
- Montrer que si f et g sont dérivables en un point x_0 alors leur produit fg est dérivable en x_0 .
- Démontrer le théorème des accroissements finis en utilisant le théorème de Rolle.
- Montrer à l'aide du cours sur la convexité chacune des inégalités : $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x+1$ et $\forall t \in]-1, +\infty[$, $\ln(1+t) \leq t$.

Arithmétique

- Divisibilité.
- Théorème de division euclidienne¹.
- Plus grand diviseur commun de deux entiers non tous les deux nuls : définition comme le plus grand diviseur commun aux deux nombres, au sens de la relation d'ordre usuelle sur \mathbb{Z} .
- Propriétés
 - Pour $d \in \mathbb{N}$, on a $d = \text{PGCD}(a, b) \iff \begin{cases} d|a \text{ et } d|b \\ \forall n \in \mathbb{Z}, (n|a \text{ et } n|b) \implies n|d \end{cases}$
 - Propriétés d'usage, notamment : pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\text{PGCD}(a, b + ak) = \text{PGCD}(a, b)$.
- Algorithme d'Euclide pour le calcul du PGCD.
- Nombres premiers entre eux.
- Le théorème de Bézout a été vu en exercice *via* l'algorithme d'Euclide en version « étendue », et le lemme de Gauss en a été déduit.
- Plus petit multiple commun de deux entiers non nuls. Propriétés usuelles.
- Si $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, on a, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, l'équivalence : $m = \text{PPCM}(a, b) \iff \begin{cases} a|m \text{ et } b|m \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, (a|n \text{ et } b|n) \implies m|n \end{cases}$
- Pour tous $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, on a $\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = |ab|$. En particulier, si a et b sont premiers entre eux, alors $\text{PPCM}(a, b) = |ab|$.
- Nombres premiers
 - Définition
 - Pratique du crible d'Ératosthène sur les premières valeurs
 - Si un nombre premier p ne divise pas un entier a , alors¹ p est premier avec a .
 - Si p divise ab , alors p divise a ou p divise b .
 - Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier¹.
 - L'ensemble des nombres premiers est infini¹.
- Théorème d'existence et d'unicité de la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers.
- Conséquence pour la description de tous les diviseurs d'un entier.
- Conséquence pour le calcul du PGCD et le PPCM de deux entiers non nuls, à l'aide des décompositions de l'un et de l'autre.
- Nombres rationnels et nombres irrationnels.
 - Forme irréductible d'une fraction.
 - Stabilité de \mathbb{Q} par somme, produit et passage à l'inverse.
 - Nombres décimaux.

1. Résultat démontré en cours.

Déivation

1. Taux d'accroissement ; nombre dérivé ; fonction dérivée ; dérivée à gauche, à droite ; interprétation géométrique.
2. Développement limité à l'ordre 1 (on n'a pas encore introduit la notation « o ») ; équivalence¹ entre l'existence d'un développement limité à l'ordre 1 et la dérivabilité.
3. Déivation et opérations sur les fonctions. Dérivée d'une composée¹. Dérivée d'une bijection réciproque, quand f' ne s'annule pas.
4. Extrema : notions de borne supérieure, borne inférieure, maximum/minimum global/local ; point critique.
5. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et admet un extremum local en un point x_0 à l'intérieur de l'intervalle I (i.e. x_0 n'est pas une borne de I), alors¹ $f'(x_0) = 0$.
6. Théorème de Rolle¹.
7. Théorème des accroissements finis¹.
8. Inégalité des accroissements finis¹ : version « $m \leq f' \leq M$ » et version « $|f'| \leq K$ ».
9. Fonction lipschitzienne.
10. Lien entre le signe de f' et la monotonie de f sur un intervalle¹.
11. Théorème de la limite de la dérivée¹ ; conséquence pour le prolongement d'une fonction de classe C^1 .
12. Conséquences de l'inégalité des accroissements finis pour l'étude des suites récurrentes de la forme « $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ ». Contrôle de la distance entre les termes de la suite et les points fixes de f . Complément : contrôle de la distance entre deux termes de la suite.
13. Dérivées successives : fonction de classe C^k , avec $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.
14. Une combinaison linéaire de fonctions de classe C^k est de classe C^k . Dérivée $k^{\text{ème}}$ d'une combinaison linéaire (quand $k < \infty$).
15. Un produit de fonctions de classe C^k est de classe C^k . Formule de Leibniz¹.
16. Un quotient de fonctions de classe C^k est de classe C^k (là où il est défini).
17. Une composée de fonctions de classe C^k est de classe C^k .
18. La bijection réciproque d'une bijection de classe C^k (avec $k \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$) dont la dérivée ne s'annule pas est de classe C^k .
19. Fonctions convexes
 - (a) Définition.
 - (b) Le graphe d'une fonction convexe est au-dessus de ses sécantes.
 - (c) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, alors¹ pour tout $a \in I$, la fonction taux d'accroissement Δ_a est croissante sur $I \setminus \{a\}$.
 - (d) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, alors f est convexe ssi¹ f' est croissante sur I .
 - (e) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est deux fois dérivable, alors f est convexe ssi $f'' \geq 0$.
 - (f) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, on a l'équivalence : f est convexe ssi¹ le graphe de f est au-dessus de toutes ses tangentes.
 - (g) Fonction concave. Les résultats sur les fonctions convexes restent valables en changeant le sens des inégalités.
 - (h) Point d'inflexion.
20. Prolongement de la notion de déivation aux fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{C}
 - (a) Rappel des résultats déjà énoncés dans le chapitre sur les nombres complexes.
 - (b) Inégalité des accroissements finis dans le cas d'une fonction de classe C^1 .