

Programme des colles de la semaine du 25 mars 2024

Polynômes

- Notion de polynôme à une indéterminée, à coefficients dans \mathbb{K} (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C}). Unicité des coefficients. Somme et produit de polynômes. Formule du binôme de Newton.
- Degré d'un polynôme. Lien avec la somme et le produit de polynômes.
- Composition de polynômes.
- Arithmétique : divisibilité, division euclidienne¹, algorithme associé.
- Fonction polynomiale associée à un polynôme.
- Racine d'un polynôme
 - Définition
 - Le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est¹ $P(a)$.
 - Il en résulte que a est racine de P ssi $X - a$ divise P .
 - Pour $n \in \mathbb{N}$: si P est de degré n , alors¹ P admet au plus n racines. Conséquences : si $\deg(P) \leq n$ et si P admet $n + 1$ racines distinctes, alors $P = 0$; un polynôme qui admet une infinité de racines est le polynôme nul. On en déduit que l'on peut identifier polynôme et fonction polynomiale associée.
 - Si les scalaires x_1, \dots, x_k sont deux à deux distincts et sont racines de P , alors¹ $\prod_{\ell=1}^k (X - x_\ell)$ divise P .
 - Définition de l'ordre de multiplicité d'une racine dans P comme $\max \{k \in \mathbb{N} \mid (X - a)^k \text{ divise } P\}$. On accepte la multiplicité 0 pour dire que a n'est pas racine de P .
 - Notion de polynôme scindé. Détermination directe de la multiplicités des racines quand le polynôme scindé est donné sous forme factorisée.
 - Relations coefficients-racines pour les polynômes scindés¹ : cas de la somme et du produit des racines (comptées avec multiplicité).
 - Polynômes scindés à racines simples. Exemple : factorisation de $X^n - 1$.
- Dérivée formelle d'un polynôme. Dérivées successives.
- Opérations sur les dérivées. Formule de Leibniz.
- Formule de Taylor pour les polynômes¹.
- Caractérisation de la multiplicité des racines par l'annulation des dérivées successives¹.
- Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$
 - Théorème de d'Alembert-Gauss (admis)
 - Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1
 - Existence et unicité de la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ en produit de facteurs irréductibles (de degré 1)
 - Conséquence : caractérisation de la divisibilité en termes de racines et de leurs multiplicités.
- Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$
 - Examen du cas des polynômes de degré 2 : les polynômes irréductibles de degré 2 sont ceux dont le discriminant est strictement négatif.
 - Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ et tout $z \in \mathbb{C}$, on a¹ : $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$.
 - Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$.
 - Si z est racine de P , alors \bar{z} est racine de P et ces deux racines ont la même multiplicité.
 - Si z est racine de P et si z n'est pas réel (de sorte que $\bar{z} \neq z$), alors :
 - en notant $A = (X - z)(X - \bar{z})$, on a $A = X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2$ et ainsi A est un polynôme à coefficients réels ;
 - le polynôme A est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$;
 - le polynôme A divise P .

1. Résultat démontré en cours.

- (d) Les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ qui sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.
 - (e) Existence et unicité de la factorisation, dans $\mathbb{R}[X]$, en produit de facteurs irréductibles.
13. Fonctions rationnelles d'une variable réelle, à valeurs dans \mathbb{K}
- (a) Définition
 - (b) Théorème de décomposition en éléments simples, dans le cas où le dénominateur est scindé à racines simples (admis).
 - (c) Méthodes pour calculer les coefficients.
 - (d) En notant $f : x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$ la fonction rationnelle étudiée, formule¹ : $\lambda = \frac{A(a)}{B'(a)}$ pour le coefficient λ de l'élément simple associé au pôle a .
 - (e) Dans le cas où le dénominateur a des racines multiples ou des facteurs irréductibles de degré 2, la forme de la décomposition doit être indiquée.