

Attention : lorsque l'ensemble de départ d'une fonction est donnée, il est inutile et même incorrect d'en chercher le domaine de définition (on sait néanmoins que le domaine de définition contient l'ensemble de départ).

Par exemple, si un énoncé spécifie "Soit  $f : [1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$ " il est inutile et même incorrect de chercher le domaine de définition de  $f$ .

Attention, lorsqu'une fonction est constituée de la fonction racine carrée, il faut savoir rédiger la justification par théorèmes opératoires que la fonction est dérivable sur l'ensemble de départ privé de l'ensemble des points pour lesquels l'expression dans la racine carrée s'annule.

Par exemple :

"On considère  $f : [1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = 2\sqrt{\ln(x)}$ . Attention, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Pour tout  $x \in ]1, +\infty[$ ,  $\ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ . Donc, d'après les théorèmes opératoires,  $f$  est dérivable sur  $]1, +\infty[$  et, pour tout  $x \in ]1, +\infty[$ ,  $f'(x) = 2 \frac{\frac{1}{x}}{2\sqrt{\ln(x)}} = \frac{1}{x\sqrt{\ln(x)}}$ ."

Attention à ne jamais oublier les quantificateurs.

Par exemple :

"Pour tout  $k \in [[2, n]]$ ,  $f(k+1) - f(k) < \frac{1}{k\sqrt{\ln(k)}}$  (en appliquant 2. à  $a = k \in ]1, +\infty[$ )

donc  $\sum_{k=2}^n (f(k+1) - f(k)) < \sum_{k=2}^n \frac{1}{k\sqrt{\ln(k)}}$ "

"Pour tout  $k \in [[3, n]]$ ,  $\frac{1}{k\sqrt{\ln(k)}} < f(k) - f(k-1)$  (en appliquant 2. à  $a = k-1 \in ]1, +\infty[$ )

donc  $\sum_{k=3}^n \frac{1}{k\sqrt{\ln(k)}} < \sum_{k=3}^n (f(k) - f(k-1))$ "

Attention, pour montrer qu'une fonction  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  s'annule exactement une fois, il est plus efficace d'utiliser le théorème de la bijection, qui permet de montrer simultanément l'existence et l'unicité, et dans tous les cas d'intervalle  $I$ , plutôt que d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, qui ne permet de montrer que l'existence, et seulement dans le cas d'un intervalle du type  $I = [a, b]$ .

Par exemple :

"Définissons  $\varphi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  par  $\varphi(x) = f(x) - x$ .  $\varphi$  est strictement décroissante sur  $]0, +\infty[$  car somme de deux fonctions strictement décroissantes sur  $]0, +\infty[$ .  $\varphi$  est continue par théorèmes opératoires.  $\varphi$  est continue strictement décroissante sur  $[2, \frac{5}{2}]$  donc  $\varphi$  induit une bijection de  $[2, \frac{5}{2}]$  dans  $\varphi([2, \frac{5}{2}]) = [\varphi(\frac{5}{2}), \varphi(2)] = [-\frac{9}{100}, \frac{1}{2}]$ . Or  $0 \in [-\frac{9}{100}, \frac{1}{2}]$ . Donc il existe un unique  $\alpha \in [2, \frac{5}{2}]$  tel que  $\varphi(\alpha) = 0$ .  $\alpha$  est l'unique point fixe de  $f$  dans  $[2, \frac{5}{2}]$ ."

Attention, il faut connaître toutes les méthodes du cours, par exemple la méthode qui permet de montrer qu'une suite récurrente converge vers un point fixe de la fonction itératrice en utilisant l'inégalité des accroissements finis.

Par exemple :

"Pour tout  $x \in [2, \frac{5}{2}]$ ,  $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$ . Donc  $f$  est  $\frac{1}{4}$ -lipschitzienne sur  $[2, \frac{5}{2}]$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{4}|u_n - \alpha|$ . Donc on voit par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_n - \alpha| \leq (\frac{1}{4})^n |u_0 - \alpha|$ . Or  $(\frac{1}{4})^n |u_0 - \alpha| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  car  $(\frac{1}{4})^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  car  $0 \leq \frac{1}{4} < 1$ . Donc, d'après le théorème de convergence par majoration de la distance,  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$ ."

Attention : pour appliquer la formule du binôme de Newton à deux matrices, il faut montrer que celles-ci commutent pour  $\times$ .

Par exemple :

" $A = 4I_3 + B$  et  $4I_3$  et  $B$  commutent pour  $\times$  (car  $(4I_3) \times B = 4B = B \times (4I_3)$ ) donc, d'après la formule du binôme de Newton,  $A^n = (4I_3 + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (4I_3)^{n-k} B^k$ "

Attention : il est incorrect de diviser une matrice par un scalaire, par contre il est correct que multiplier cette matrice par l'inverse de ce scalaire.

Par exemple " $\frac{A-I_3}{2}$ " est incorrect, par contre " $\frac{1}{2} \cdot (A - I_3)$ " est correct.

Attention, lorsqu'on multiplie une matrice par un scalaire, le scalaire est à gauche.

Par exemple : " $\frac{n(n-1)}{2} \cdot B$ " est correct, mais " $B \cdot \frac{n(n-1)}{2}$ " est incorrect.