

Résumé du chapitre 12: équations différentielles linéaires

Table des matières

1	Equations différentielles linéaires d'ordre 1	1
1.a	Définition	1
1.b	Résolution dans le cas homogène	1
1.c	Résolution dans le cas général	2
1.d	Recherche d'une solution particulière par variation de la constante	2
1.e	Recherche d'une solution particulière dans des cas simples	2
1.f	Recherche d'une solution particulière par superposition	2
1.g	Résolution avec condition initiale	2
2	Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants	3
2.a	Définition	3
2.b	Résolution dans le cas homogène	3
2.c	Résolution dans le cas général	3
2.d	Recherche d'une solution particulière dans des cas simples	3
2.e	Recherche d'une solution particulière par superposition	3
2.f	Résolution avec conditions initiales	4

1 Equations différentielles linéaires d'ordre 1

1.a Définition

Définition.

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$.
 On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 :
 $(E) \ y' + a(x)y = b(x)$
 On appelle solution de l'équation toute fonction $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable telle que pour tout $x \in I$, $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$.
 Lorsque a est une fonction constante, on dit que l'équation est à coefficient constant.
 Lorsque b est la fonction nulle, on dit que l'équation est homogène (ou sans second membre)

1.b Résolution dans le cas homogène

Proposition.

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue. On considère :
 $(E) \ y' + a(x)y = 0$ (équation d'ordre 1 homogène)
 Calculons A une primitive de a .
 Alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Démonstration. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction dérivable
 Considérons la fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{K}$ définie par $\varphi(x) = y(x)e^{A(x)}$.
 Par théorèmes opératoires, φ est dérivable et pour tout $x \in I$,

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= y'(x)e^{A(x)} + y(x)e^{A(x)}A'(x) \\ \varphi'(x) &= y'(x)e^{A(x)} + y(x)e^{A(x)}a(x) \\ \varphi'(x) &= (y'(x) + a(x)y(x))e^{A(x)}. \\ \forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \quad \forall x \in I, (y'(x) + a(x)y(x))e^{A(x)} &= 0\end{aligned}$$

car $\forall x \in I, e^{A(x)} \neq 0$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, \varphi'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in I, \varphi(x) = \lambda$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in I, y(x)e^{A(x)} = \lambda$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in I, y(x) = \lambda e^{-A(x)}$$

Donc les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$

□

Corollaire.

Soit $a \in \mathbb{K}$. On considère :

(E) $y' + ay = 0$ (équation d'ordre 1 homogène à coefficient constant)

Les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-ax}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

1.c Résolution dans le cas général

Proposition.

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$. On considère :

(E) $y' + a(x)y = b(x)$ (équation d'ordre 1)

(E₀) $y' + a(x)y = 0$ (équation homogène associée à (E))

Soit y_p une solution particulière de (E).

Alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $y_0 + y_p$ avec y_0 solution de (E₀).

1.d Recherche d'une solution particulière par variation de la constante

Proposition.

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues. On considère :

(E) $y' + a(x)y = b(x)$

(E₀) $y' + a(x)y = 0$

Calculons A une primitive de a

Les solutions de (E₀) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ où λ est une constante.

(E) admet une solution particulière de la forme $x \mapsto \lambda(x)e^{-A(x)}$ où λ est une fonction.

(méthode de variation de la constante)

1.e Recherche d'une solution particulière dans des cas simples

1.f Recherche d'une solution particulière par superposition

Proposition (Principe de superposition).

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$, $b_1 : I \rightarrow \mathbb{K}$, $b_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$. On considère :

$$(E) \quad y' + a(x)y = b_1(x) + b_2(x)$$

$$(E_1) \quad y' + a(x)y = b_1(x)$$

$$(E_2) \quad y' + a(x)y = b_2(x)$$

Soit y_1 une solution de (E_1) et y_2 une solution de (E_2) . Alors $y_1 + y_2$ est solution de (E) .

1.g Résolution avec condition initiale

Proposition.

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues. Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$.

On considère le système : $(S) \quad \begin{cases} y' + a(x)y = b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

Alors (S) admet une unique solution.

2 Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

2.a Définition

Définition.

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ et $c : I \rightarrow \mathbb{K}$

On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants :

$$(E) \quad y'' + ay' + by = c(x)$$

On appelle solution de l'équation toute fonction $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivable telle que pour tout $x \in I$, $y''(x) + ay'(x) + by(x) = c(x)$.

Si c est la fonction nulle, on dit que l'équation est homogène (ou sans second membre)

2.b Résolution dans le cas homogène

Proposition.

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. On considère :

$$(E) \quad y'' + ay' + by = 0 \text{ (équation d'ordre 2 homogène à coefficients constants)}$$

$$(C) \quad r^2 + ar + b = 0 \text{ (équation caractéristique associée à (E))}$$

- Si (C) admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.
- Si (C) admet une racine double r_1 , alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu x e^{r_1 x}$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.
- On suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Si (C) admet deux racines distinctes complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$, alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{\alpha x} \cos(\beta x) + \mu e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

2.c Résolution dans le cas général

Proposition.

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ et $c : I \rightarrow \mathbb{K}$. On considère :

(E) $y'' + ay' + by = c(x)$ (équation d'ordre 2 à coefficients constants)

(E_0) $y'' + ay' + by = 0$ (équation homogène associée à (E))

Soit y_p une solution particulière de (E) .

Alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $y_0 + y_p$ avec y_0 solution de (E_0)

2.d Recherche d'une solution particulière dans des cas simples

2.e Recherche d'une solution particulière par superposition

Proposition (Principe de superposition).

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, $c_1 : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $c_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$. On considère :

(E) $y'' + ay' + by = c_1(x) + c_2(x)$

(E_1) $y'' + ay' + by = c_1(x)$

(E_2) $y'' + ay' + by = c_2(x)$

Soit y_1 une solution de (E_1) et y_2 une solution de (E_2) . Alors $y_1 + y_2$ est solution de (E) .

2.f Résolution avec conditions initiales

Proposition.

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ et $c : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue. Soit $x_0 \in I$ et $(y_0, y'_0) \in \mathbb{K}^2$.

On considère le système : $(S) \begin{cases} y'' + ay' + by = c(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$

Alors (S) admet une unique solution.