

Liste d'exercices n°12

Limites et continuité

Exercice 1. Calculer, si elles existent, les limites en 0 et en $+\infty$ des fonctions suivantes.

$$1. \ f : x \mapsto \frac{(x^2 + \cos(x) - 14) \sin(e^{-x})}{(\ln(x) + \sqrt{x}) \ln(1+x)} \quad 2. \ g : x \mapsto \frac{(x^3 + \sin(x^2))^2 \sqrt{14+x}}{(e^{x^3} - 1)(x + x^2 \ln(x))}$$

Exercice 2. Calculer, si elles existent, les limites suivantes.

$$\begin{array}{ll} 1. \ \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x - 1} - \sqrt{x^2 + x}) & 6. \ \lim_{x \rightarrow +\infty} \lfloor x \rfloor \sin\left(\frac{1}{x}\right) \\ 2. \ \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{\sin^2(x)}} & 7. \ \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin(x) \\ 3. \ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x \ln(x))}{x} & 8. \ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{x+2}{x} \right)^{2x} \right) \\ 4. \ \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x^2 + x + 6}{x^2 + 9 - 6x} & 9. \ \lim_{x \rightarrow 0} (\exp(\sin(x)) - \sin^2(x))^{\frac{1}{\sin(x)}} \\ 5. \ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin(x)) - 1}{\tan^3(x) - 2 \sin^2(x)} & \end{array}$$

Exercice 3. Soit f une fonction monotone sur un intervalle $I =]a, b[$, avec a et b éventuellement infinis.

Montrer que la fonction f admet en tout point x_0 des limites à gauche et à droite finies.

Exercice 4. Soient f et g les fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1 - \cos(2\pi x)}{x^2 \ln(x)} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \frac{\sin(x^2)}{\sqrt{x+4} - 2}.$$

1. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?
2. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 1 ?
3. La fonction g est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

Exercice 5. Les fonctions suivantes sont-elles continues ?

$$\begin{array}{l} 1. \ f : x \mapsto \begin{cases} \frac{(x+2)(x-1)}{x \ln(x)} & \text{si } x > 0 \text{ et } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases} \\ 2. \ g : x \mapsto \lfloor x \rfloor \sin(\pi x) \\ 3. \ h : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x^2} \left(\frac{2}{\cos(x)} + \cos(x) - 3 \right) & \text{si } x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[\cup]0; \frac{\pi}{2}[\\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 6. Soit I un intervalle, soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues.

Montrer que les fonctions $\max(f, g) : x \mapsto \max(f(x), g(x))$ et $\min(f, g) : x \mapsto \min(f(x), g(x))$ sont continues sur I .

Exercice 7. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \leq b$. Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue.

Montrer que f possède au moins un point fixe.

Exercice 8. Soit g une fonction périodique définie sur \mathbb{R} . On suppose que g admet une limite en $+\infty$. Montrer que g est constante.

Exercice 9. Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} . On suppose que f admet une limite finie en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est bornée.

Exercice 10. Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} telle que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$. Montrer que f admet un minimum global sur \mathbb{R} .

Exercice 11. Etablir que les équations suivantes, d'inconnue x réelle, admettent au moins une solution.

1. $x^{17} + x^3 \sin(x) = 1$.
2. $x^2 \cos(x) + x \sin(x) = -1$.

Exercice 12. Déterminer toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant la propriété suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x)^2 - f(x) = 0.$$

Exercice 13. Pour tout entier naturel non nul n , on considère la fonction suivante :

$$f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n + 2x^2 + x - 1. \end{array}$$

1. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n , il existe un unique point x_n appartenant à $[0; \frac{1}{2}]$ tel que $f_n(x_n) = 0$.
2. Démontrer que, pour tout entier naturel non nul n , on a $f_{n+1}(x_n) \leq 0$.
3. En déduire que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.
4. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et calculer sa limite.

Exercice 14. Considérons la fonction suivante :

$$f: x \mapsto \sqrt{x^2 + 1} - x.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f . On le notera \mathcal{D}_f .
2. Montrer que la fonction f réalise une bijection de \mathcal{D}_f sur un ensemble que l'on précisera.

Exercice 15. On souhaite déterminer toutes les fonctions définies sur \mathbb{R} , continues en 0, vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(2x).$$

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$.
2. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(0)$.
3. Conclure.

Exercice 16. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$.

1. On suppose dans cette question uniquement que f est continue sur \mathbb{R} . Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(1)x$.
2. On suppose dans cette question uniquement que f est croissante sur \mathbb{R} . Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(1)x$.