

## Liste d'exercices n°17

## Espaces vectoriels

**Exercice 1.** Les ensembles suivants sont-ils des  $\mathbb{R}$ -sous-espaces vectoriels ? des  $\mathbb{C}$ -sous-espaces vectoriels ?

- |  |   |
|--|---|
| 1. $F = \{z \in \mathbb{C} \mid  z  = 1\}$                         | 7. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y^2 = 0\}$  |
| 2. $F = \{(2x + 3y, x, y - x) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$      | 8. $F = \{(2z + 3y, x) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$ |
| 3. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid  x  \geq 2y\}$           | 9. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 12\}$   |
| 4. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xyz = 0\}$               | 10. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$   |
| 5. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0\}$             | 11. $F = \{z \in \mathbb{C} \mid iz + \bar{z} = 0\}$      |
| 6. $F = \{x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } x = y\}$ |   |

**Exercice 2.** Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x + iy - z = 0\}$ .

1. Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{C}^3$ .
2. Soient les vecteurs  $e = (1, -i, 2)$  et  $f = (1, -2i, 3)$ .
  - (a) Montrer que les vecteurs  $e$  et  $f$  appartiennent à  $F$ .
  - (b) Soient les vecteurs  $u = (1, 0, 1)$ ,  $v = (0, 1, 1)$  et  $w = (-1, 1, 0)$ . Le vecteur  $u$  est-il combinaison linéaire
    - i. des vecteurs  $e$  et  $f$  ?
    - ii. des vecteurs  $v$  et  $w$  ?
  - (c) Soit  $a \in F$ . Le vecteur  $a$  est-il combinaison linéaire des vecteurs  $e$  et  $f$  ?

**Exercice 3.** Soit  $F = \{(-a, a, b, -b, -6a) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$ .

1. Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^5$ .
2. Donner un système d'équations cartésiennes de  $F$ .

**Exercice 4.** Soit  $E$  un espace vectoriel. Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Montrer que  $F \cup G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si et seulement si  $F \subset G$  ou  $G \subset F$ .

**Exercice 5.** Pour chacune des familles suivantes, préciser si la famille est libre, génératrice de  $\mathbb{R}^3$  et si c'est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

- |   |  |
|---|--|
| 1. $((9, -3, 7); (27, -9, 21))$             | 4. $((0, 4, 2); (2, -2, -3))$                      |
| 2. $((9, -3, 7); (27, -9, 21); (5, -5, 1))$ | 5. $((1, -1, 0); (0, 1, -1); (1, 1, 0))$           |
| 3. $((1, 2, 2); (5, 6, 6); (0, 0, 0))$      | 6. $((1, 0, -2); (2, 3, 1); (7, 9, 5); (1, 0, 1))$ |

**Exercice 6.** Soient

$$F = \{(4s, -5s, -s, -2s) \mid s \in \mathbb{R}\} \text{ et } G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - 5z + 2t = 0\}.$$

1. Montrer que  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^4$ .
2. Montrer que  $F$  est inclus dans  $G$ .
3. Construire une base de  $G$  en ajoutant des vecteurs à une base de  $F$ .

**Exercice 7.** Dans les trois cas suivants, montrer que  $E$  et  $F$  sont des sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel.

Déterminer alors une base de  $E$ , de  $F$  puis de  $E \cap F$ .

1.  $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$  et  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = y\}$
2.  $E = \{(x, y, 2y) \mid (x, y) \in \mathbb{C}^2\}$  et  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x = 0 \text{ et } y = 2iz\}$
3.  $E = \{(x, y, z, t, u, v) \in \mathbb{R}^6 \mid x + y + z = t - y + 3u = 2u + v - x = 2v + t\}$   
et  $F = \{(a + c, a + b - c, a + c, b + a, c - a + 2b, b) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$

**Exercice 8.** On pose  $\mathcal{B} = ((1, -1, -2); (1, -1, -3); (0, 1, -2))$  et  $\mathcal{B}' = ((1, 1, 1); (1, 2, 4); (1, 3, 9))$ .

1. Montrer que  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  sont des bases de  $\mathbb{R}^3$ .
2. (a) Quelles sont les coordonnées du vecteur  $(1, 2, 3)$  dans la base  $\mathcal{B}$ ?  
(b) Soit  $u = (x, y, z)$  un vecteur quelconque de  $\mathbb{R}^3$ . Déterminer les coordonnées de  $u$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
3. Soit  $u \in \mathbb{R}^3$  un vecteur tel que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Ecrire la matrice du vecteur  $u$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .

**Exercice 9.** Donner une base du sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^4$  engendré par les vecteurs suivants :

1.  $a = (1, 1, 0, 1), b = (1, -1, 1, 0), c = (2, 0, 1, 1)$  et  $d = (0, -2, 1, -1)$ .
2.  $u = (3, -6, 3, -9)$  et  $v = (-2, 4, -2, 6)$ .

**Exercice 10.** Soient  $E$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^n$  et  $(e_1, e_2, \dots, e_p)$  une famille libre de  $E$ . Les familles suivantes sont-elles libres ?

1.  $(e_1 - e_2, e_2 - e_3, \dots, e_{p-1} - e_p, e_p - e_1)$ .
2.  $(e_1, e_1 + e_2, \dots, e_1 + \dots + e_p)$ .

**Exercice 11.** Soient  $E$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^n$  et  $(e_1, e_2, e_3)$  une base de  $E$ . On définit les vecteurs suivants :

$$f_1 = e_1 + e_2, f_2 = e_3, f_3 = e_1 - e_2, f_4 = e_3 - e_1 \text{ et } f_5 = e_3 + 2e_2.$$

Les familles suivantes sont-elles libres ?

1.  $(f_1, f_2, f_3)$
2.  $(f_1, f_4, f_5)$
3.  $(f_1, f_2, f_3, f_4)$

**Exercice 12.** Soient  $a$  et  $b$  deux réels.

Trouver la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs suivants :

$$(a, 1, 1), (1, a, 1) \text{ et } (1, 1, a).$$

**Exercice 13.** Soit  $F$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^4$  engendré par les vecteurs

$$e_1 = (1, -2, 5, -3), e_2 = (2, 3, 1, -4) \text{ et } e_3 = (3, 8, -3, -5).$$

1. Trouver une base et la dimension de  $F$ .
2. Compléter cette base de  $F$  en une base de  $\mathbb{R}^4$ .

**Exercice 14.** Posons  $F = \text{Vect}\{(1, 3, -1), (1, -3, 2)\}$  et  $G = \text{Vect}\{(1, 9, -4), (0, 2, -1)\}$ . A-t-on  $F \subset G$ ?  $G \subset F$ ?  $F = G$ ?

**Exercice 15.** Quel est le rang des familles de vecteurs suivantes ?

1.  $((1, -2, 3, 1); (4, 5, 6, 7); (1, 0, 2, 3))$ .
2.  $((1, 3, 1, -2, -3); (1, 4, 3, -1, -4); (2, 3, -4, -7, -3); (3, 8, 1, -7, -8))$ .

**Exercice 16.**

1. Evaluer la dimension de  $\mathbb{C}^4$  vu comme un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
2. Déterminer le rang de la famille suivante (dans  $\mathbb{C}^4$  vu comme un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel) :  
 $((1, i, 1+i, -i); (-i, 0, 2-i, 1+i); (0, -1, 0, 1); (3i, -2-i, 3i, -5-i))$ .
3. Recommencer les deux questions précédentes en considérant  $\mathbb{C}^4$  comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

**Exercice 17.** Soient  $x_0, x_1, \dots, x_n, n+1$  scalaires distincts.

Pour tout  $i \in \llbracket 0; n \rrbracket$ , on note  $L_i \in \mathbb{K}[X]$  l'unique polynôme de degré au plus  $n$  vérifiant

$$\begin{cases} L_i(x_i) = 1 \\ \text{pour tout } j \in \llbracket 0; n \rrbracket \text{ tel que } j \neq i, L_i(x_j) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que la famille  $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$  forme une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
2. Montrer que pour tout  $P \in \mathbb{K}_n[X]$ ,  $P = \sum_{i=0}^n P(x_i)L_i$ .

**Exercice 18.** Soit  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  (resp.  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ ) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Montrer que  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
2. Déterminer les dimensions de  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ .
3. En déduire que  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

**Exercice 19.** Soit  $E = \mathbb{K}_3[X]$ .

Notons  $F = \{P \in E, P(0) = P(1) = P(2) = 0\}$ ,  $G = \{P \in E, P(1) = P(2) = P(3) = 0\}$  et  $H = \{P \in E, P(X) = P(-X)\}$ .

1. Vérifier que  $F, G$  et  $H$  sont des sous-espaces vectoriels de  $E$ .
2. Montrer que  $F \oplus G = \{P \in E, P(1) = P(2) = 0\}$ .
3. Montrer que  $E = (F \oplus G) \oplus H$ .