

---

CORRIGÉ DU DEVOIR MAISON N°13

---

## Problème 1 : Intégrales de Wallis

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on considère l'intégrale de Wallis

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx.$$

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\text{On a } W_{n+1} - W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}(x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)(\cos(x) - 1) dx.$$

Or, pour tout  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\cos^n(x) \geq 0$  et  $\cos(x) - 1 \leq 0$  donc  $\cos^n(x)(\cos(x) - 1) \leq 0$ .

Par croissance de l'intégrale, on en déduit que  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)(\cos(x) - 1) dx \leq 0$  donc  $W_{n+1} - W_n \leq 0$ .

Ainsi, la suite  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante.

2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On effectue une intégration par parties en posant  $u(x) = \cos^{n+1}(x)$ ,  $u'(x) = -(n+1)\sin(x)\cos^n(x)$ ,  $v'(x) = \cos(x)$  et  $v(x) = \sin(x)$ , on obtient

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \cos^{n+1}(x) dx \\ &= [\sin(x) \cos^{n+1}(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos^n(x) dx \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2(x)) \cos^n(x) dx \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx - (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(x) dx \\ &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2} \end{aligned}$$

donc  $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$  d'où  $\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$ .

3. • Montrons par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $W_{2n} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}$ .

Pour  $n = 0$ , on a  $W_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^0(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$  et  $\frac{\pi}{2} \frac{(2 \times 0)!}{(2^0 0!)^2} = \frac{\pi}{2}$ , donc la propriété est vraie au rang  $n = 0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  fixé. Supposons que  $W_{2n} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}$ . Montrons que la propriété est vraie au

rang  $n + 1$ , i.e.  $W_{2n+2} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n+2)!}{(2^{n+1} (n+1)!)^2}$ .

D'après la question précédente, on a  $W_{2n+2} = \frac{2n+1}{2n+2}W_{2n}$ . En utilisant l'hypothèse de récurrence, on en déduit que

$$W_{2n+2} = \frac{2n+1}{2n+2} \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n+1)!}{2(n+1)(2^n n!)^2} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n+2)!}{(2n+2)2(n+1)(2^n n!)^2} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n+2)!}{2^2(n+1)^2(2^n n!)^2}$$

d'où  $W_{2n+2} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n+2)!}{(2^{n+1}(n+1)!)^2}$ , ce qui prouve la formule au rang  $n+1$  et achève la récurrence.

Ainsi,  $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, W_{2n} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}}$ .

• Montrons par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $W_{2n+1} = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}$ .

Pour  $n=0$ , on a  $W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = [\sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1$  et  $\frac{(2^0 0!)^2}{(2 \times 0 + 1)!} = 1$ , donc la propriété est vraie au rang  $n=0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  fixé. On suppose que  $W_{2n+1} = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}$ . Montrons la propriété au rang  $n+1$ , i.e.  $W_{2n+3} = \frac{(2^{n+1}(n+1)!)^2}{(2n+3)!}$ .

D'après la question précédente, on a  $W_{2n+3} = \frac{2n+2}{2n+3}W_{2n+1}$ . En utilisant l'hypothèse de récurrence, on en déduit que

$$W_{2n+3} = \frac{2n+2}{2n+3} \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{(2n+2)^2(2^n n!)^2}{(2n+3)(2n+2)(2n+1)!} = \frac{2^2(n+1)^2(2^n n!)^2}{(2n+3)!} = \frac{(2^{n+1}(n+1)!)^2}{(2n+3)!},$$

ce qui prouve la formule au rang  $n+1$  et achève la récurrence.

Ainsi,  $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, W_{2n+1} = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}}$ .

4. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

• Si  $n$  est pair, il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $n = 2k$  et d'après la question précédente, on a

$$(n+1)W_n W_{n+1} = (2k+1)W_{2k} W_{2k+1} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} = \frac{\pi}{2} \frac{2k+1}{2k+1} = \frac{\pi}{2}.$$

• Si  $n$  est impair, il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $n = 2k+1$  et d'après la question précédente, on a

$$\begin{aligned} (n+1)W_n W_{n+1} &= (2k+2)W_{2k+1} W_{2k+2} \\ &= (2k+2) \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} \frac{\pi}{2} \frac{(2k+2)!}{(2^{k+1}(k+1)!)^2} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{(2k+2)^2}{(2(k+1))^2} \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Finalement,  $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, (n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}}$ .

5. Puisque la suite  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante, on a pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$ .  
 Par ailleurs, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $W_n$  est l'intégrale d'une fonction continue positive et non identiquement nulle sur  $[0, \frac{\pi}{2}]$  donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $W_n > 0$  d'où en divisant par  $W_n$  les inégalités ci-dessus, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1,$$

i.e. pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1$ .

Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$ , on déduit du théorème des gendarmes que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$ ,

i.e.  $\boxed{W_n \underset{+\infty}{\sim} W_{n+1}}$ .

Puisque  $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$ , on a donc d'après la question précédente :

$$\frac{\pi}{2} = (n+1)W_n W_{n+1} \underset{+\infty}{\sim} nW_n^2$$

d'où  $W_n^2 \underset{+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2n}$ .

Ainsi,  $\sqrt{W_n^2} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ . Or, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $W_n > 0$  donc  $\sqrt{W_n^2} = |W_n| = W_n$ .

On en conclut que

$$\boxed{W_n \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}}$$

6. (a) Posons pour tout  $x > -1$ ,  $f(x) = x - \ln(1+x)$ .

La fonction  $f$  est dérivable sur  $] -1, +\infty[$  et on a pour tout  $x > -1$  :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

Pour tout  $x > -1$ ,  $1+x > 0$  donc le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x$ . On obtient donc le tableau de variation suivant :

|         |           |            |            |
|---------|-----------|------------|------------|
| $x$     | -1        | 0          | $+\infty$  |
| $f'(x)$ |           | -          | +          |
| $f$     | $+\infty$ | $\searrow$ | $\nearrow$ |
|         |           | 0          |            |

Pour tout  $x \in ] -1, 0[$ ,  $f'(x) < 0$  donc la fonction  $f$  est strictement décroissante sur  $[-1, 0]$ . Pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ ,  $f'(x) > 0$  donc la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ .

On en déduit que  $f$  admet un minimum en  $x = 0$  donc pour tout  $x > -1$ ,  $f(x) \geq f(0) = 0$  i.e.

$$\boxed{\forall x > -1, x \geq \ln(1+x)}.$$

- (b) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soit  $x \in [0, \sqrt{n}]$ .

- Si  $x = \sqrt{n}$ , alors  $x^2 = n$  donc  $1 - \frac{x^2}{n} = 0$  d'où  $\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n = 0 \leq e^{-x^2}$ .
- Si  $x \in [0, \sqrt{n}[$ ,  $-\frac{x^2}{n} > -1$  donc d'après la question précédente :

$$\ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right) \leq -\frac{x^2}{n}$$

puis

$$n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right) \leq -x^2.$$

Par croissance de la fonction exponentielle, on en déduit que

$$e^{n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)} \leq e^{-x^2}.$$

Finalement, on a bien pour tout  $x \in [0, \sqrt{n}]$ ,  $\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq e^{-x^2}$ .

Par ailleurs, pour tout  $x \in [0, \sqrt{n}]$ ,  $\frac{x^2}{n} > -1$  donc d'après la question précédente :

$$\ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \leq \frac{x^2}{n}$$

d'où, par multiplication par  $-n < 0$  :

$$-n \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \geq -x^2$$

puis par croissance de la fonction exponentielle :

$$e^{-n \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)} \geq e^{-x^2},$$

i.e. pour tout  $x \in [0, \sqrt{n}]$ ,  $e^{-x^2} \leq \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ .

Finalement, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , pour tout  $x \in [0, \sqrt{n}]$ ,

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq e^{-x^2} \leq \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}.$$

Enfin, par croissance de l'intégrale, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

(c) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$

- Posons le changement de variable  $x = \sqrt{n} \sin(t)$  pour  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$  dans la première intégrale.

On a alors  $x^2 = n \sin^2(t)$ ,  $dx = \sqrt{n} \cos(t) dt$ . Par ailleurs, quand  $x = \sqrt{n}$ ,  $\sin(t) = 1$  donc  $t = \frac{\pi}{2}$  et quand  $x = 0$ ,  $\sin(t) = 0$  donc  $t = 0$ .

On obtient

$$\begin{aligned}
\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(t))^n \sqrt{n} \cos(t) dt \\
&= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2(t))^n \cos(t) dt \\
&= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(t) dt
\end{aligned}$$

donc  $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \sqrt{n}W_{2n+1}$ , ce qui prouve d'après la question précédente

que  $\sqrt{n}W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx$ .

• Posons le changement de variable  $x = \sqrt{n} \tan(t)$  pour  $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$  dans la troisième intégrale.

On a alors  $x^2 = n \tan^2(t)$ ,  $dx = \sqrt{n}(1 + \tan^2(t))dt$ . Par ailleurs, quand  $x = \sqrt{n}$ ,  $\tan(t) = 1$  donc  $t = \frac{\pi}{4}$  et quand  $x = 0$ ,  $\tan(t) = 0$  donc  $t = 0$ .

On obtient

$$\begin{aligned}
\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2(t))^{-n} \sqrt{n}(1 + \tan^2(t)) dt \\
&= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^{1-n} dt \\
&= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}(t) dt.
\end{aligned}$$

Or, d'après la relation de Chasles,

$$W_{2n-2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}(t) dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(t) dt \geq \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}(t) dt$$

car pour tout  $t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\cos^{2n-2}(t) \geq 0$  donc  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(t) dt \geq 0$ .

En multipliant par  $\sqrt{n}$ , on obtient alors

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}(t) dt \leq \sqrt{n}W_{2n-2},$$

ce qui implique finalement d'après la question précédente que

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n}W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx \leq \sqrt{n}W_{2n-2}.}$$

(d) • On a montré en question 5 que  $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$  donc

$$W_{2n+1} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} = \sqrt{\frac{\pi}{4n+2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\pi}{4 + \frac{2}{n}}}$$

puis  $\sqrt{n}W_{2n+1} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4 + \frac{2}{n}}}$ .

Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{4 + \frac{2}{n}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ , on en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}W_{2n+1} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

• De même,

$$W_{2n-2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(2n-2)}} = \sqrt{\frac{\pi}{4n-4}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\pi}{4 - \frac{4}{n}}}$$

donc  $\sqrt{n}W_{2n-2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4 - \frac{4}{n}}}$ .

Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{4 - \frac{4}{n}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ , on en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}W_{2n-2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

D'après le théorème des gendarmes, on en conclut que

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.}$$

## Problème 2 : Irrationalité de $\pi$

1. (a)  $I_0 = \pi \int_0^1 f_0(t) \sin(\pi t) dt = \pi \int_0^1 \sin(\pi t) dt = \pi \left[ -\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right]_0^1 = -\cos(\pi) + \cos(0)$

donc  $\boxed{I_0 = 2.}$

D'autre part, on a  $I_1 = \pi^3 \int_0^1 f_1(t) \sin(\pi t) dt = \pi^3 \int_0^1 (t - t^2) \sin(\pi t) dt$ .

On effectue une intégration par parties en posant  $u(t) = t - t^2$ ,  $u'(t) = 1 - 2t$  et  $v'(t) = \sin(\pi t)$ , d'où  $v(t) = -\frac{1}{\pi} \cos(\pi t)$ . On obtient

$$\begin{aligned} I_1 &= \pi^3 \left( \left[ -\frac{1}{\pi} (t - t^2) \cos(\pi t) \right]_0^1 \right) - \pi^3 \int_0^1 -\frac{1}{\pi} (1 - 2t) \cos(\pi t) dt \\ &= \pi^2 \int_0^1 (1 - 2t) \cos(\pi t) dt. \end{aligned}$$

On effectue une nouvelle intégration par parties en posant  $u(t) = 1 - 2t$ , d'où  $u'(t) = -2$  et  $v'(t) = \cos(\pi t)$  d'où  $v(t) = \frac{1}{\pi} \sin(\pi t)$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} I_1 &= \pi^2 \left( \left[ \frac{1}{\pi} (1 - 2t) \sin(\pi t) \right]_0^1 + \frac{2}{\pi} \int_0^1 \sin(\pi t) dt \right) \\ &= 2\pi \left[ -\frac{1}{\pi} \cos(\pi t) \right]_0^1 \\ &= -2(\cos(\pi) - \cos(0)) \end{aligned}$$

donc  $\boxed{I_1 = 4.}$

(b) Soit  $n \geq 2$ . La fonction  $f_n$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme composée de fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  de dérivée pour tout  $t \in \mathbb{R}$  :

$$f'_n(t) = n(1 - 2t)(t - t^2)^{n-1}.$$

De même,  $f'_n$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  et puisque  $n - 1 \geq 1$ , on a pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned}
 f''_n(t) &= -2n(t - t^2)^{n-1} + n(n-1)(1-2t)^2(t-t^2)^{n-2} \\
 &= (t-t^2)^{n-2}(-2n(t-t^2) + n(n-1)(1-2t)^2) \\
 &= (t-t^2)^{n-2}(-2nt + 2nt^2 + n(n-1)(1-4t+4t^2)) \\
 &= (t-t^2)^{n-2}(n(n-1) + (-4n^2 + 2n)t + (4n^2 - 2n)t^2) \\
 &= (t-t^2)^{n-2}(n(n-1) + (4n^2 - 2n)(t^2 - t)) \\
 &= (t-t^2)^{n-2}(n(n-1) - 2n(2n-1)(t-t^2)) \\
 &= n(n-1)(t-t^2)^{n-2} - 2n(2n-1)(t-t^2)^{n-1}
 \end{aligned}$$

d'où  $\boxed{\text{pour tout } t \in \mathbb{R}, f''_n(t) = -2n(2n-1)f_{n-1}(t) + n(n-1)f_{n-2}(t).}$

Remarquons que puisque  $n \geq 2$  et  $n-1 \geq 1$ , on a  $f_n(0) = f_n(1) = f'_n(0) = f'_n(1) = 0$ .

En réalisant deux intégrations par parties successives, on trouve

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \int_0^1 f_n(t) \sin(\pi t) dt \\
 &= \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \left( \left[ -\frac{1}{\pi} f_n(t) \cos(\pi t) \right]_0^1 + \frac{1}{\pi} \int_0^1 f'_n(t) \cos(\pi t) dt \right) \\
 &= \frac{\pi^{2n}}{n!} \int_0^1 f'_n(t) \cos(\pi t) dt \\
 &= \frac{\pi^{2n}}{n!} \left( \left[ \frac{1}{\pi} f'_n(t) \sin(\pi t) \right]_0^1 - \frac{1}{\pi} \int_0^1 f''_n(t) \sin(\pi t) dt \right) \\
 &= -\frac{\pi^{2n-1}}{n!} \int_0^1 (-2n(2n-1)f_{n-1}(t) + n(n-1)f_{n-2}(t)) \sin(\pi t) dt \\
 &= 2n(2n-1) \frac{\pi^{2n-1}}{n!} \int_0^1 f_{n-1}(t) \sin(\pi t) dt - n(n-1) \frac{\pi^{2n-1}}{n!} \int_0^1 f_{n-2} \sin(\pi t) dt \\
 &= 2(2n-1) \frac{\pi^{2(n-1)+1}}{(n-1)!} \int_0^1 f_{n-1}(t) \sin(\pi t) dt - \pi^2 \frac{\pi^{2(n-2)+1}}{(n-2)!} \int_0^1 f_{n-2} \sin(\pi t) dt
 \end{aligned}$$

d'où  $\boxed{\text{pour tout } n \geq 2, I_n = 2(2n-1)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}.}$

2. Pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $\pi t \in [0, \pi]$  donc  $0 \leq \sin(\pi t) \leq 1$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

• Si  $n = 0$ , pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $f_0(t) = 1$  donc on a bien pour tout  $t \in [0, 1]$ ,

$$0 \leq f_0(t) \sin(\pi t) = \sin(\pi t) \leq 1.$$

• Supposons que  $n > 0$ .

On a vu que pour tout  $t \in [0, 1]$   $f'_n(t) = n(1-2t)(t-t^2)^{n-1} = n(1-2t)t^{n-1}(1-t)^{n-1}$ .

Or, pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $nt^{n-1}(1-t)^{n-1} \geq 0$  donc  $f'_n(t)$  est du signe de  $1-2t$ , i.e.  $f'_n(t) \geq 0$  si  $t \in [0, \frac{1}{2}]$  et  $f'_n(t) \leq 0$  si  $t \in [\frac{1}{2}, 1]$ .

Ainsi, la fonction  $f_n$  est croissante sur  $[0, \frac{1}{2}]$  et décroissante sur  $[\frac{1}{2}, 1]$ .

Puisque  $n \geq 1$ , on a  $f_n(0) = f_n(1) = 0$  et  $f_n(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2} - \frac{1}{4})^n = \frac{1}{4^n}$  donc pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $0 \leq f_n(t) \leq \frac{1}{4^n}$ .

On a donc bien pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $0 \leq f_n(t) \sin(\pi t) \leq \frac{1}{4^n} \sin(\pi t) \leq \frac{1}{4^n}$ .

Finalement, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $0 \leq f_n(t) \sin(\pi t) \leq \frac{1}{4^n}$ .

Par croissance de l'intégrale, on en déduit que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$0 \leq \int_0^1 f_n(t) \sin(\pi t) dt \leq \int_0^1 \frac{1}{4^n} dt$$

d'où

$$0 \leq \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \int_0^1 f_n(t) \sin(\pi t) dt \leq \frac{\pi^{2n+1}}{4^n n!},$$

i.e. pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq I_n \leq \frac{\pi^{2n+1}}{4^n n!}$ .

3. (a) Montrons par une récurrence de pas double que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $b^n I_n \in \mathbb{N}$ .

• **Initialisation** : Pour  $n = 0$ , on a  $b^0 I_0 = 2$  et pour  $n = 1$ , on a  $b^1 I_1 = b I_1 = 4b \in \mathbb{N}$ .

• **Hérédité** : Soit  $n \geq 2$  fixé. On suppose que  $b^{n-2} I_{n-2} \in \mathbb{N}$  et  $b^{n-1} I_{n-1} \in \mathbb{N}$ .

Montrons que  $b^n I_n \in \mathbb{N}$ .

D'après la question 1.b), on a

$$\begin{aligned} b^n I_n &= b^n (2(2n-1) I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}) \\ &= 2(2n-1) b b^{n-1} I_{n-1} - b^2 \pi^2 b^{n-2} I_{n-2} \\ &= 2(2n-1) b b^{n-1} I_{n-1} - a^2 b^{n-2} I_{n-2}. \end{aligned}$$

Or, par hypothèse de récurrence,  $b^{n-2} I_{n-2} \in \mathbb{N}$  et  $b^{n-1} I_{n-1} \in \mathbb{N}$  donc  $b^n I_n \in \mathbb{Z}$ .

Enfin, puisque  $b^n I_n \geq 0$ , on a bien  $b^n I_n \in \mathbb{N}$ , ce qui prouve la propriété au rang  $n$  et achève la récurrence.

On a donc bien montré que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $b^n I_n \in \mathbb{N}$ .

(b) D'après la question 2, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$0 \leq b^n I_n \leq \frac{b^n \pi^{2n+1}}{4^n n!} = \frac{\pi}{4^n} \frac{(b\pi^2)^n}{n!}.$$

Puisque  $4 > 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4^n} = 0$ .

D'autre part, par croissance comparée,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(b\pi^2)^n}{n!} = 0$  donc par produit de limites,

on obtient  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b^n I_n = 0$ .

(c) D'après les deux questions précédentes, la suite  $(b^n I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tend vers 0 et est à valeurs positives donc il existe un  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq n_0$ ,  $0 \leq b^n I_n \leq \frac{1}{2}$ .

Puisque pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $b^n I_n \in \mathbb{N}$ , on en déduit que  $b^{n_0} I_{n_0} = 0$ , d'où  $I_{n_0} = 0$  puisque  $b \neq 0$ .

Comme  $I_{n_0} = \frac{\pi^{2n_0+1}}{n_0!} \int_0^1 f_{n_0}(t) \sin(\pi t) dt$ , alors  $\int_0^1 f_{n_0}(t) \sin(\pi t) dt = 0$ .

Or, on a déjà vu que la fonction  $t \mapsto f_{n_0}(t) \sin(\pi t)$  est continue et positive sur  $[0, 1]$  donc l'intégrale  $I_{n_0}$  est nulle si et seulement si pour tout  $t \in [0, 1]$   $f_{n_0}(t) \sin(\pi t) = 0$ ,

ce qui est absurde car  $f_{n_0}(\frac{1}{2}) \sin(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{4^{n_0}} > 0$ .

Ainsi, ayant supposé que  $\pi$  est rationnel, on aboutit à une contradiction.

Le nombre  $\pi$  est donc irrationnel.