

<b>Colle n° 12, semaine du 15/12 au 20/12</b>
---

## Dérivation

### 1. Dérivabilité en un point

Rappels sur dérivabilité en un point, l'équation de la tangente au graphe. La dérivabilité implique la continuité. Dérivée à droite et à gauche en un point. Développement limité d'ordre 1 en un point.

### 2. Opérations sur les dérivées

Rappel sur les opérations : somme, produit, quotient et composition de fonctions dérivables, fonction réciproque d'une fonction bijective dérivable (formules admises).

### 3. Fonctions dérivables sur un intervalle

- Extremum local en un point  $x_0$  d'une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  : condition nécessaire sur  $f'(x_0)$  si  $x_0$  n'est pas une extrémité de  $I$ .
- Théorème de Rolle, théorème des accroissements finis, et inégalité des accroissements finis : si  $|f'| \leq M$  sur un intervalle  $I$ ,  $f$  est  $M$ -lipschitzienne sur  $I$ .
- Applications des accroissements finis : caractérisation de la monotonie sur un intervalle par le signe de la dérivée, théorème de la limite d'une dérivée : si  $f$  est continue sur un intervalle  $I$  et dérivable sur  $I \setminus \{a\}$  et que  $f'$  admet une limite  $\ell$  (finie ou infinie) en  $a$ , alors  $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$  admet la limite  $\ell$  en  $a$  ; en particulier  $f$  est dérivable en  $a$  si  $\ell$  est finie, avec  $f'(a) = \ell$ .

### 4. Dérivées d'ordre supérieur

Fonctions de classe  $\mathcal{D}^n$ ,  $\mathcal{C}^n$ ,  $\mathcal{C}^\infty$ . Calcul des dérivées  $n$ -ièmes pour les exemples suivants : fonctions puissances,  $\cos, \sin, \exp, \ln$ . Opérations sur les dérivées d'ordre supérieur, formule de Leibniz pour la dérivée  $n$ -ième d'un produit. et application aux dérivées successives d'une composée et d'un quotient (admis).

### 5. Fonctions convexes

- Définition d'une fonction convexe ou concave sur un intervalle. Exemples.
- Caractérisation pour les fonctions dérivables : si  $f'$  est croissante sur  $I$ , alors  $f$  est convexe (réciproque admise). Utilisation du signe de  $f''$  pour les fonctions deux fois dérivables.  
Si  $f$  est convexe et dérivable, la courbe de  $f$  est au dessus de ses tangentes.

### 6. Fonctions dérivables à valeurs complexes

Les théorème de Rolle et des accroissements finis ne sont plus vrais, l'inégalité des accroissements finis reste vraie (avec des modules).

## Questions de cours envisageables

1. Théorème de Rolle.
2. Théorème de la limite d'une dérivée.
3. Si  $f$  est dérivable sur un intervalle  $I$  et que  $f'$  est croissante sur  $I$ , alors  $f$  est convexe sur  $I$ .