

Espaces vectoriels

1. **Structure de K -espace vectoriel (K -ev), avec $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.**
 - Définition d'un K -espace vectoriel, exemples de référence. Règles de calcul.
 - Combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs : définition, exemples.
2. **Sous-espaces vectoriels (ssev)**
 - Définition, caractérisation, exemples.
 - L'intersection de deux ssev est un ssev.
 - Sous-espace vectoriel engendré par une famille finie $\mathcal{F} = \{e_1, \dots, e_n\}$ de vecteurs d'un K -espace vectoriel E : $\text{vect}(e_1, \dots, e_n)$ est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de $e_1, \dots, e_n$, c'est le plus petit ssev de E contenant $\mathcal{F}$.
Si $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$, alors $\text{vect}(\mathcal{F}_1) \subset \text{vect}(\mathcal{F}_2)$.
 $\text{vect}(e_1, \dots, e_n) = \text{vect}(e_1, \dots, e_n, e_{n+1}) \iff e_{n+1} \in \text{vect}(e_1, \dots, e_n)$.
3. **Familles de vecteurs**
 - Famille génératrice, famille génératrice d'un ssev : définitions, exemples.
 - Famille liée, libre : définitions, cas d'une famille de deux vecteurs. Exemples dans K^n : lien avec la résolution d'un système homogène à n équations et p inconnues (nombre de vecteurs de la famille). Si $p \geq n + 1$, toute famille de p vecteurs de K^n est liée (admis).
Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sont deux familles telles que $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$, alors $\mathcal{F}$ liée $\Rightarrow \mathcal{F}'$ liée (et donc $\mathcal{F}'$ libre $\Rightarrow \mathcal{F}$ libre).
 - Une famille est liée *si et seulement si* au moins un des vecteurs est combinaison linéaire des autres.
Si $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est libre *si et seulement si* $e_{n+1} \notin \text{vect}(e_1, \dots, e_n)$.
Toute famille finie de polynômes non nuls et de degrés échelonnés est libre.
 - Base : définition (famille libre et génératrice), caractérisation (tout vecteur s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille).
Bases canoniques de K^n , $K_n[X]$ et $\mathcal{M}_{n,p}(K)$, définition des coordonnées d'un vecteur dans une base.

Questions de cours envisageables

1. $\text{vect}(e_1, \dots, e_n)$ est un sous-espace vectoriel de E , le plus petit contenant $\{e_1, \dots, e_n\}$.
2. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est libre *si et seulement si* $e_{n+1} \notin \text{vect}(e_1, \dots, e_n)$.
3. Toute famille finie de polynômes non nuls et de degrés échelonnés est libre.