

Programme de Colle n°1
PCSI 2023-2023
(18 au 22 septembre 2023)

Inégalité dans \mathbb{R}

- Résolution d'inéquation avec des racines carrées
- Résolution d'inéquation avec des valeurs absolues (Inégalité triangulaire)
- Utiliser la monotonie d'une fonction pour démontrer une inéquation, résoudre une inéquation
- Démontrer la monotonie d'une fonction sans dérivation (ou avec dérivation)
- Majorant et minorant d'une partie de \mathbb{R}

Généralité sur les fonctions

- Ensemble de définition
- Graphe d'une fonction
- Limite et asymptotes horizontale et verticale
- Graphe d'une réciproque (Savoir montrer qu'une application $f: I \rightarrow J$ est bijective et trouver une réciproque)

Dérivation

- Dérivation des fonctions usuelles de première et terminale
- Dérivation d'une composée
- Dérivée n-ième
- Calcul de limite
- Equation de la tangente
- Monotonie

Tous les exercices du TD I,II, III

Question de cours

Chapitre I :

- Inégalité triangulaire (sans démonstration) :

Propriété II.a.3 (Inégalité triangulaire sur \mathbb{R}) :

$$\forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, \quad ||x| - |x'|| \leq |x + x'| \leq |x| + |x'|$$

Remarque : Les cas d'égalités seront traités dans le chapitre des complexes.

Chapitre III :

- **Exemple I.e.1 :** On pose :

$$g: \begin{cases}]0; +\infty[\rightarrow]0; +\infty[\\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

Déterminer $g^{(n)}$ pour tout entier naturel non nul.

- **Proposition (Equation de la tangente) II.a.1 :** Soit f une fonction dérivable en $x=a$. Alors l'équation de la tangente en $x=a$ est donnée par :

$$(T_a): y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Exercices à savoir refaire

TD I :

- **Application II.a.4** : Démontrer que :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$$

- **Exercice B.1** : Démontrer les inégalités suivantes :

$$\text{a) } \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2) \quad \text{b) } \forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, ab + ac + bc \leq a^2 + b^2 + c^2$$

- **Exercice B6 du TD I** : 1) Démontrer que :

$$\forall x > 0, x + \frac{1}{x} \geq 2$$

2) En déduire par récurrence que :

$$\left(\sum_{k=1}^n a_i \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \geq n^2$$

TD III :

- **Exercice C.1** : On pose :

$$\forall m \in \mathbb{R}, f_m : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x+m}{x^2+1} \end{cases}$$

On note C_m sa courbe représentative.

- 1) Montrer que les tangentes aux courbes C_m au point d'abscisse 0 sont parallèles.
- 2) Montrer que les tangentes aux courbes C_m au point d'abscisse 1 sont concourantes.

- **Application II.c.4** : Démontrer que :

$$\forall x \geq 0, x \geq \sin(x) \geq x - \frac{x^3}{6}$$