

## Corrigé du devoir à la maison

### Exercice 1. Diverses propriétés des fonctions continues

Dans tout cet exercice, on considère  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue.

1. Parmi les différentes affirmations ci-dessous, prouver celles qui sont vraies ou donner un contre-exemple lorsqu'elles sont fausses.

- (a) Si  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ , alors  $f$  admet un maximum sur  $\mathbb{R}$ .

Cette proposition est vraie : considérons le nombre  $f(0)$ , on a  $m \in \mathbb{R}$  tel que  $x \leq m \Rightarrow f(x) \leq f(0)$  puisque la limite de  $f$  en  $-\infty$  est  $-\infty$ , et  $M \in \mathbb{R}$  tel que  $x \geq M \Rightarrow f(x) \leq f(0)$  puisque la limite de  $f$  en  $+\infty$  est  $-\infty$ .

Sur l'intervalle  $[m, M]$ , la fonction  $f$  est continue, donc elle est bornée et atteint ses bornes. Elle admet en particulier un maximum  $f(x_0)$  atteint en  $x_0 \in [m, M]$ . Ce maximum est un maximum sur  $\mathbb{R}$  puisque si  $x \notin [m, M]$ , on a  $f(x) \leq f(0) \leq f(x_0)$ .

- (b) Si  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , alors  $f$  n'est pas bornée : cette proposition est fausse comme le montre la fonction Arctan qui est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ .
- (c) Si  $f$  est périodique, alors  $f$  admet un maximum sur  $\mathbb{R}$  : cette proposition est vraie car, si l'on note  $T > 0$  une période de la fonction, il suffit de considérer la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0, T]$  où elle est continue.  $f$  admet donc sur cet intervalle un maximum, qui est alors un maximum sur  $\mathbb{R}$  par périodicité.

### Exercice 2. Suites définies par récurrence

On considère dans cet exercice les suites définies par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

On notera  $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, g(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}.$$

1. Justifier que les suites du type décrit précédemment sont bien définies.

Par la fonction  $g$ , on constate que  $\mathbb{R}^*$  est stable. En effet, si  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a l'alternative  $x < 0$  et alors  $g(x) < 0$  ou  $x > 0$  et alors  $g(x) > 0$  donc dans les deux cas, on a bien  $g(x) \in \mathbb{R}^*$ .


Puisque  $\mathbb{R}^*$  est stable par  $g$ , les suites récurrentes de cet exercice sont bien définies.

2. Etudier les variations de la fonction  $g$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

$g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  et l'on a si  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :

$$g'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 2}{2x^2}.$$

Ainsi, sur  $]0, \sqrt{2}]$ ,  $g$  est décroissante tandis que  $g$  est croissante sur  $[\sqrt{2}, +\infty[$ .



3. Etudier le signe de  $g(x) - x$  pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . On calcule :

$$g(x) - x = \frac{1}{x} - \frac{x}{2} = \frac{2 - x^2}{2x},$$

et l'on en déduit le tableau de signe suivant :

$x$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$g(x) - x$		+	0
		-	

4. Si  $u_0 \in [\sqrt{2}, +\infty[$ , prouver que la suite  $(u_n)$  est décroissante et minorée.

On commence par remarquer que  $[\sqrt{2}, +\infty[$  est un intervalle stable par la fonction  $g$  : soit  $x \in [\sqrt{2}, +\infty[$ , on a par croissance de  $g$  sur cet intervalle  $g(\sqrt{2}) \leq g(x)$  i.e.  $\sqrt{2} \leq g(x)$  donc  $g(x) \in [\sqrt{2}, +\infty[$ . Puisque l'intervalle  $[\sqrt{2}, +\infty[$  est stable, la suite  $(u_n)$  est minorée par  $\sqrt{2}$  si  $u_0 \geq \sqrt{2}$ .

On déduit alors du tableau de signe précédent que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $g(u_n) \leq 0$ , c'est à dire  $g(u_n) - u_n \leq 0$  i.e.  $u_{n+1} \leq u_n$ . La suite est donc décroissante.

5. Si  $u_0 \geq \sqrt{2}$ , prouver que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \sqrt{2}$ .

D'après la question précédente, d'après le théorème de la limite monotone,  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \in [\sqrt{2}, +\infty[$ . Comme  $g$  est continue, on a  $g(l) = l$ , c'est à dire  $g(l) - l = 0$  ce qui n'est possible que pour  $l = \sqrt{2}$ .

6. Que pouvez-vous dire si  $u_0 \in ]0, \sqrt{2}[$  ?

On remarque grâce aux variations de  $f$  que si  $u_0 \in ]0, \sqrt{2}[$ , alors  $u_1 = g(u_0) \in [\sqrt{2}, +\infty[$ . Ainsi, la suite  $(u_n)$  est à termes dans  $[\sqrt{2}, +\infty[$  et décroissante à partir du rang 1. On a donc encore  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \sqrt{2}$ .

7. Que pouvez-vous dire si  $u_0 \in \mathbb{R}_-^*$  ? On a un comportement symétrique au cas où  $u_0 > 0$  dans la mesure où  $f$  est impaire : si  $u_0 \in ]-\infty, -\sqrt{2}[$ , la suite est croissante et converge vers  $-\sqrt{2}$ ; si  $u_0 \in ]-\sqrt{2}, 0[$ , alors  $u_1 \in ]-\infty, -\sqrt{2}[$  et l'on a encore  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\sqrt{2}$ .