

Fonctions de référence

I. Fonctions usuelles

I.1. Logarithmes, exponentielle

a) Logarithmes



Définition 7.1 (Logarithme népérien)

D'après la proposition 4.33, la fonction $f : x \in]0, +\infty[\mapsto \frac{1}{x} \in \mathbb{R}$ admet une unique primitive qui s'annule en 1. Elle se note $\ln$ et s'appelle la fonction **logarithme népérien**.



Remarque

- La fonction $F : x \in \mathbb{R}^* \mapsto \ln|x|$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ de dérivée $x \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{1}{x}$. C'est évident sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, $F'(x) = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x}$.
- On utilise souvent en physique, chimie et sciences de l'ingénieur la fonction **logarithme décimal** notée $\log_{10}$ ou plus simplement $\log$ et définie par $\log_{10} : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{\ln x}{\ln 10} \in \mathbb{R}$.

Propriété 7.2 (Propriétés opératoires)

- Pour $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.
- Pour $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.
- Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$, $n \in \mathbb{Z}$, $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

Démonstration

Propriété 7.3 (Variation, limites)

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. De plus,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

Démonstration

Corollaire 7.4

La fonction $\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$.

Notation

| On note e l'unique réel tel que $\ln(e) = 1$. Approximativement, $e \simeq 2,7$.

Ex. 7.1 Établir, pour $x \in]-1, +\infty[$, $\ln(1+x) \leq x$.

En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ diverge vers $+\infty$.

Cor. 7.1

Ex. 7.2 Montrer que, pour $x > 0$, $\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$.

En déduire que $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ vérifie : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln(n+1) < S_n < 1 + \ln(n)$.

Cor. 7.2

b) Exponentielle

Définition 7.5 (Exponentielle)

| La fonction exponentielle, notée $\exp$, est la bijection réciproque de la fonction $\ln$.

Remarque

| Pour tout entier relatif n , on a $\ln(e^n) = n \ln(e) = n = \ln(\exp(n))$. On en déduit, $\ln$ étant injective, que $\exp(n) = e^n$. On généralise en notant, pour tout réel x , $\exp(x) = e^x$.

Propriété 7.6 (Dérivée de l'exponentielle)

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x)$.

Démonstration

Propriété 7.7 (Propriétés opératoires)

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

- $e^{x+y} = e^x e^y$ (équation fonctionnelle).
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$.

Démonstration

Ex. 7.3 (Cor.) Établir, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $\exp\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) = \prod_{i=1}^n \exp(a_i)$.


Ex. 7.4 Établir, pour $n \in \mathbb{Z}$ et $a \in \mathbb{R}$, $\exp(na) = (\exp(a))^n$.

Cor. 7.4

Ex. 7.5 Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$.

En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{k/n}}{n} \geq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n}$

puis que $e \geq \frac{5}{2}$.

c) Synthèse et représentations graphiques**Exponentielle et logarithme**

Valeur de x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $\exp(x)$			
Variations de $\exp$			

Valeur de x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $\frac{1}{x}$			
Variations de $\ln x $			

I.2. Puissances**Définition 7.8 (Fonctions puissances)**

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction puissance α , notée p_α , est définie par $p_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \end{cases}$.

**Remarque**

- Pour $\alpha \in \mathbb{N}$, la fonction p_α est définie sur $\mathbb{R}$ et pour $\alpha \in \mathbb{Z}_-^*$ elle est définie sur $\mathbb{R}^*$. Pour toute autre valeur de α , la fonction p_α est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et se prolonge pour $\alpha > 0$ par continuité par 0 en 0.
- **Il est très important de retenir que, par définition,**

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall b \in \mathbb{R}, a^b = e^{b \ln a}.$$

Dans la plupart des problèmes faisant intervenir des puissances d'exposant non entier, c'est la seconde expression qui permet de parvenir au résultat.

Propriété 7.9 (Dérivée)


L'application p_α est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $x > 0$, $p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

Démonstration**Propriété 7.10 (Propriétés opératoires, variations, limites)**

- Pour tous $\alpha \in \mathbb{R}$ et tous $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, on a $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$.
- Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et tous $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$ et $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$.
- Si $\alpha < 0$, p_α est strictement décroissante, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$.
- Si $\alpha > 0$, p_α est strictement croissante, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$.
- Si $\alpha = 0$, p_0 est la fonction constante à 1.

Démonstration**i Remarque**

La fonction $x \in \mathbb{R}_+ \mapsto x^{\frac{1}{2}}$ prolongée par 0 en 0 vérifie, pour tout $x \geq 0$, $(x^{\frac{1}{2}})^2 = x$. C'est donc la bijection réciproque de la fonction carrée restreinte à $\mathbb{R}_+$: c'est la fonction racine carrée.

Fonctions puissance $\alpha \geq 1 :$

Valeur de x	0	1	$+\infty$
Signe de $\alpha x^{\alpha-1}$			
Variations de x^α			

 $0 \leq \alpha < 1 :$

Valeur de x	0	1	$+\infty$
Signe de $\alpha x^{\alpha-1}$			
Variations de x^α			

 $\alpha < 0 :$

Valeur de x	0	1	$+\infty$
Signe de $\alpha x^{\alpha-1}$			
Variations de x^α			

I.3. Croissances comparées**Lemme 7.11 (Lemme fondamental)**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

Démonstration**Proposition 7.12 (Croissances comparées)**

- Pour tous réels strictement positifs α et β , on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0$$

- Pour tout réel a strictement supérieur à 1 et tout réel α , on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x |x|^\alpha = 0$$

Démonstration**Méthode : Fonction du type u^v**

Soit $u : D \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ et $v : D \rightarrow \mathbb{R}$. Pour étudier $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto u(x)^{v(x)}$, on écrira,

$$\forall x \in D, f(x) = e^{v(x) \ln(u(x))}$$

Ex. 7.6 (Cor.) **[**]** Montrer que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, $x^y + y^x > 1$.

Ex. 7.7 On rappelle que nous avons démontré, à l'exercice 7.2, que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}.$$

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

I.4. Fonctions circulaires

Voir chapitre 5.

I.5. Fonctions circulaires réciproques

La restriction $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$ de la fonction sinus est strictement croissante, donc injective (d'après la proposition 4.18); de plus, $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$ et $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$ est donc une bijection continue de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$.

De même, $\cos|_{[0, \pi]}$ est une bijection continue strictement décroissante de $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ et $\tan|_{]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[}$ est une bijection continue strictement croissante de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$.


Définition 7.13 (Arcsinus, arccosinus, arctangente)

- Arcsinus, notée Arcsin , est la bijection réciproque de la fonction $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$:

$$\text{Arcsin} : \begin{cases} [-1, 1] & \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x & \longmapsto \sin^{-1}_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}(x) \end{cases}$$

- Arccosinus, notée Arccos , est la bijection réciproque de la fonction $\cos|_{[0, \pi]}$:

$$\text{Arccos} : \begin{cases} [-1, 1] & \longrightarrow [0, \pi] \\ x & \longmapsto \cos^{-1}_{[0, \pi]}(x) \end{cases}$$

- Arctangente, notée Arctan , est la bijection réciproque de la fonction $\tan|_{]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[}$:

$$\text{Arctan} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\\ x & \longmapsto \tan^{-1}_{\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[}(x) \end{cases}$$

Propriété 7.14 (Équations trigonométriques)

- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\sin(\text{Arcsin } x) = x$ et $\cos(\text{Arccos } x) = x$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\text{Arctan } x) = x$.
- Pour tout $y \in [-1, 1]$, l'ensemble des solutions $x \in \mathbb{R}$ de
 $\sin(x) = y$ est $S_1 = \{\text{Arcsin } y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi - \text{Arcsin } y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
 $\cos(x) = y$ est $S_2 = \{\text{Arccos } y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\text{Arccos } y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, l'équation $\tan(x) = y$ a pour ensemble de solutions $\{\text{Arctan } y + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Propriété 7.15

- Arcsin est impaire, strictement croissante et continue sur $[-1, 1]$.
- Arccos est strictement décroissante et continue sur $[-1, 1]$.
- Arctan est impaire, strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$.

De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan}(x) = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$.

Démonstration

I.6. ATTENTION : composition des fonctions trigonométriques et de leurs réciproques


Important ! Bijections réciproques de restrictions

Les fonctions Arcsin , Arccos et Arctan **ne sont pas** les réciproques de $\sin$, $\cos$ ou $\tan$, mais celles de restrictions bien choisies. Ceci engendre quelques difficultés. Par exemple :

- $\text{Arcsin}(\sin x) = x$ si et seulement si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$;

- $\text{Arcsin}\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$

On fera également attention pour $\text{Arccos}(\cos x)$ et $\text{Arctan}(\tan x)$.



Méthode : Simplification des composées de fonctions circulaires et réciproques

- $\forall x \in [-1; 1], \begin{cases} \sin(\text{Arcsin}(x)) = x \\ \cos(\text{Arccos}(x)) = x \end{cases}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\text{Arctan}(x)) = x$
- $\text{Arccos}(\cos(x)) = x \Leftrightarrow x \in [0; \pi]$: autrement dit, $\text{Arccos}(\cos(x)) = x$ si et seulement si x est dans l'intervalle $[0; \pi]$. En dehors de cet intervalle, on utilise les propriétés $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\cos$ périodique de période 2π .
- $\text{Arcsin}(\sin(x)) = x \Leftrightarrow x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$: autrement dit, $\text{Arcsin}(\sin(x)) = x$ si et seulement si x est dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. En dehors de cet intervalle, on utilise les propriétés $\sin(\pi - x) = \sin(x)$ et $\sin$ périodique de période 2π .
- $\text{Arctan}(\tan(x)) = x \Leftrightarrow x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$: autrement dit, $\text{Arctan}(\tan(x)) = x$ si et seulement si x est dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$. En dehors de cet intervalle, on utilise la propriété $\tan$ périodique de période π .
- Enfin, on a démontré les propriétés suivantes :

$$\forall x \in [-1; 1], \begin{cases} \cos(\text{Arcsin}(x)) = \sqrt{1 - x^2} \\ \sin(\text{Arccos}(x)) = \sqrt{1 - x^2} \end{cases}$$

Ex. 7.8 Simplifier $\text{Arccos}(\cos x)$, $\text{Arcsin}(\sin x)$ et $\text{Arctan}(\tan x)$ si $x \in [\pi, 2\pi]$.

Cor. 7.8

Ex. 7.9

- 1) Soit $k \in \mathbb{Z}$, $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $\sin(x + k\pi) = (-1)^k \sin(x)$.
- 2) Soit $k \in \mathbb{Z}$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$.
Simplifier $\text{Arcsin}(\sin(x))$.
- 3) Soit $k \in \mathbb{Z}$, $x \in [k\pi; \pi + k\pi]$.
Simplifier $\text{Arccos}(\cos(x))$.
- 4) Soit $k \in \mathbb{Z}$, $x \in \left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$.
Simplifier $\text{Arctan}(\tan(x))$.

I.7. Dérivées des fonctions circulaires réciproques


Nous allons utiliser le théorème 4.26 pour obtenir une expression de la dérivée des fonctions Arccos , Arcsin et Arctan .

Lemme 7.16


Pour $x \in [-1, 1]$, $\cos(\text{Arcsin}(x)) = \sqrt{1 - x^2}$ et $\sin(\text{Arccos}(x)) = \sqrt{1 - x^2}$.

Démonstration**Propriété 7.17 (Dérivabilité)**

- Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ et pour tout $x \in] -1, 1[$, $\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
- Arccos est dérivable sur $] -1, 1[$ et pour tout $x \in] -1, 1[$, $\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$.
- Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Démonstration**Fonctions trigonométriques réciproques**

Valeur de x	-1	0	+1
Signe de $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$			
Variation de Arccos			
Valeur de x	-1	0	+1
Signe de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$			
Variation de Arcsin			



Valeur de x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $\frac{1}{1+x^2}$			
Variation de Arctan			

Ex. 7.10 Montrer que $2 \text{Arctan } \frac{1}{2} = \text{Arctan } \frac{4}{3}$.

Cor. 7.10

Ex. 7.11 Simplifier les expressions $\sin(2 \text{Arcsin}(x))$, $\cos^2(\frac{1}{2} \text{Arccos } x)$ et $\cos(\text{Arctan } x)$.

Cor. 7.11

Ex. 7.12 Montrer que pour tout $x \in [-1, 1]$, $\operatorname{Arccos} x + \operatorname{Arcsin} x = \frac{\pi}{2}$.

Cor. 7.12

Ex. 7.13 Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. Qu'en est-il si $x \in \mathbb{R}_-^*$?

Cor. 7.13**Remarque**

L'exercice 7.13 précédent montre notamment qu'une fonction peut être dérivable sur $\mathbb{R}^*$, de dérivée nulle sur $\mathbb{R}^*$ *sans pour autant être constante sur $\mathbb{R}^*$* .

En effet, le théorème 4.27 énonçant l'équivalence ($f' = 0 \Leftrightarrow f = cte$) n'est valable !

Ex. 7.14 (Cor.) Simplifier lorsque c'est possible $\operatorname{Arccos}(1 - 2x^2)$.

I.8. Valeurs particulières des fonctions circulaires et de leurs réciproques

Remplir les deux tableaux suivants :

Valeur de x	Valeur de $\cos(x)$
0	
$\frac{\pi}{6}$	
$\frac{\pi}{4}$	
$\frac{\pi}{3}$	
$\frac{\pi}{2}$	
$\frac{2\pi}{3}$	
$\frac{3\pi}{4}$	
$\frac{5\pi}{6}$	
π	
Valeur de	Valeur de u

Valeur de x	Valeur de $\sin(x)$	Valeur de $\tan(x)$
$\frac{-\pi}{2}$		
$\frac{-\pi}{3}$		
$\frac{-\pi}{4}$		
$\frac{-\pi}{6}$		
0		
$\frac{\pi}{6}$		
$\frac{\pi}{4}$		
$\frac{\pi}{3}$		
$\frac{\pi}{2}$		
Valeur de	Valeur de u	////////
Valeur de	////////	Valeur de u

I.9. Fonctions hyperboliques**Définition 7.18 (Fonctions hyperboliques)**

- La fonction cosinus hyperbolique, notée ch , est définie par $\operatorname{ch} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x + e^{-x}}{2}. \end{cases}$

- La fonction sinus hyperbolique, notée sh , est définie par $\text{sh} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \end{cases}$

Propriété 7.19

Pour tout réel x , on a $\text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x$, $\text{ch}(x) - \text{sh}(x) = e^{-x}$ et $\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$.

Démonstration**Remarque**

De la même façon que $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ est une fonction de $\mathbb{R}$ sur le cercle $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$, la troisième formule montre que $t \mapsto (\text{ch } t, \text{sh } t)$ est une fonction de $\mathbb{R}$ sur l'ensemble $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - y^2 = 1\}$.
Cet ensemble est *une hyperbole*, ce qui justifie l'adjectif hyperbolique.

Ex. 7.15 Obtenir pour $x \in \mathbb{R}$ des formules de duplication de $\text{ch}(2x)$ et $\text{sh}(2x)$ similaires à celles des fonctions trigonométriques.

Cor. 7.15

Ex. 7.16 (Cor.) Obtenir pour $a, b \in \mathbb{R}$ des formules d'addition de $\text{ch}(a+b)$ et $\text{sh}(a+b)$ similaires à celles des fonctions trigonométriques.

Propriété 7.20 (Dérivées)

Les fonctions ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}'(x) = \text{sh}(x)$ et $\text{sh}'(x) = \text{ch}(x)$.

Démonstration**Propriété 7.21 (Variations, limites)**

- L'application ch est paire, strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et continue. De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{ch}(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{ch}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{ch}(x)}{x} = +\infty$ (branche parabolique).
- L'application sh est impaire, strictement croissante et continue. De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sh}(x)}{x} = +\infty$ (branche parabolique).

Démonstration

Ex. 7.17 Calculer les dérivées secondes des fonctions $f : x \mapsto \sin x \text{ sh } x$ et $g : x \mapsto \cos x \text{ ch } x$.


Cor. 7.17

Ex. 7.18 Étudier les variations de $h : x \mapsto \operatorname{sh} x + \cos x$.

Cor. 7.18

 Remarque

- On rapporte le plan à un repère orthonormé. Soit $m : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{e^x}{2}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le point $E(x, m(x))$ est le milieu du segment vertical $[S(x, \operatorname{sh} x), \bar{C}(x, \operatorname{ch} x)]$.
- On montre en mécanique que la courbe représentative de ch épouse la forme d'un fil pesant et homogène suspendu par ses deux extrémités. Pour cette raison, on l'appelle la chaînette.

Fonctions hyperboliques

Valeur de x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $\operatorname{sh}(x)$			
Variations de ch			
Variations de sh			
Signe de $\operatorname{ch}(x)$			

II. Extension au cas des fonctions à valeurs complexes

Dans ce qui suit, I est un intervalle réel contenant une infinité de points.

II.1. Parties réelle et imaginaire d'une fonction à valeurs complexes



Définition 7.22 (Parties réelle et imaginaire, module)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de la variable réelle et à valeurs complexes.

Il existe un unique couple de fonctions $f_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $f_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f = f_1 + if_2$.

L'application f_1 s'appelle la **partie réelle** de f et f_2 s'appelle la **partie imaginaire** de f .

L'application $\sqrt{f_1^2 + f_2^2}$ s'appelle **module** de f .

 Notation

| On note $f_1 = \mathcal{R}e(f)$, $f_2 = \mathcal{I}m(f)$ et $|f|$ le module de f .

 Définition 7.23 (Fonctions à valeurs complexes bornées)

| Soit D une partie de $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction.

| On dit que f est bornée si $|f|$ est majorée.

 Remarque

| Cette définition généralise la notion de fonction à valeurs réelles bornée. Cependant, les notions de fonction majorée et de fonction minorée ne s'étendent pas aux fonctions à valeurs complexes.

Ex. 7.19 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie pour tout x réel par $f(x) = \frac{\sin x}{ix + x + 1}$. Calculer l'expression pour $x \in \mathbb{R}$ de $\mathcal{R}e(f)(x)$ et de $\mathcal{I}m(f)(x)$.

Cor. 7.19

II.2. Continuité et dérivabilité d'une fonction à valeurs complexes **Définition 7.24**

| On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est continue si $\mathcal{R}e(f)$ et $\mathcal{I}m(f)$ sont continues. De même, on dit que $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable si $\mathcal{R}e(f)$ et $\mathcal{I}m(f)$ sont dérivables. On pose alors pour tout $x \in I$, $f'(x) = \mathcal{R}e(f)'(x) + i\mathcal{I}m(f)'(x)$.

| Enfin, on dit que $F : I \rightarrow \mathbb{C}$ est une primitive de $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ si $F' = f$. On étend de même la notion d'intégrale, en posant pour $a, b \in I$, $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \mathcal{R}e(f)(t)dt + i \int_a^b \mathcal{I}m(f)(t)dt$.

Les formules portant sur la dérivée (ou la continuité) d'une somme, d'un produit ou d'un quotient sont aussi valables pour les fonctions à valeurs complexes.

II.3. Dérivée de $\exp \circ \phi$ **Proposition 7.25**

Si $\phi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable alors $f : \begin{cases} I & \rightarrow & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & e^{\phi(t)} \end{cases}$ est aussi dérivable et $(e^\phi)' = \phi' e^\phi$.


Démonstration**III. Compléments****III.1. Technique d'élimination des racines carrées**


Méthode : Élimination des racines carrées

Pour les expressions du type $\sqrt{1-x^2}$, $\sqrt{1+x^2}$ et $\sqrt{x^2-1}$, à l'aide d'un changement de variable judicieux, on fait apparaître un carré sous la racine.

- Pour $\sqrt{1-x^2}$, définie si $x \in [-1, 1]$, on pose $x = \sin t$.
Ainsi $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 t} = \sqrt{\cos^2 t} = |\cos t|$. Si l'on impose $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on peut se passer des valeurs absolues. Ici, on peut aussi poser $x = \cos t$.
- Pour $\sqrt{1+x^2}$, définie pour tout x réel, on pose $x = \operatorname{sh} t$.
Alors $\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\operatorname{sh}^2 t} = \sqrt{\operatorname{ch}^2 t} = \operatorname{ch} t$.
- Pour $\sqrt{x^2-1}$, définie pour tout $x \geq 1$, on pose $x = \operatorname{ch} t$.
Par suite $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\operatorname{ch}^2 t - 1} = \sqrt{\operatorname{sh}^2 t} = |\operatorname{sh} t|$. On peut se passer de la valeur absolue en imposant $t \geq 0$. La quantité $\sqrt{x^2-1}$ est aussi définie pour tout $x \leq -1$; dans ce cas, on pose $x = -\operatorname{ch} t$.

III.2. Résumé de l'ordre logique de définition des fonctions usuelles



III.3. Tableau des dérivées/primitives usuelles

Fonction	Dérivée Dérivation →	Intervalle(s) de validité
$\ln x $	$x \mapsto \frac{1}{x}$	$] - \infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
exp	exp	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^\alpha$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$	$]0; +\infty[$ prolongeable en 0 si $\alpha \geq 1$ valable aussi sur $] - \infty; 0[$ si $\alpha \in \mathbb{Z}$
sin	cos	$\mathbb{R}$
cos	$-\sin$	$\mathbb{R}$
tan	$1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$ pour $k \in \mathbb{Z}$
Arcsin	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] - 1; 1[$
Arccos	$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] - 1; 1[$
Arctan	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
ch	sh	$\mathbb{R}$
sh	ch	$\mathbb{R}$
Primitivation ←		
Primitive	Fonction	Intervalle(s) de définition

 Remarque

- Une fonction continue possède une primitive sur ***tout intervalle inclus dans son ensemble de définition*** d'après le théorème 4.33 (théorème fondamental du calcul intégral).
- Pour cette raison, l'***ensemble de dérivabilité d'une fonction de référence*** est l'***intersection de son ensemble de définition avec l'ensemble de définition de sa dérivée***.
- Le théorème de dérivation d'une composée (4.25) s'écrit, dans le cas particulier des fonctions de référence, de la façon suivante :
 $(\exp \circ \phi)' = \phi' \times \exp \circ \phi$
 $(\ln \circ \phi)' = \phi' \times \frac{1}{\phi}$
 etc...
à condition que ϕ prenne ses valeurs dans l'ensemble de dérivabilité de $\exp$, $\ln$, etc...

IV. Correction des exercices

Cor. 7.3 : On le démontre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$:

• **Initialisation** : $\forall a_1 \in \mathbb{R}, \exp(a_1) = \exp(a_1)$.

• **Hérédité** :

Supposons que pour $n \in \mathbb{N}^*$ donné et quels que soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $\exp\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) = \prod_{i=1}^n \exp(a_i)$.

$$\forall a_1, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{R}, \exp\left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i\right) = \exp\left(\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1}\right) = \exp\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \exp(a_{n+1}).$$

On utilise alors la propriété de récurrence :

$$\forall a_1, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{R}, \exp\left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i\right) = \prod_{i=1}^n \exp(a_i) \exp(a_{n+1}) = \prod_{i=1}^{n+1} \exp(a_i).$$

• **Conclusion** : la propriété est initialisée au rang $n = 1$ et héréditaire donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, \exp\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) = \prod_{i=1}^n \exp(a_i)$$

Cor. 7.6 : Pour $x \geq 1$, comme $y > 0$, $x^y \geq 1$ et $y^x > 0$, donc $x^y + y^x > 1$. De même, l'inégalité est vérifiée pour $y \geq 1$. On suppose donc $0 < y < 1$ et on pose $f : x \in]0, 1] \mapsto x^y + y^x = x^y + e^{x \ln(y)}$. f est dérivable sur $]0, 1]$ comme somme et composée de fonctions dérivables et $f'(x) = yx^{y-1} + \ln(y)y^x = y(x^{y-1} + \ln(y)y^{x-1})$ qui est du signe de $x^{y-1} + \ln(y)y^{x-1}$.

En posant $g : x \in]0, 1] \mapsto \frac{x^{y-1}}{y^{x-1}} + \ln(y)$, étudier le signe de f' revient à étudier celui de g . C'est une fonction dérivable, de dérivée

$$g'(x) = \frac{(y-1)x^{y-2}y^{x-1} - \ln(y)x^{y-1}y^{x-1}}{y^{2x-2}} = (y-1-x\ln(y))\frac{x^{y-2}}{y^{x-1}}$$

qui est du signe de $y-1-x\ln(y)$.

Or $y-1-x\ln(y) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y-1}{\ln(y)} \geq x$ car $\ln(y) < 0$. De plus, pour tout $y \in]0, 1[, \ln(y) < y-1$ donc $0 < \frac{y-1}{\ln(y)} < 1$. Donc g est strictement décroissante sur $]0, \frac{y-1}{\ln(y)}]$ de limite $+\infty$ en 0^+ et strictement croissante sur $[\frac{y-1}{\ln(y)}, 1]$ avec $g(1) = 1 + \ln(y)$.

Valeurs de x	0	$\frac{y-1}{\ln(y)}$	1
Variations de $g(x)$	$+\infty$	$\searrow g\left(\frac{y-1}{\ln(y)}\right)$	$\nearrow 1 + \ln(y)$

Or, $g(y) = 1 + \ln(y) = g(1)$, **donc, pour tout** $y \in]0, 1[$, **on a** $y < \frac{y-1}{\ln(y)} < 1$ **et** g **est strictement décroissante sur** $]0, y]$. **On en déduit, en notant** $\alpha \in]0, y]$ **l'unique solution de** $f'(\alpha) = 0$ **si elle existe, que le tableau de variations de** f **sur** $]0, y]$ **est de la forme :**

Si $y \geq \frac{1}{e}$				Si $y < \frac{1}{e}$			
Valeurs de x		0	y	Valeurs de x		0	α y
Signe $f'(x)$			+	Signe $f'(x)$		+	0 -
Variations de $f(x)$		1	$\nearrow 2y^y$	Variations de $f(x)$		1	$\nearrow \searrow 2y^y$

Ces tableaux de variations permettent de conclure dans tous les cas puisque :

- si $y \in]0, 1[$ et $x \in]0, y]$, $y \in]0, 1[\mapsto 2y^y$ passe par un minimum $2e^{-\frac{1}{e}} > 1$ en $y = \frac{1}{e}$ donc $f(x)$ est minorée par sa limite 1 lorsque $x \rightarrow 0$;
- si $y \in]0, 1[$ et $x \in [y, 1[$, on arrive à la même conclusion en échangeant x et y .

Cor. 7.14 : $\operatorname{Arccos}(1 - 2x^2)$ a un sens si $-1 \leq 1 - 2x^2 \leq 1$, c'est-à-dire si $-1 \leq x \leq 1$. On peut se limiter à $0 \leq x \leq 1$ grâce à la parité.

Voici deux méthodes.

- (Changement de variable) On pose $x = \sin t$ avec $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$. On a $1 - 2x^2 = 1 - 2\sin^2(t) = \cos(2t)$ et, comme $0 \leq 2t \leq \pi$, on en déduit $\operatorname{Arccos}(\cos(2t)) = 2t$.

Ainsi, pour $0 \leq x \leq 1$, on a $\operatorname{Arccos}(1 - 2x^2) = 2 \operatorname{Arcsin} x$.

On conclut grâce à la parité que, pour tout $x \in [-1, 1]$, $\operatorname{Arccos}(1 - 2x^2) = 2|\operatorname{Arcsin} x|$.

- (En dérivant) La fonction $f : x \mapsto \operatorname{Arccos}(1 - 2x^2)$ est dérivable sur $]0, 1[$ et pour $x \in]0, 1[$,

$$f'(x) = \frac{4x}{\sqrt{1 - (1 - 2x^2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Il existe donc $k \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in]0, 1[$, $f(x) = 2 \operatorname{Arcsin}(x) + k$.

Les deux membres de cette identité étant continus sur $[0; 1]$, on obtient $k = 0$ en calculant leur valeur par exemple pour $x = 0$ ou $x = 1$ ou $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \dots$

Ainsi pour tout $-1 \leq x \leq 1$, $\operatorname{Arccos}(1 - 2x^2) = 2|\operatorname{Arcsin} x|$.

Cor. 7.16 :

- 1) $\operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b = \frac{e^a + e^{-a}}{2} \frac{e^b + e^{-b}}{2} + \frac{e^a - e^{-a}}{2} \frac{e^b - e^{-b}}{2} = \frac{e^a e^b + e^{-a} e^{-b}}{2} = \operatorname{ch}(a + b).$
- 2) $\operatorname{sh} a \operatorname{ch} b + \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b = \frac{e^a - e^{-a}}{2} \frac{e^b + e^{-b}}{2} + \frac{e^a + e^{-a}}{2} \frac{e^b - e^{-b}}{2} = \frac{e^a e^b - e^{-a} e^{-b}}{2} = \operatorname{sh}(a + b).$