

Correction de l'exercice 1. a) On pose $u_n = \sin(1/n) - \ln(1 + 1/n)$. Alors,

$$u_n = 1/n + \mathcal{O}(1/n^2) - (1/n + \mathcal{O}(1/n^2)) = \mathcal{O}(1/n^2)$$

Comme $\sum 1/n^2$ converge (série de Riemann de paramètre $2 > 1$). Par comparaison à une SATP, $\sum u_n$ converge.

b) $b_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n - 1} = n\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} - n\sqrt{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}$. On pose alors $u = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, alors $u^2 = \frac{1}{n^2} + \mathcal{O}(\frac{1}{n^3})$ et $\mathcal{O}(u^3) = \mathcal{O}(\frac{1}{n^3})$

c) Par croissance comparée $n^2 e^{-n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc $e^{-n^2} = \mathcal{O}(1/n^2)$, par comparaison à une série à termes positifs et convergente $\sum e^{-n^2}$ converge.

d) $\frac{1}{n^{1+1/n}} = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n^{1/n}}$. Or $n^{1/n} = \exp(\frac{\ln(n)}{n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$. Ainsi, $\frac{1}{n^{1+1/n}} \sim \frac{1}{n}$. Or $\sum 1/n$ diverge, donc par comparaison de deux SATP $\sum \frac{1}{n^{1+1/n}}$ diverge.

e) Faire un DL

f) Faire un DL

g) La fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est décroissante, continue et positive sur $[2; +\infty[$. De plus,

$$\int_2^n \frac{1}{x \ln(x)} dx = [\ln(\ln(x))]_2^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

Par comparaison série-intégrale $\sum \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge.

h) Pour $n \geq 3$, $\frac{\ln^{2024}(n)}{n} \geq \frac{1}{n}$. Or, $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Par comparaison entre deux SATP, $\sum \frac{\ln^{2024}(n)}{n}$ diverge.

i) Par croissance comparée, $\frac{n}{\ln^{2024}(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$, donc $\sum \frac{n}{\ln^{2024}(n)}$ diverge grossièrement.

j) Par croissance comparée, $\frac{\ln^{2024}(n)}{n^{1.5}} = \mathcal{O}(n^{-1.2})$, or $\sum n^{-1.2}$ converge (série de Riemann de paramètre $1.2 > 1$).

Par comparaison à une série à termes positifs et convergente, $\sum \frac{\ln^{2024}(n)}{n^{1.5}}$ converge.

k) Par croissance comparée, $n^{-0.6} = \mathcal{O}(\frac{1}{\ln^{2024}(n)n^{1/2}})$, or $\sum n^{-0.6}$ diverge (série de Riemann de paramètre $0.6 \leq 1$). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum \frac{1}{\ln^{2024}(n)n^{1/2}}$ diverge.

l) Faisons un DL, or le seul DL de arctan que l'on connaisse est en 0. Dans ce cas, appliquons la formule¹ $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \pi/2$ pour tout $x > 0$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \arctan(n + 2024) - \arctan(n) &= \left(\pi/2 - \arctan\left(\frac{1}{(n + 2024)}\right) \right) - \left(\pi/2 - \arctan\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \arctan\left(\frac{1}{n}\right) - \arctan\left(\frac{1}{n + 2024}\right) \\ &= \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right) - \frac{1}{n + 2024} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{(n + 2024)^3}\right) \\ &= \frac{2024}{n(n + 2024)} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

1. Rappelons que cette formule se démontre en dérivant $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan(1/x)$ sur \mathbb{R}^* , on obtient une dérivée nulle, donc f est constante sur \mathbb{R}_+^* et \mathbb{R}_-^* . Enfin on trouve les deux valeurs constantes en calculant $f(1)$ et $f(-1)$.

Justifions la manipulation des \mathcal{O} effectuée : $n + 2024 \sim n$, donc $(n + 2024)^3 \sim n^3$, ainsi $\mathcal{O}\left(\frac{1}{(n + 2024)^3}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$. Par comparaison à une série à termes positifs et convergente, $\sum \arctan(n + 2024) - \arctan(n)$ converge.

- m) Posons $u_n = \frac{\cos(n^4)}{n^3}$, or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_n| \leq \frac{1}{n^3}$. Comme $\sum 1/n^3$ converge, par comparaison de deux SATP, $\sum |u_n|$ converge, ainsi $\sum u_n$ converge absolument donc converge.
- n) Par croissance comparée $n^2 \times n^{2024} e^{-\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc $n^{2024} e^{-\sqrt{n}} = o(1/n^2)$. Comme $\sum 1/n^2$ converge, par comparaison à une série à terme positifs, $\sum n^{2024} e^{-\sqrt{n}}$ converge.
- o) Faire un DL
- p) Posons $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$, alors :

$$\begin{aligned} u_n &= \exp(n \ln(1 + 1/n)) - e = \exp\left(n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) - e = \exp\left(1 - \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - e \\ &= e \left(\exp\left(\frac{-1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - 1\right) \end{aligned}$$

On pose alors $u = -\frac{1}{2n} + \mathcal{O}(1/n^2)$, alors $\mathcal{O}(u^2) = \mathcal{O}(1/n^2)$, ainsi on applique le $DL_1(0)$ de $\exp(u) = 1 + u + \mathcal{O}(u^2)$. Ainsi, $u_n = e \left(1 - 1/2n + \mathcal{O}(1/n^2)\right) - e \sim -\frac{e}{2n}$. Comme $\sum \frac{1}{n}$ diverge, $\sum \frac{-e}{2n}$ diverge aussi, par comparaison de deux séries à termes négatifs², $\sum u_n$ diverge.

Correction de l'exercice 2.

Correction de l'exercice 3.

- Correction de l'exercice 4.** 1. Supposons que $\sum u_n$ converge avec $(u_n)_n$ une suite positive. Comme $\sum u_n$ converge, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Ainsi, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $0 \leq u_n \leq 1$. En multipliant par u_n , on obtient $0 \leq u_n^2 \leq u_n$, or $\sum u_n$ converge, par comparaison de deux SATP, $\sum u_n^2$ converge.
2. Si $u_n = 1/n$, alors $\sum_{n \geq 1} u_n^2$ converge mais $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.
3. Si $\sum u_n$ converge absolument, alors $\sum |u_n|$ converge. Comme $\sum |u_n|$ est une SATP, on peut lui appliquer la question 1, $\sum |u_n|^2$ converge. Or, pour tout entier n , $u_n^2 = |u_n|^2$. Ainsi, $\sum u_n^2$ converge.

Correction de l'exercice 5.

Correction de l'exercice 6.

Correction de l'exercice 7. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, alors $(a - b)^2 \geq 0$, donc en développant, $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_n v_n} = \sqrt{u_n} \sqrt{v_n} \leq \frac{u_n + v_n}{2}$. Or $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, comme l'ensemble des séries convergente est un espace vectoriel, $\sum \frac{u_n + v_n}{2}$ converge. Par comparaison de deux séries à termes positifs, $\sum \sqrt{u_n v_n}$ converge.

- Correction de l'exercice 8.** 1. Supposons que pour $n \geq n_0$, on ait $v_{n+1} \leq r v_n$. Posons l'hypothèse de récurrence suivante, pour $n \geq n_0$: $\mathcal{P}(n)$: « $v_n \leq v_{n_0} r^{n-n_0}$ »
- **Initialisation** : pour $n = n_0$, on a bien $v_{n_0} \leq v_{n_0} = v_{n_0}^{n_0-n_0}$, $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
 - **Hérédité** : soit $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ vraie, alors $v_{n+1} \leq r v_n \leq r(v_{n_0} r^{n-n_0}) = v_{n_0} r^{n+1-n_0}$. $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

2. En effet si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont deux séries à termes négatif avec $u_n \sim v_n$, alors $-u_n \sim -v_n$ et on en déduit que $\sum -u_n$ et $\sum -v_n$ ont même nature donc que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

• **Conclusion** : pour tout $n \geq n_0$, $v_n \leq u_{n_0} r^{n-n_0}$.

De même, supposons³ que pour $n \geq n_0$, on ait $v_{n+1} \geq r v_n$. En divisant par r^{n+1} , pour tout entier $n \geq n_0$, $\frac{v_{n+1}}{r^{n+1}} \geq \frac{v_n}{r^n}$, ainsi la suite $(v_n/r^n)_{n \geq n_0}$ est croissante. Dès lors, pour tout entier $n \geq n_0$, $v_n/r^n \geq v_{n_0}/r^{n_0}$. En multipliant par r^n le résultat en découle.

2. Supposons que $\ell < 1$, cherchons $\varepsilon > 0$ tel que $\ell + \varepsilon < 1$, il faut alors que $\varepsilon < 1 - \ell$. Posons donc $\varepsilon = \frac{1 - \ell}{2}$, comme $\ell < 1$, on a $\varepsilon > 0$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1}/u_n| = \ell$, on peut donc dire qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq n_0 \quad \implies \quad \ell - \varepsilon \leq \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \leq \ell + \varepsilon$$

posons

$$r = \ell + \varepsilon = \ell + \frac{1 - \ell}{2} = \frac{1 + \ell}{2} < \frac{1 + 1}{2} = 1$$

Ainsi $r < 1$. Comme, pour tout entier $n \geq n_0$, $|u_{n+1}|/|u_n| \leq r$, d'après la question 1, pour tout entier $n \geq n_0$, $|u_n| \leq |u_{n_0}| r^{-n_0} r^n$, or $\sum r^n$ est une série géométrique convergente car $|r| < 1$. Donc $\sum |u_{n_0}| r^{-n_0} r^n$ converge, par comparaison de séries à termes positifs, $\sum |u_n|$ converge. Ainsi, $\sum u_n$ converge absolument donc converge.

3. Supposons que $\ell > 1$, cherchons $\varepsilon > 0$ tel que $\ell - \varepsilon > 1$, il faut alors que $\varepsilon < \ell - 1$. Posons donc $\varepsilon = \frac{\ell - 1}{2}$, comme $\ell > 1$, on a $\varepsilon > 0$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1}/u_n| = \ell$, on peut donc dire qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq n_0 \quad \implies \quad \ell - \varepsilon \leq \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \leq \ell + \varepsilon$$

Posons

$$r = \ell - \varepsilon = \ell - \frac{\ell - 1}{2} = \frac{\ell + 1}{2} > \frac{1 + 1}{2} = 1$$

Ainsi $r > 1$. Comme, pour tout entier $n \geq n_0$, $|u_{n+1}|/|u_n| \geq r$, d'après question 1, pour tout entier $n \geq n_0$, $|u_n| \geq |u_{n_0}| r^{-n_0} r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$. Ainsi, $\sum u_n$ diverge grossièrement.

4. Prenons $u_n = 1/n$, alors $u_{n+1} \sim u_n$ et donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 = \ell$ et $\sum u_n$ diverge. Prenons $u_n = 1/n^2$, alors $u_{n+1} \sim u_n$ et donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 = \ell$ et $\sum u_n$ converge. Ainsi, si $\ell = 1$, on ne peut rien dire.

Correction de l'exercice 9.

Correction de l'exercice 10. Posons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $S = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$, alors

$$0 \leq n u_{2n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = S_{2n} - S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} S - S = 0$$

Alors par théorème d'encadrement, $n u_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, en multipliant par 2, $2n u_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Considérons $0 \leq (2n+1)u_{2n+1} = u_{2n+1} + 2n u_{2n+1} \leq u_{2n+1} + 2n u_{2n}$. Comme la série converge, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, par extraction $u_{2n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et par ce qui précède $2n u_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, par théorème d'encadrement $(2n+1)u_{2n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Ainsi, la suite des termes pairs de $(n u_n)_n$ tend vers 0 ainsi que la suite des termes impairs de $(n u_n)_n$ tend vers 0. D'après un théorème de cours, $n u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Correction de l'exercice 11.

3. On peut refaire une récurrence, mais proposons une méthode avec plus de panache.

Correction de l'exercice 12. 1. Si $\alpha > 1$, alors considérons $\gamma \in]1; \alpha[$, (par exemple $\gamma = \frac{1+\alpha}{2}$), remarquons, alors que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2 \quad \frac{u_n}{\frac{1}{n^\gamma}} = n^\gamma u_n = \frac{1}{n^{\alpha-\gamma} \ln^\beta(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

En effet, comme $\gamma < \alpha$, $n^{\alpha-\gamma} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ et par croissance comparée, $n^{\alpha-\gamma} \ln^\beta(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$. Ainsi $u_n = o(1/n^\gamma)$. Or $\sum 1/n^\gamma$ est une série de Riemann convergente et à termes positifs, car $\gamma > 1$, par comparaison des séries à termes positifs, $\sum u_n$ converge.

2. Si $\alpha < 1$, alors

$$\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^\alpha \ln^\beta(n)}} = \frac{\ln^\beta(n)}{n^{1-\alpha}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Ainsi, $1/n = o(1/(n^\alpha \ln^\beta(n)))$ Comme $\sum 1/n$ diverge, par la contraposée du théorème de comparaison à une série à terme positifs, $\sum 1/(n^\alpha \ln^\beta(n))$ diverge.

3. Posons la fonction $f: x \mapsto \frac{1}{x \ln^\beta(x)}$ définie sur $[2; +\infty[$. Par dérivation, il existe un entier $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que f est décroissante sur $[n_0; +\infty[$. De plus, f est continue et positive. D'après le théorème de comparaison série-intégrale, $\sum u_n = \sum f(n)$ converge si et seulement si la suite $\left(\int_{n_0}^n f(x) dx \right)_{n \geq n_0}$ converge. Si $\beta \neq 1$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq n_0 \quad \int_{n_0}^n \frac{1}{x \ln(x)^\beta} dx = \left[\frac{\ln(x)^{1-\beta}}{1-\beta} \right]_{n_0}^n = \frac{\ln(n)^{1-\beta}}{1-\beta} - \frac{\ln(n_0)^{1-\beta}}{1-\beta}$$

Comme $\ln(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$, $(\ln(n)^{1-\beta})_n$ converge si et seulement si $1-\beta \leq 0$. Dans le cas $\beta \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$, $\left(\int_2^n f(x) dx \right)_{n \geq 2}$ converge si et seulement si $\beta > 1$. Si $\beta = 1$, alors

$$\int_2^n \frac{1}{x \ln(x)} dx = \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

Ainsi, $\sum u_n$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

En conclusion, $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

Correction de l'exercice 13. Soit $(u_n)_n$ une suite strictement positive, on suppose que $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell$.

1. Si $\ell < 1$, on pose $\varepsilon = (1 - \ell)/2 > 0$, ainsi il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N_0 \quad \implies \quad \sqrt[n]{u_n} \leq \ell + \varepsilon = (1 + \ell)/2 = r$$

Comme $x \mapsto x^n$ est croissante sur \mathbb{R}_+ , on obtient pour tout $n \geq N_0$, $u_n \leq r^n$, comme $r < 1$, on sait que $\sum r^n$ converge (série géométrique de raison r avec $|r| < 1$), par critère de comparaison des séries à termes positifs $\sum u_n$ converge.

2. Si $\ell > 1$, on pose $\varepsilon = (\ell - 1)/2 > 0$, ainsi il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N_0 \quad \implies \quad \sqrt[n]{u_n} \geq \ell - \varepsilon = (1 + \ell)/2 = r$$

Comme $x \mapsto x^n$ est croissante sur \mathbb{R}_+ , on obtient pour tout $n \geq N_0$, $u_n \geq r^n$, comme $r > 1$, $r^n \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$, ainsi $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Correction de l'exercice 14. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n - u_n \leq w_n - u_n$. Comme $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent et que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel, $\sum w_n - u_n$ converge. Par comparaison entre deux SATP, $\sum v_n - u_n$ converge. Comme $\sum u_n$ converge, par somme $\sum (v_n - u_n) + u_n$ converge. Ainsi, $\sum v_n$ converge.

2. Supposons que $\sum u_n$ converge absolument. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-|u_n| \leq u_n \leq |u_n|$. Or $\sum |u_n|$ converge, par stabilité par multiplication par un scalaire, $\sum -|u_n|$ converge. En appliquant la première question, $\sum u_n$ converge.

Correction de l'exercice 15. 1. Comme $\sum 1/n^2$ converge et que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel, $\sum 1/(2n)^2$ converge, de plus, par linéarité de la somme,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4n^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{24}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, en séparant les indices pairs et impairs dans $\sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{k^2}$, il vient :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)^2} = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$$

Ainsi, $\sum \frac{1}{(2n+1)^2}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, en séparant les indices pairs et impairs :

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^n \frac{(-1)^k}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^n \frac{(-1)^k}{k^2} = \sum_{p=1}^{E(n/2)} \frac{1}{(2p)^2} - \sum_{p=0}^{E((n-1)/2)} \frac{1}{(2p+1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{24} - \frac{\pi^2}{8} = -\frac{\pi^2}{12}$$

Ainsi, $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$.

Correction de l'exercice 16. 1. $\sum \frac{1}{n^x}$ est une série de Riemann de paramètre x . Ainsi, $\zeta(x)$ est défini ssi $x > 1$. L'ensemble de définition de ζ est $]1; +\infty[$.

2. Soit $(x, x') \in]1; +\infty[$ tel que $x < x'$, alors, par linéarité de la somme, $\zeta(x) - \zeta(x') = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{n^{x'}} \right)$.

Remarquons que pour $n = 1$, $n^x = n^{x'} = 1$, ainsi,

$$\zeta(x) - \zeta(x') = \frac{1}{2^x} - \frac{1}{2^{x'}} + \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^x} - \frac{1}{n^{x'}}$$

Pour un entier $k \geq 2$, $t \mapsto k^{-t} = \exp(-t \ln(k))$ est strictement décroissante sur \mathbb{R} ⁴. Ainsi $\frac{1}{2^x} - \frac{1}{2^{x'}} > 0$

et pour tout $n \geq 3$, $\frac{1}{n^x} - \frac{1}{n^{x'}} \geq 0$, comme les inégalités larges sont conservées⁵ par passage à la limite,

$\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^x} - \frac{1}{n^{x'}} \geq 0$. Par somme d'inégalités dont une est stricte, $\zeta(x) - \zeta(x') > 0$. En conclusion, ζ est strictement décroissante sur $]1; +\infty[$.

3. Soit $x \in]1; +\infty[$, $t \mapsto \frac{1}{t^x} = t^{-x}$ est décroissante⁶.

4. Car de dérivée $t \mapsto -\ln(k) \exp(-t \ln(k)) < 0$.

5. C'est pour cela que l'on affirme que la somme est positive ou nulle et non strictement positive, même si elle l'est.

6. Car de dérivée $t \mapsto (-x)t^{-x-1} < 0$.

- Soit un entier $k \geq 1$. Pour tout $t \in [k; k+1]$, $t^{-x} \leq k^{-x}$ en intégrant par croissance de l'intégrale,

$$\int_k^{k+1} t^{-x} dt \leq \int_k^{k+1} k^{-x} dt$$

En calculant les intégrales :

$$\frac{1}{1-x} ((k+1)^{-x} - k^{-x}) \leq k^{-x}$$

Sommons ces inégalités pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$:

$$\frac{1}{x-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k^x} - \frac{1}{(k+1)^x} \right) \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^x} \leq \frac{1}{x-1}$$

Comme on reconnaît une somme télescopique

$$\frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^x} \right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^x}$$

Comme le passage à la limite conserve les inégalités larges :

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x)$$

- Soit un entier ⁷ $k \geq 2$. Pour tout $t \in [k-1; k]$, $k^{-x} \leq t^{-x}$ en intégrant par croissance de l'intégrale,

$$\int_{k-1}^k k^{-x} dt \leq \int_{k-1}^k t^{-x} dt$$

En calculant les intégrales :

$$k^{-x} \leq \frac{1}{1-x} (k^{-x} - (k-1)^{-x})$$

Sommons ces inégalités pour $k \in \llbracket 2; n \rrbracket$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^x} \leq \frac{1}{x-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{(k-1)^x} - \frac{1}{k^x} \right)$$

Comme on reconnaît des sommes télescopiques et en rajoutant 1 aux membres de l'inégalité :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^x} \leq 1 + \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{1}{n^x} \right)$$

Comme le passage à la limite, quand $n \rightarrow +\infty$, conserve les inégalités larges :

$$\zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$$

Dès lors, pour tout $x > 1$,

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$$

Comme $1 + \frac{1}{x-1} \underset{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$, par théorème d'encadrement des équivalents, il en découle que

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$$

7. Attention, ici k ne peut pas valoir 1, car sinon on intégrerait t^{-x} sur $[0; 1]$. Or $t \mapsto t^{-x} = \exp(-x \ln(t))$ n'est pas définie en 0 ni prolongeable par continuité car $t^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$. On est donc obligé de partir à $k = 2$ quitte à rajouter à la fin le terme pour $k = 1$.

et donc $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$. Malheureusement, $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $1 + \frac{1}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$, ainsi nos deux gendarmes ne vont pas au même endroit. Cependant, pour tout $x > 1$, $\zeta(x) = 1 + \sum_{n=2}^{+\infty} n^{-x}$, ainsi, $\zeta(x) \geq 1$.
 Donc, $1 \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$, par le théorème d'encadrement, $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Remarque 1. Cette fonction est la célèbre fonction ζ de Riemann. On peut la prolonger d'une certaine manière sur $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. Un des problèmes les plus complexes est de déterminer où cette fonction s'annule.




FIGURE 1 – Graphe de la fonction ζ de Riemann en rouge et vert ses asymptotes.

Correction de l'exercice 17.

Correction de l'exercice 18.

Correction de l'exercice 19.