

**Exercice 1 (★).** Soit  $A, B$  et  $C$  trois événements d'un même espace probabilisé  $(\Omega, P)$ . Simplifier les événements suivants :

1.  $A \cap (A \cap B)$
2.  $A \cup (A \cap B)$
3.  $A \cap (A \cap B \cap C)$
4.  $B \cup (A \cap B \cap C)$
5.  $\bar{A} \cap (A \cap B)$
6.  $\bar{A} \cap (A \cup B)$

**Exercice 2 (★).** Soit  $A, B$  et  $C$  trois événements d'un même espace probabilisé  $(\Omega, P)$ . À l'aide d'opérations sur les ensembles, exprimer les événements suivants en fonction de  $A, B$  et  $C$  :

1.  $A_1 =$  "l'un au moins des trois événements se réalise"
2.  $A_2 =$  " $A$  se réalise, mais pas  $B$  et  $C$ "
3.  $A_3 =$  "un et un seul des trois événements se réalise"
4.  $A_4 =$  "au moins deux des trois événements se réalisent"
5.  $A_5 =$  "exactement deux des trois événements se réalisent"
6.  $A_6 =$  "aucun des trois événements ne se réalise"
7.  $A_7 =$  "deux au plus se réalisent"

**Exercice 3 (★).** Un étudiant connaît une proportion  $p \in ]0, 1[$  du programme. Lors du contrôle, si l'étudiant ne connaît pas la réponse, il répond au hasard parmi 3 choix possibles. La réponse à une question étant bonne, quelle est la probabilité que l'étudiant connaisse effectivement la réponse ?

**Exercice 4 (★).** Trois urnes contiennent des boules noires et blanches.

- L'urne  $U_1$  contient 3 noires et 2 blanches.
- L'urne  $U_2$  contient 4 noires et 6 blanches.
- L'urne  $U_3$  contient 1 noires et 4 blanches.

On choisit au hasard une urne et on y pioche une boule.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit blanche ?
2. Sachant qu'elle est blanche, quelle est la probabilité que l'urne utilisée ait été  $U_1$  ?

**Exercice 5 (★★).** Une urne contient 3 boules rouges et 3 boules blanches. On tire deux boules au hasard, que l'on met dans un sac. Puis on tire au hasard une de ces deux boules.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?
2. Sachant qu'elle l'est, quelle est la probabilité que la boule encore dans le sac le soit aussi ?

**Exercice 6 (★★).** Pour monter un appareil, on utilise des pièces provenant de deux fournisseurs  $A$  et  $B$ . La fiabilité (probabilité de fonctionnement sans défaillance) d'un tel appareil durant une année est de 0.9 s'il est monté uniquement avec des pièces du fournisseur  $A$  ; de 0.7 s'il est monté uniquement avec des pièces du fournisseur  $B$  ; et de 0.8 s'il est monté avec un mélange des pièces des deux fournisseurs  $A$  et  $B$ . De plus, les pièces du fournisseur  $A$  sont utilisées dans 80% des appareils et celles du fournisseur  $B$  dans 50% des appareils. Un appareil est extrait au hasard de la chaîne de montage. Calculer la fiabilité de l'appareil pour une période d'un an.

**Exercice 7 (★).** On lance  $n \in \mathbb{N}^*$  fois une pièce dont la probabilité de donner pile est  $p \in ]0, 1[ \setminus \{\frac{1}{2}\}$ .

1. Soit  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . On pose  $E_k$  l'événement « le premier pile est au  $k$ -ième lancer ». Calculer  $P(E_k)$ .
2. Soit  $E$  l'événement « on tire au moins un pile ». En utilisant la question précédente, calculer  $P(E)$ .

**Exercice 8 (★).** Dans une usine, un service contrôle les colis destinés à la livraison. Pour chaque colis, ce contrôle est effectué indépendamment par deux personnes. Chaque contrôleur détecte un colis non conforme dans 90 pour cent des cas. On sait d'autre part que 5 pour cent des colis en moyenne sont non conformes. On note  $A$  l'événement "le colis n'est pas conforme" et  $C_i$  l'événement "le contrôleur numéro  $i$  détecte la non conformité du colis".

1. Quelle est la probabilité qu'un colis soit non conforme et ne soit pas détecté ?
2. Quelle est la probabilité qu'un colis soit non conforme et soit détecté ?
3. Quelle est la probabilité qu'un colis soit déclaré bon pour la livraison ?

**Exercice 9 (★★).** On dispose de deux dés  $A$  et  $B$ .

- Le dé  $A$  a 4 faces rouges et 2 blanches.
- Le dé  $B$  a 2 faces rouges et 4 blanches.

On commence par choisir aléatoirement un de ces deux dés :  $A$  avec probabilité  $\frac{1}{3}$  et  $B$  avec probabilité  $\frac{2}{3}$ . Une fois le dé choisi, on effectue plusieurs lancers, sans changer de dé.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir une face rouge au premier lancer ?
2. On a obtenu rouge aux 2 premiers lancers. Quelle est la probabilité d'avoir utilisé le dé  $A$  ?
3. On a obtenu rouge aux  $n$  premiers lancers. Quelle est la probabilité d'avoir utilisé le dé  $A$  ? Comment se comporte cette probabilité lorsque  $n \rightarrow +\infty$  ?
4. On a obtenu rouge aux  $n$  premiers lancers. Quelle est la probabilité d'obtenir rouge au  $(n + 1)$ -ème ? Comment se comporte cette probabilité lorsque  $n \rightarrow +\infty$  ?

**Exercice 10 (Type DS).** On considère un mobile qui se déplace sur les sommets d'un triangle  $A_1, A_2$  et  $A_3$ . On suppose qu'initialement le mobile se trouve en  $A_1$ . Ensuite les déplacements s'effectuent de la manière suivante : si le mobile est en  $A_i$ ,

- il passe en  $A_j$  ( $j \neq i$ ) avec la probabilité  $\frac{2}{5}$  dans les deux cas.
- il reste en  $A_i$  avec la probabilité  $\frac{1}{5}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on introduit les événements :  $U_n$  = "après  $n$  déplacements le mobile se trouve en  $A_1$ ";  $V_n$  = "après  $n$  déplacements le mobile se trouve en  $A_2$ ";  $W_n$  = "après  $n$  déplacements le mobile se trouve en  $A_3$ ". On pose  $u_n = P(U_n)$ ,  $v_n = P(V_n)$  et  $w_n = P(W_n)$ .

1. Déterminer  $u_0, v_0$  et  $w_0$ .
2. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ .
3. En déduire que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} = \frac{1}{5^n} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}$ .
4. Soit  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $J^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
5. En déduire pour tout entier naturel  $n$  l'expression de  $u_n, v_n$  et  $w_n$  en fonction de  $n$ .
6. Quelles sont les limites des suites  $(u_n), (v_n)$  et  $(w_n)$  ?