

Exercice 1 (★). Déterminer le comportement asymptotique (convergence/divergence, limite éventuelle) des suites définies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par :

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $a_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}}$ | 2. $b_n = ((-1)^n + n^3) e^{-n}$ | 3. $c_n = ((-1)^n + e^{-n}) n^3$ |
| 4. $d_n = (\cos(n) + 3) \ln(n)$ | 5. $e_n = \frac{3n+1}{2n^2-1}$ | 6. $f_n = \frac{2n^2+3n+1}{5n^2+4n-2}$ |
| 7. $g_n = \frac{(\ln(n))^2 - 2}{\ln(n) + n}$ | 8. $h_n = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}n) - 3n}{n+3}$ | 9. $i_n = \frac{(-1)^n + 2n}{n^2}$ |
| 10. $j_n = n^2 \left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\right)$ | 11. $k_n = n^2 \left(\frac{11}{10} + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\right)$ | 12. $\ell_n = n \left(2 + \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)\right) - \sqrt{n}$ |

Exercice 2 (★). Démontrer que la suite u définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \left((-1)^n - \frac{3}{n}\right) \cos\left(\frac{2\pi n}{7}\right)$ est bornée.

Exercice 3 (★★). Démontrer que la suite v définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{\ln(n+1)}{n+1} \times \frac{n^2+1}{n^2+2} + 3e^{-n} - 10 \sin(n)$ est bornée.

Exercice 4 (★). Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant $v_0 \in [0, 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n(1 - v_n)$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \in [0, 1]$.
2. Étudier la monotonie de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Étudier la convergence de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 5 (★). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^3 + k^3}$. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, et donner sa limite.

Exercice 6 (★). Démontrer que la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{\cos(\frac{\pi k^2}{7}) + 2}{2^k}$ est convergente.

Exercice 7 (★★). Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie pour tout n entier non nul par : $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.
2. Montrer que pour tout n non nul, $u_{2n} - \frac{1}{2}u_n \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$.
3. En déduire la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Exercice 8 (★★). Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que les trois suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{5n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent. Montrer que la suite u converge.

Exercice 9 (★★). Montrer que la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$ converge.

Indication : on pourra commencer par étudier les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .

Exercice 10 (★★★). On définit les deux suites réelles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $b_0 > a_0 > 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Montrer que ces deux suites sont bien définies et qu'elles convergent vers un même réel ℓ .

Exercice 11 (★). Soit u la suite réelle définie par $u_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 12 (★). Soit w la suite définie par $w_0 = \frac{1}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = -3w_n + 1$.

1. Déterminer le terme général de w .
2. Déterminer le comportement de w_n (convergence, divergence, limite) lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 13 (★★). Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et u la suite réelle définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \lambda u_n + 3$. Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 14 (★★). Dans chacune des situations suivantes, déterminer la limite de la suite réelle étudiée.

1. u est une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n + \frac{1}{3}$.
2. v est une suite positive telle que $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} \leq \frac{3}{4}v_n$.
3. w est une suite telle que $\forall n \geq 3, |w_{n+1} - \sqrt{5}| \leq (e-2)|w_n - \sqrt{5}|$.

Exercice 15 (★). Pour chacune des suites réelles suivantes, exprimer le terme général de la suite en fonction de n :

1. La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} = 3w_{n+1} - 2w_n, w_0 = 0$ et $w_1 = 1$.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n, u_0 = 1$ et $u_1 = 1$.
3. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = -v_{n+1} - v_n, v_0 = 1$ et $v_1 = -1$.

Exercice 16 (★★). Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}u_n}, u_0 = 1, u_1 = 2$.

1. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout entier n par $v_n = \ln(u_n)$ existe.
2. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est récurrente linéaire double.
3. En déduire l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .

Exercice 17 (★). Soit la suite u définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{6u_n+5}{u_n+2}$.

1. Étudier et tracer la courbe représentative de la fonction f définie sur \mathbb{R}_+ par $f(x) = \frac{6x+5}{x+2}$. En déduire que la suite est bien définie, et tracer la représentation des réels u_0, u_1 et u_2 .
2. Étudier la monotonie et les bornes éventuelles de la suite u .
3. Montrer que la suite u converge et déterminer sa limite.

Exercice 18 (★★). Soit u vérifiant $u_0 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$. Déterminer le comportement de u_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 19 (★★★). Déterminer le comportement en $+\infty$ de la suite u définie par le premier terme $u_0 \geq 0$ et la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1+u_n}$.

Exercice 20 (Type DS). On définit la suite de terme général a_n par : $\forall n \geq 1, a_n = \frac{\sqrt{n} \binom{2n}{n}}{4^n}$.

1. Calculer a_1 puis, pour tout entier $n \geq 1$, montrer que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{2\sqrt{n(n+1)}}$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1 : a_n \leq \sqrt{\frac{n}{2n+1}}$.

Indication : on pourra commencer par simplifier $\frac{n+1}{2n+3} - \frac{2n+1}{4n+4}$ pour en étudier le signe.

3. Déterminer le sens de variation de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, puis montrer qu'elle converge vers un réel ℓ tel que : $\frac{1}{2} \leq \ell \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.