

Devoir N°1

A lire attentivement avant de commencer :

Le programme de mathématiques de la classe de PSI s'inscrit logiquement dans la continuité de celui de la PCSI (= MPSI moins quelques chapitres). Cela signifie que toute lacune sur le programme de première année aura des répercussions sur les apprentissages de l'année de Spé. Or, la deuxième année est très dense et les écrits des concours arrivent rapidement (environ 26 semaines de préparation seulement). Il est donc indispensable de commencer l'année dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en ayant avant la rentrée fait le travail nécessaire pour s'approprier le cours de première année.

Connaitre son cours signifie être capable d'énoncer sans la moindre approximation toutes les définitions (c'est absolument essentiel), toutes les propriétés, et de connaître les méthodes de calcul et les méthodes de raisonnement. L'expression écrite et orale doit être claire et précise.

Ce premier devoir comporte trois problèmes permettant (et nécessitant) de réviser plus particulièrement certaines parties du programme de première année : les fondamentaux d'algèbre linéaire, le calcul matriciel, le calcul de dérivées et de primitives, la résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 1 et quelques notions de probabilités.

Les trois problèmes seront rédigés sur trois copies différentes ren-
dues séparément.

N'oubliez pas d'inscrire votre nom sur chacune des copies. Soignez la lisibilité et la présentation (pages numérotées, numéros des questions bien mis en évidence, résultats encadrés, une encre noire ou bleu foncé, pas d'effaceur...).

Pour toute question concernant ce devoir ou certains points du cours de première année, vous pouvez me contacter par mail : marie-laure.ravard@wanadoo.fr

Passez de bonnes vacances mais n'oubliez surtout pas de préparer votre rentrée !

Devoir N°1

A lire attentivement avant de commencer :

Le programme de mathématiques de la classe de PSI s'inscrit logiquement dans la continuité de celui de la PCSI (= MPSI moins quelques chapitres). Cela signifie que toute lacune sur le programme de première année aura des répercussions sur les apprentissages de l'année de Spé. Or, la deuxième année est très dense et les écrits des concours arrivent rapidement (environ 26 semaines de préparation seulement). Il est donc indispensable de commencer l'année dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en ayant avant la rentrée fait le travail nécessaire pour s'approprier le cours de première année.

Connaître son cours signifie être capable d'énoncer sans la moindre approximation toutes les définitions (c'est absolument essentiel), toutes les propriétés, et de connaître les méthodes de calcul et les méthodes de raisonnement. L'expression écrite et orale doit être claire et précise.

Ce premier devoir comporte trois problèmes permettant (et nécessitant) de réviser plus particulièrement certaines parties du programme de première année : les fondamentaux d'algèbre linéaire, le calcul matriciel, le calcul de dérivées et de primitives, la résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 1 et quelques notions de probabilités.

Les trois problèmes seront rédigés sur trois copies différentes ren-

dues séparément.

N'oubliez pas d'inscrire votre nom sur chacune des copies. Soignez la lisibilité et la présentation (pages numérotées, numéros des questions bien mis en évidence, résultats encadrés, une encre noire ou bleu foncé, pas d'effaceur...).

Pour toute question concernant ce devoir ou certains points du cours de première année, vous pouvez me contacter par mail : marie-laure.ravard@wanadoo.fr

Passez de bonnes vacances mais n'oubliez surtout pas de préparer votre rentrée !

Problème 1 : Algèbre linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension n ($n \in \mathbb{N}^*$).
Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On s'intéresse à la relation $(*) : f \circ f = f + 2\text{id}_E$.

1. Dans cette question, on étudie le cas particulier de l'application φ de \mathbb{R}^4 dans \mathbb{R}^4 définie par

$$\varphi : (x, y, z, t) \mapsto (2x - z + t, -2x + z - t, -y + t, -2x - y + z)$$

(a) Vérifier rapidement que φ est un endomorphisme de \mathbb{R}^4 .

(b) Écrire la matrice A représentative de φ dans la base canonique de \mathbb{R}^4 .

(c) Calculer le rang de A . Sans calcul, en déduire le déterminant de A .

(d) Déterminer une base de $\ker \varphi$ et une base de $\text{Im } \varphi$.

(e) Calculer A^2 . Qu'en déduit-on pour φ ?

(f) On pose $f = 3\varphi - \text{id}_E$. Montrer que f vérifie $(*)$.

2. On revient maintenant au cas général et on considère un endomorphisme f de E vérifiant

$$(*) : g = f - 2\text{id}_E \text{ et } h = f + \text{id}_E.$$

(a) i. Montrer que $g \circ h = h \circ g = 0$.

ii. En déduire que $\text{Im } h \subset \ker g$ et $\text{Im } g \subset \ker h$.

(b) i. Montrer que $\dim(\ker g) + \dim(\ker h) \geq n$.

ii. Montrer que $\ker g$ et $\ker h$ sont en somme directe.

iii. Montrer que $\ker g$ et $\ker h$ sont supplémentaires dans E .

(c) Soit p la projection sur $\ker g$ parallèlement à $\ker h$ et q la projection sur $\ker h$ parallèlement à $\ker g$.

i. Montrer que $h = 3p$ et $g = -3q$.

ii. Montrer que $p \circ q = q \circ p = 0$.

iii. Montrer que $\forall m \in \mathbb{N}^*, f^m = 2^m p + (-1)^m q$.

On rappelle que f^m désigne le m -ième itéré de f pour la composition des applications : $f^m = f \circ \dots \circ f$.

10. On suppose que l'on connaît une solution φ_0 de (E) . Montrer que : $S = \{\varphi_0 + g \mid g \in S_0\}$.

On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Partie III : Résolution de l'équation complète

9. Déterminer S_0 .

8. Résoudre (E') sur $]0, +\infty[$.

$$(E') \quad z' + \frac{x(x^2 + 1)}{2} z = 0$$

(b) Montrer que φ est solution de (E_0) si et seulement si ψ' est solution de l'équation

dérivées de φ en fonction de celles de ψ .

(a) Justifier que ψ est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$ et exprimer les deux premières

$$\text{On pose : } \forall x \in]0, +\infty[, \psi(x) = \frac{\varphi(x)}{x}.$$

7. Soit $\varphi :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable.

6. Déterminer $\alpha > 0$ tel que la fonction $x \mapsto x^\alpha$ appartienne à S_0 .

5. Démontrer que S_0 est un sous-espace vectoriel de $C^2([0, +\infty[, \mathbb{R})$.

On note S_0 l'ensemble de ses solutions.

$$(E_0) \quad (1 + x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$$

On s'intéresse ici à l'équation différentielle linéaire homogène (E_0) associée à (E) sur $]0, +\infty[$:

Partie II : Résolution de l'équation sans second membre

4. Déterminer une primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction $x \mapsto (1 - x^2) \ln x$.

3. Déterminer une primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction $x \mapsto x \ln x$.

2. En déduire les primitives sur $]0, +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{x(x^2 + 1)}{1}$.

$$\forall x \in]0, +\infty[, \frac{1}{a} + \frac{x}{bx + c} = \frac{x(x^2 + 1)}{1}$$

1. Montrer l'existence de trois réels a, b, c à déterminer tels que :

Partie I : Résultats préliminaires utiles

$$(E) \quad (1 + x^2)y'' - 2xy' + 2y = (1 + x^2)^2 \ln x$$

Dans ce problème, on s'intéresse à l'équation différentielle sur $]0, +\infty[$:

Problème 2 : Calcul de primitives et équation différentielle

11. On cherche une solution particulière φ_0 de (E) sous la forme
- $$\varphi_0 : x \mapsto x\lambda(x) + (x^2 - 1)\mu(x)$$
- où λ et μ sont deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$ vérifiant de plus :
- $$\forall x \in]0, +\infty[, x\lambda'(x) + (x^2 - 1)\mu'(x) = 0. \quad (E_1)$$
- (a) Justifier que φ_0 est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$ et exprimer sa dérivée seconde à l'aide des fonctions λ et μ .
- (b) Montrer que φ_0 est solution de (E) sur $]0, +\infty[$ si et seulement si :
- $$\forall x \in]0, +\infty[, \lambda'(x) + 2x\mu'(x) = (1 + x^2) \ln x. \quad (E_2)$$
- (c) En déduire les expressions des fonctions λ et μ .
12. Déterminer l'ensemble S des solutions de (E) sur \mathbb{R} .

Problème 3 : Calcul matriciel et probabilités

Le problème étudie le déplacement d'un pion sur un damier.

Partie I : Matrices

On pose : $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et $M = \frac{1}{4}J + \frac{6}{1}K$.

1. Calculer JK et KJ . En déduire que pour tout entier $n \geq 2$ et $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $J^k K^{n-k}$ est la matrice nulle.

2. Montrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $J^n = 4^{n-1}J$ et $K^n = 2^{n-1}K$.


3. À l'aide des deux questions précédentes, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left(\frac{4}{1}J + \frac{6}{1}K \right)^n = \frac{4}{1}J + \frac{2}{1}3^n K.$$

Indication : on pourra appliquer la formule du binôme de Newton (d'autres méthodes sont possibles).

Partie II : Modélisation du déplacement d'un pion sur un damier à 9 cases

On considère un damier à 9 cases blanches et noires (en grisé sur le dessin) numérotées de la façon suivante :



Un pion se déplace avec équiprobabilité sur ce damier de la case où il se trouve vers une des cases qui possède avec cette case un-côté commun. Ainsi, si le pion est en N₂, il peut se déplacer vers B₁, B₃ ou B₅, avec des probabilités égales. On suppose qu'au départ le pion est en B₁.

1. Sur quelles cases peut se trouver le pion après un nombre pair de déplacements ?

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ les événements :

- B_{k,n} « le pion est sur la case B_k après 2n déplacements » ;
- N_{k,n} « le pion est sur la case N_k après 2n - 1 déplacements » ;

et B_{k,0} « le pion est sur la case B_k au départ ».

On pose pour tout entier $n \in \mathbb{N} : V_n = \begin{pmatrix} p_{1,n} \\ p_{2,n} \\ p_{3,n} \\ p_{4,n} \\ p_{5,n} \end{pmatrix}$ où $p_{k,n} = P(B_{k,n})$ et, si $n \geq 1$, $W_n = \begin{pmatrix} q_{1,n} \\ q_{2,n} \\ q_{3,n} \\ q_{4,n} \end{pmatrix}$

où $q_{k,n} = P(N_{k,n})$.

2. Quelle est la valeur de V₀ ? de W₁ ?

12. Que représente la variable aléatoire $Y = X_1 + \dots + X_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$? Quelle est la loi de Y ? Calculer son espérance.
- Quelle loi suit cette variable aléatoire? On donnera son espérance.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si le pion est en case } B_1 \text{ après } 2i \text{ déplacements} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

11. On considère la variable aléatoire définie, pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, par
10. En déduire que $p_{1,n} = 1/3$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Interpréter ce résultat.
9. En réutilisant l'expression des puissances successives de M en I.3, déterminer avec la question précédente la première ligne de la matrice $(BA)^n$ lorsque $n \in \mathbb{N}$.
8. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N} : V_n = (BA)^n V_0 = B A^n V_0$ et que, si $n \geq 1$

Partie III : Calcul des probabilités.

- partie I.
7. Conclure que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $V_n = (BA)^n V_{n-1}$ et que $AB = M$, la matrice définie en
6. Montrer de façon analogue au cas précédent qu'il existe une matrice $A \in M_{4,5}(\mathbb{R})$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^* : W_n = A V_{n-1}$. On donnera l'expression de A .

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Montrer ainsi que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $V_n = B W_n$ où
- $$P(B_{k,n}) = P(B_{k,n}|N_{1,n})P(N_{1,n}) + P(B_{k,n}|N_{2,n})P(N_{2,n}) + P(B_{k,n}|N_{3,n})P(N_{3,n}) + P(B_{k,n}|N_{4,n})P(N_{4,n})$$
4. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$:
3. Justifier que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $B_{1,n}, B_{2,n}, B_{3,n}, B_{4,n}, B_{5,n}$ et $N_{1,n}, N_{2,n}, N_{3,n}, N_{4,n}$ sont deux systèmes complets d'événements.