CORRIGE du TD 17

Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels. Familles libres -génératrices -bases .

I Espaces vectoriels , famille génératrice

Exercice 0 « COURS »

1) Expliquer pourquoi un K -e.v contenant au moins un vecteur non nul contient une infinité de vecteurs.

Un tel espace vectoriel contient tous les vecteurs colinéaires à ce vecteur non nul ; cela constitue une infinité de vecteurs élément de cet e. v.

2) Quel est le seul $K - e - v$ contenant un nombre fini de vecteurs ?

$\{0\}$ est le seul e.v contenant un nombre fini de vecteurs. Cet e. v ne contient qu'un seul vecteur

3) Que démontre-t-on par double inclusion ? Et en pratique que fait-on ?

La double inclusion permet de prouver l'égalité entre deux ensembles F et G . En pratique, on considère un élément quelconque de F et on prouve que cet élément est dans G et inversement on considère un élément quelconque de G et on prouve que cet élément est dans F .

4) Soit F et G deux ss-e-v de E tel que F est engendré par $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$. Que suffit-il de faire pour prouver que $F \subset G$?

Il suffit de prouver que $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont éléments de G pour prouver que $F \subset G$.

5) Soit F et G deux ss-e-v de E . Laquelle des deux inclusions est toujours vraie $F \cap G \subset \{0_E\}$ ou $\{0_E\} \subset F \cap G$? Comment prouve-t-on l'autre lorsqu'elle est vraie ? Laquelle des deux inclusions est toujours vraie $F + G \subset E$ ou $E \subset F + G$? Comment prouve-t-on l'autre lorsqu'elle est vraie ?

$\{0_E\} \subset F \cap G$ et $F + G \subset E$ sont toujours vraies. Pour prouver les deux inclusion « réciproques » :

on prend un élément arbitraire de $F \cap G$ et on prouve que cet élément est nul

on prend un élément arbitraire de E et on prouve que cet élément s'écrit comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

6) A quelle condition sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E , la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ engendre-t-elle une droite vectorielle ? un plan vectoriel ? ni l'un, ni l'autre ?

Si $\vec{v}$ est non nul et $\vec{u}$ est colinéaire à $\vec{v}$ alors $(\vec{u}, \vec{v})$ engendre une droite vectorielle.

Si $(\vec{u}, \vec{v})$ est libre alors $(\vec{u}, \vec{v})$ engendre un plan vectoriel.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont nuls alors $(\vec{u}, \vec{v})$ engendre $\{0_E\}$.

7) Dans le plan géométrique P , on considère deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Placer un vecteur $\vec{x}$ quelconque dans le plan. Décomposer $\vec{x}$ comme somme d'un vecteur colinéaire à $\vec{u}$ et d'un vecteur colinéaire à $\vec{v}$. En déduire un supplémentaire de la droite $\text{vect}(\vec{u})$ dans P ?

Comme tout vecteur de P s'écrit de manière unique comme somme d'un élément colinéaire à $\vec{u}$ et d'un vecteur colinéaire à $\vec{v}$ i.e. comme somme d'un vecteur de $\text{vect}(\vec{u})$ et d'un vecteur de $\text{vect}(\vec{v})$. Cela signifie que $\text{vect}(\vec{u}) \oplus \text{vect}(\vec{v}) = P$. Ainsi, $\text{vect}(\vec{v})$ est un supplémentaire de $\text{vect}(\vec{u})$ dans P .

8) Quels sont les ss-e-v de P ?

Les ss-e-v de P ont pour dimension 0, 1 ou 2. De plus, si F est un ss-e-v de P de dimension 2 = $\dim P$, alors $F = P$. Ainsi, les ss-e-v de P sont $\{0_P\}$, les droites vectorielles engendrées chacune par un vecteur non nul de P et P tout entier.

9) Représenter, dans P , les vecteurs $w = -u + 2v$ et $z = u - v$

10) Dans l'espace géométrique E , on considère deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ non coplanaires.

Placer un vecteur $\vec{x}$ quelconque dans E . Décomposer $\vec{x}$ comme somme d'un vecteur colinéaire à $\vec{u}$ et d'un vecteur colinéaire à $\vec{v}$ d'un vecteur colinéaire à $\vec{w}$. En déduire un supplémentaire du plan $\text{vect}(\vec{u}, \vec{v})$ dans E ?

11) Quels sont les ss-e-v de E ?

Ses ss-e-v sont de dimension 0, 1, 2 ou 3 et ceux de dimensions trois sont tous égaux à E . Donc les ss-e-v de E sont Ainsi, les ss-e-v de E sont $\{0_E\}$, les droites vectorielles engendrées chacune par un vecteur non nul de E , les plans vectoriels engendrés chacun par deux vecteurs non colinéaires de E et E tout entier.

12) Représenter $x = -u - 2v + w$ et $y = 2u - w$ et $\text{vect}(2u - w, u + w)$.

$$\text{vect}(2u - w, u + w) = \text{vect}(u, w)$$

12) Décrire autrement $F = \text{vect}((1)_{n \in \mathbb{N}})$. Représenter F .

Expliquer pourquoi les suites $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne sont pas colinéaires. Idem avec $(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ où r_1 et r_2 sont des réels distincts. Décrire autrement $G = \text{vect}((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (r_2^n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $H = \text{vect}((1)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (n)_{n \in \mathbb{N}})$

F est l'ensemble des suites constantes. F est une droite vectorielle, F est donc représentée par une droite passant par la suite nulle.

$$(1)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ne sont pas colinéaires car } a(1)_{n \in \mathbb{N}} + b(n)_{n \in \mathbb{N}} = 0 \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, a + bn = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 & (n = 0) \\ a + b = 0 & (n = 1) \end{cases} \Rightarrow a = b = 0.$$

$$(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (r_2^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ne sont pas colinéaires car } a(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}} + b(r_2^n)_{n \in \mathbb{N}} = 0 \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, ar_1^n + br_2^n = 0 \Rightarrow \begin{cases} a + b = 0 & (n = 0) \\ ar_1 + br_2 = 0 & (n = 1) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} b = -a \\ a(r_1 - r_2) = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{car } r_1 \neq r_2} a = b = 0.$$

$$G = \text{vect}((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}) = \{(ar_1^n + r_2^n)_{n \in \mathbb{N}} / a, b \in \mathbb{R}\} \stackrel{r_1 \text{ et } r_2 \text{ racines de (e.c)}}{=} \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} - (r_1 + r_2)u_{n+1} + r_1r_2u_n = 0\}$$

$$H = \text{vect}((1)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (n)_{n \in \mathbb{N}}) = \{(an + b)_{n \in \mathbb{N}} / a, b \in \mathbb{R}\} = \{((an + b)1^n)_{n \in \mathbb{N}} / a, b \in \mathbb{R}\} \stackrel{1 \text{ racine double de (e.c)}}{=} \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = 0\}$$

13) Décrire autrement $F = \text{vect}((x \mapsto e^{2x}), (x \mapsto e^{-x}))$. Expliquer pourquoi les fonctions $(x \mapsto e^{2x}), (x \mapsto e^{-x})$ ne sont pas colinéaires. Représenter F .

$$F = \{(x \mapsto ae^{2x} + be^{-x}) / a, b \in \mathbb{R}\} \stackrel{2 \text{ et } -1 \text{ racines de (e.c)}}{=} \{f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f'' - f' - 2f = 0\}$$

$$(x \mapsto e^{2x}), (x \mapsto e^{-x}) \text{ ne sont pas colinéaires car } a(x \mapsto e^{2x}) + b(x \mapsto e^{-x}) = 0 \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, ae^{2x} + be^{-x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} a + b = 0 & (n = 0) \\ ae^2 + b\frac{1}{e} = 0 & (n = 1) \end{cases} \Rightarrow a = b = 0.$$

F est donc un plan vectoriel et est représenté par un plan passant par la fonction nulle.

14) Soit P et Q deux polynômes. Comment savoir si P et Q sont colinéaires ou non ? Même question avec deux matrices A et B puis deux n -uplets X et Y , puis deux suites u et v et enfin deux fonctions f et g .

$$\bullet P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \text{ et } Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k.$$

P et Q sont colinéaires si et seulement si $\exists \lambda \in \mathbb{R} / \forall k \in \mathbb{N}, a_k = \lambda b_k$ ou $\forall k \in \mathbb{N}, b_k = \lambda a_k$

(*) avec toujours le même coeff. de proportionnalité

si et seulement si les coefficients de P sont proportionnels* aux coefficients de Q ou inversement

- deux matrices A et B sont colinéaires si et seulement si les coefficients de A sont proportionnels* aux coefficients de B ou inversement.
- deux n -uplets X et Y sont colinéaires si et seulement si les composantes de X sont proportionnels* aux composantes de Y ou inversement.
- deux suites u et v sont colinéaires si et seulement si les termes de u sont proportionnels* aux termes de v ou inversement.
- deux fonctions f et g sont colinéaires si et seulement si les images de f sont proportionnels* aux images de g ou inversement.

Ex 1 Espace vectoriel quelconque

Soit $(E, +, \cdot)$ un K -e-v.

A. Soit F et G deux ss-e-v d'un K -e-v E tq : F et G distincts de E et de $\{0_E\}$.

$E \setminus F$ est-il un ss-e-v de E ? $E \setminus F \cup \{0_E\}$ est-il un ss-e-v de E ? $(F \cup G)$ est-il un ss-e-v de E ?

A. F étant un ss-e-v de E , F contient le vecteur nul donc $E \setminus F$ (l'ensemble des vecteurs de E qui ne sont pas dans F) ne contient pas le vecteur nul donc n'est pas un ss-e-v de E . Et même si on ajoute le vecteur nul à $E \setminus F$, l'ensemble $E \setminus F \cup \{0_E\}$ n'est toujours pas un ss-e-v de E comme le prouve le contre-exemple suivant : prenons $E = \mathbb{R}^2, F = \text{vect}((1,0))$. Alors $E \setminus F \cup \{0_E\} = \{(x,y) / y \neq 0\} \cup \{(0,0)\}$ et $(1,1) \in E \setminus F \cup \{(0,0)\}$ et $(1,-1) \in E \setminus F \cup \{(0,0)\}$ mais $(2,0) = (1,1) + (1,-1) \in F$ donc $(2,0) \notin E \setminus F \cup \{(0,0)\}$. J'en déduis que $E \setminus F \cup \{(0,0)\}$ n'est pas stable par addition donc n'est pas un ss-e-v de E .

$(F \cup G)$ n'est pas un ss-e-v de E comme le prouve le contre-exemple suivant : reprenons $E = \mathbb{R}^2, F = \text{vect}((1,0))$ puis $G = \text{vect}((0,1))$. Alors $(0,1) + (1,0) = (1,1)$. Donc $F \cup G$ n'est pas stable par addition et n'est donc pas un ss-e-v de E .

$$\begin{matrix} \underline{(0,1)} + \underline{(1,0)} = \underline{(1,1)} \\ \in G \subset F \cup G & \in F \subset F \cup G & \notin F \cup G \end{matrix}$$

B. Soit $G = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ une famille de vecteurs de E .

- Soit F un ss-e-v de E contenant $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p$. Quelle propriété fondamentale de F permet d'affirmer que $\text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p) \subset F$?
- Soit $F = \{\alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p / (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in K^p\}$ et $G = \{\alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p / (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in K^p \text{ et } \alpha_1 + \dots + \alpha_p = 0\}$. Lequel de ces deux ensembles F ou G est $\text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$? Justifier.
- Montrer que F et G sont deux ss-e-v de E et en donner des familles génératrices.
- Donner une écriture de $\vec{u}_2$ puis de $\vec{0}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p$. Ces écritures sont-elles uniques ? A quelle condition sur G cette écriture est-elle unique ?
- Compléter que $\text{vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p, \vec{w}) = \text{vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ si et seulement si $\vec{w} \dots \dots \dots$

f. Déterminer plusieurs familles génératrices de F et de G .

a. F est stable par combinaison linéaire.

b. $F = \text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ car la condition « $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = 0$ » nous informe de G ne contient pas toutes les combinaisons linéaires de $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p$ alors que F , qui n'impose aucune condition sur $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ les contient toutes. $G \subset F$.

c. $F = \text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ est d'après le cours un ss-e-v de E et $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ est une famille génératrice de F . Montrons que G en est un aussi : $\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in K^p, \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p \in E$ donc $G \subset E$.

Prenons $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) = (0, \dots, 0)$. Alors $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = 0$. Donc $\vec{0} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p \in G$.

Soit $\vec{v}, \vec{w}$ deux éléments de G et a et b deux scalaires.

Posons $\vec{v} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p$ tel que $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = 0$ et $\vec{w} = \beta_1 \vec{u}_1 + \beta_2 \vec{u}_2 + \dots + \beta_p \vec{u}_p$ tel que $\beta_1 + \dots + \beta_p = 0$.

Alors $a\vec{v} + b\vec{w} = a(\alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p) + b(\beta_1 \vec{u}_1 + \beta_2 \vec{u}_2 + \dots + \beta_p \vec{u}_p) = (a\alpha_1 + b\beta_1)\vec{u}_1 + (a\alpha_2 + b\beta_2)\vec{u}_2 + \dots + (a\alpha_p + b\beta_p)\vec{u}_p$ et $(a\alpha_1 + b\beta_1) + (a\alpha_2 + b\beta_2) + \dots + (a\alpha_p + b\beta_p) = a(\alpha_1 + \dots + \alpha_p) + b(\beta_1 + \dots + \beta_p) = 0$. Donc $a\vec{v} + b\vec{w} \in G$.

J'en conclus que G est un ss-e-v de E . Comme de plus $G \subset F$, G est un ss-e-v de F . Cherchons une famille génératrice de G .

$G = \{\alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p / (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in K^p \text{ et } \alpha_1 = -\alpha_2 - \dots - \alpha_{p-1}\}$

$G = \{(-\alpha_2 - \dots - \alpha_{p-1})\vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_p \vec{u}_p / (\alpha_2, \dots, \alpha_p) \in K^{p-1}\}$

$G = \{\alpha_2(\vec{u}_2 - \vec{u}_1) + \dots + \alpha_p(\vec{u}_p - \vec{u}_1) / (\alpha_2, \dots, \alpha_p) \in K^{p-1}\} = \text{vect}(\vec{u}_2 - \vec{u}_1, \vec{u}_3 - \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p - \vec{u}_1)$.

Donc, $(\vec{u}_2 - \vec{u}_1, \vec{u}_3 - \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p - \vec{u}_1)$ est une famille génératrice de G .

d. $\vec{u}_2 = 0\vec{u}_1 + 1\vec{u}_2 + 0\vec{u}_3 + \dots + 0\vec{u}_p$ et $\vec{0} = 0\vec{u}_1 + 0\vec{u}_2 + 0\vec{u}_3 + \dots + 0\vec{u}_p$. Ces écritures ne sont a priori pas uniques. Si G était libre alors ces écritures seraient obligatoirement uniques.

e. $\text{vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p, \vec{w}) = \text{vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ si et seulement si $\vec{w}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p$.

f. $F = \text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p) = \text{vect}(\vec{u}_1 + 6\vec{u}_2, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p) = \text{vect}(\vec{u}_1 + 6\vec{u}_2, \vec{u}_2, \dots, -4\vec{u}_p) = \text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p, \vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \dots + \vec{u}_p) = \dots$

Ex 2 vect(...)

1. Montrer que $\text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = \text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$.

2. Soit $P(X) = 1 + 2X + X^2$, $Q(X) = 2 - X - 2X^2$ et $R(X) = -1 + 2X + kX^2$. Déterminer les réels k tels que : $\text{vect}(P, Q) = \text{vect}(P, Q, R)$.

1. Par équation :

$$\text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} / \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / 2y - x = z \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b = x \\ 2a = y \\ 3a + b = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{y}{2} - x \\ 2a = y \\ 2y - x = z \end{cases}$$

De même, $\text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / 2y - x = z \right\}$. D'où l'égalité souhaitée.

OU Bien par double inclusion

$$\text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right) \subset \text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ sont éléments de } \text{vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ sont des c.l. de } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Or, } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \text{ et } \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Donc, } \text{vect}(U, V) \subset \text{vect}(X, Y).$$

On a $U = \frac{1}{2}X - \frac{1}{2}Y$ et $V = \frac{3}{2}X - \frac{1}{2}Y$ donc $V - U = X$ et $V - 3U = Y$. Donc $X \in \text{vect}(U, V)$ et $Y \in \text{vect}(U, V)$ et finalement $\text{vect}(X, Y) \subset \text{vect}(U, V)$.

Ainsi, $\text{vect}(U, V) = \text{vect}(X, Y)$.

OU Bien par inclusion+dimension

Posons $F = \text{vect}(U, V)$ et $G = \text{vect}(X, Y)$.

U, V ne sont pas colinéaires donc $\dim F = 2$. De même $\dim G = 2$. De plus, $U = \frac{1}{2}X - \frac{1}{2}Y$ et $V = \frac{3}{2}X - \frac{1}{2}Y$ donc $U \in G$ et $V \in G$. Et par suite, $F \subset G$ puisque G est stable par combinaison linéaire. Alors F est un ss-e-v de G . Comme $\dim F = \dim G$, j'en conclus que $F = G$.

2. Soit $P(X) = 1 + 2X + X^2$, $Q(X) = 2 - X - 2X^2$ et $R(X) = -1 + 2X + kX^2$.

$$\text{vect}(P, Q) = \text{vect}(P, Q, R) \Leftrightarrow \text{vect}(P, Q, R) \subset \text{vect}(P, Q) \Leftrightarrow R \in \text{vect}(P, Q) \Leftrightarrow R \text{ est c.l. de } P \text{ et } Q$$

car l'autre inclusion est toujours vraie

$$\Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / R = aP + bQ \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / -1 + 2X + kX^2 = a(1 + 2X + X^2) + b(2 - X - 2X^2)$$

$$\Leftrightarrow \text{le système } (S): \begin{cases} -1 = a + 2b \\ 2 = 2a - b \\ k = a - 2b \end{cases} \text{ d'inconnues } (a, b) \in \mathbb{R}^2 \text{ est compatible.}$$

$$\text{Or, } (S): \begin{cases} a + 2b = -1 \\ 2a - b = 2 \\ a - 2b = k \end{cases} \Leftrightarrow (S): \begin{cases} 2a = k - 1 \\ -b = 2 + 1 - k \\ a - 2b = k \end{cases} \Leftrightarrow (S): \begin{cases} a = \frac{1}{2}(k - 1) \\ b = k - 3 \\ \frac{1}{2}(k - 1) - 2(k - 3) = k \end{cases} \Leftrightarrow (S): \begin{cases} a = \frac{1}{2}(k - 1) \\ b = k - 3 \\ k = \frac{11}{5} \end{cases}$$

Donc (S) est compatible $\Leftrightarrow k = \frac{11}{5}$. Ainsi, $\text{vect}(P, Q) = \text{vect}(P, Q, R) \Leftrightarrow k = \frac{11}{5}$.

Ex 3 Ensembles de fonctions

Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels d'un e-v de référence (à préciser) OUI ou NON? Dans les cas (*), chercher une famille génératrice puis une base et la dimension de F . On précisera quand F est un plan ou une droite vectoriel(le).

- F est l'ensemble des applications de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ continues et d'intégrale sur $[0,1]$ nulle. OUI F ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- F est l'ensemble des fonctions réelles et constantes. (*) OUI $F = \text{vect}((x \mapsto 1))$ ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- F est l'ensemble des solutions de : $y' = xy + 1$. NON car la fonction nulle ($x \mapsto 0$) élément neutre de $D^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ n'est pas dans F .
- F est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ positives. NON car F n'est pas stable par multiplication externe, en effet $f : (x \mapsto 1) \in F$ mais $-2f \notin F$.
- F est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ croissantes. NON car F n'est pas stable par multiplication externe, en effet $f : (x \mapsto 1) \in F$ mais $-f \notin F$.
- F est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ impaire. OUI F ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- $F = \{f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}) / f'' = (1 + 2i)f' - 2if\}$. (*) OUI $F = \text{vect}_{\mathbb{C}}((x \mapsto e^x), (x \mapsto e^{2ix}))$ ss-e-v du $\mathbb{C}$ -e-v $C^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$
- Soit L un réel fixé. F est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de limite L en $+\infty$. OUI si $L = 0$
NON si $L \neq 0$ car F n'est pas stable par multiplication externe, en effet $f : (x \mapsto L) \in F$ mais $-2f \notin F$ (car $\lim_{+\infty} -2f = -2L \neq L$ puisque $L \neq 0$).
- $F = \{(x \mapsto (ax^2 + bx + c)\cos(x)) / a, b, c \text{ réels}\}$ (*). OUI $F = \text{vect}_{\mathbb{R}}((x \mapsto x^2 \cos(x)), (x \mapsto x \cos(x)), (x \mapsto \cos(x)))$ ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- $F = \{(x \mapsto \tilde{P}(x)\text{ch}(x) + \tilde{Q}(x)\text{sh}(x)) / (P, Q) \in \mathbb{R}_2[X]\}$ (*). OUI $F = \text{vect}_{\mathbb{R}}((x \mapsto x^2 \text{ch}(x)), (x \mapsto x \text{ch}(x)), (x \mapsto \text{ch}(x)), (x \mapsto x^2 \text{sh}(x)), (x \mapsto x \text{sh}(x)), (x \mapsto \text{sh}(x)))$ ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- $F = \{f \in C^1([-1,0], \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, (x^3 - 1)f'(x) = xf(x)\}$ (*). (*)

OUI $F = \text{vect}_{\mathbb{R}}((x \mapsto e^{-A(x)}))$ ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $C^1([-1,0], \mathbb{R})$ où A est une primitive de $a : (x \mapsto \frac{x}{x^3-1})$ sur $[-1,0]$.

$$\text{Or, } a(x) = \frac{x}{x^3-1} = \frac{x}{(x-1)(x^2+x+1)} \stackrel{\text{décomposition en éléments simples}}{=} \frac{1}{3(x-1)} + \frac{-x+1}{3x^2+x+1} = \frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{6x^2+x+1} + \frac{1}{2x^2+x+1}$$

$$\int_x^x \frac{1}{t^2+t+1} dt = \int_x^x \frac{1}{t^2+t+1} dt = \int_x^x \frac{1}{\frac{3}{4}\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} dt \stackrel{\text{CV}}{=} \frac{4}{3} \int_{\frac{2t+1}{\sqrt{3}}}^{\frac{2x+1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{u^2+1} \frac{\sqrt{3}}{2} du = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{Arctan}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + \text{cste.}$$

Prenons $A(x) = \frac{1}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{6} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Arctan}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)$. Alors, $e^{-A(x)} = e^{-\frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{6} \ln(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Arctan}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)} = \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{|x-1|}} e^{-\frac{1}{\sqrt{3}} \text{Arctan}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)}$.

m. Soit $F = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \exists (a, b, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^4, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a \cos(x - \alpha) + b \cos(x - \beta)\}$ (*)

OUI $F = \text{vect}_{\mathbb{R}}((x \mapsto \cos(x)), (x \mapsto \sin(x)))$ ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

En effet on montre tout d'abord que F est un ss-e-v de $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$:

$F \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ car toute fonction de la forme $(x \mapsto a \cos(x - \alpha) + b \cos(x - \beta))$ est $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ puisque son expression n'est constituée que de fonctions $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}$.

En prenant $a = b = 0$, on trouve que la fonction nulle est élément de F .

Soit $f_1 : (x \mapsto a_1 \cos(x - \alpha_1) + b_1 \cos(x - \beta_1))$ et $f_2 : (x \mapsto a_2 \cos(x - \alpha_2) + b_2 \cos(x - \beta_2))$ deux éléments de F et u_1 et u_2 deux réels.

Alors $\forall x \in \mathbb{R}, u_1 f_1(x) + u_2 f_2(x) = u_1 a_1 \cos(x - \alpha_1) + u_1 b_1 \cos(x - \beta_1) + u_2 a_2 \cos(x - \alpha_2) + u_2 b_2 \cos(x - \beta_2)$

$= [u_1 a_1 \cos(\alpha_1) + u_1 b_1 \cos(\beta_1) + u_2 a_2 \cos(\alpha_2) + u_2 b_2 \cos(\beta_2)] \cos(x) + [u_1 a_1 \sin(\alpha_1) + u_1 b_1 \sin(\beta_1) + u_2 a_2 \sin(\alpha_2) + u_2 b_2 \sin(\beta_2)] \sin(x)$

$= A \cos(x) + B \sin(x) = C \cos(x - \varphi) + 0 \cos(x - 0)$ où $C = \sqrt{A^2 + B^2}$ et $\begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{A}{C} \\ \sin(\varphi) = \frac{B}{C} \end{cases}$ Donc $u_1 f_1 + u_2 f_2 \in F$.

Ainsi F est un ss-e-v de $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

De plus d'après ce qui précède tout élément de F s'écrit sous la forme $(x \mapsto A \cos(x) + B \sin(x))$. Donc $F \subset \text{vect}(\cos, \sin)$. Et,

$\cos : (x \mapsto 1 \cos(x - 0) + 0 \cos(x - 0))$ et $\sin : (x \mapsto 1 \cos(x - \frac{\pi}{2}) + 0 \cos(x - 0))$ sont élément de F . Comme F est stable par combinaison linéaire, $\text{vect}(\cos, \sin) \subset F$. Ainsi, $\text{vect}(\cos, \sin) = F$.

n. Soit φ une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. F est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ négligeables devant φ au voisinage de 0. OUI F ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$;

o. $F = \{f \in C^0([-1,1], \mathbb{R}) / f|_{[-1,0]}$ et $f|_{[0,1]}$ sont affines $\}$ (*). OUI F ss-e-v du $\mathbb{R}$ -e-v $C^0([-1,1], \mathbb{R})$.

$F = \{f \in F([-1,1], \mathbb{R}) / \exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, \forall x \in [-1,0], f(x) = ax + b$ et $\forall x \in [0,1], f(x) = cx + d$ et f continue $\}$

$F = \{f \in F([-1,1], \mathbb{R}) / \exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, \forall x \in [-1,0], f(x) = ax + b$ et $\forall x \in [0,1], f(x) = cx + d$ et f continue en 0 $\}$

$F = \{f \in F([-1,1], \mathbb{R}) / \exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, \forall x \in [-1,0], f(x) = ax + b$ et $\forall x \in [0,1], f(x) = cx + d$ et $b = d$ $\}$

$F = \{f \in F([-1,1], \mathbb{R}) / \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \forall x \in [-1,0], f(x) = ax + b$ et $\forall x \in [0,1], f(x) = cx + b$ $\}$

$F = \{f : (x \mapsto \begin{cases} ax + b \text{ si } x \in [-1,0] \\ cx + b \text{ si } x \in [0,1] \end{cases}) / a, b, c \text{ réels}\} = \{a(x \mapsto \begin{cases} x \text{ si } x \in [-1,0] \\ 0 \text{ si } x \in [0,1] \end{cases}) + b(x \mapsto 1) + c(x \mapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \in [-1,0] \\ x \text{ si } x \in [0,1] \end{cases}) / a, b, c \text{ réels}\}$.

$F = \text{vect}(u, v, w)$ où $u : (x \mapsto \begin{cases} x \text{ si } x \in [-1,0] \\ 0 \text{ si } x \in [0,1] \end{cases})$, $v : (x \mapsto 1)$, $w : (x \mapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \in [-1,0] \\ x \text{ si } x \in [0,1] \end{cases})$

Ex 4 Ensembles de n-uplets

Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels d'un e-v de référence à préciser ? Dans les cas (*), chercher une famille génératrice puis une base et la dimension de F . On précisera quand F est un plan ou une droite vectoriel(le).

a. $F = \{x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ et } xz = y\}$

NON F n'est pas un s-e-v de $\mathbb{R}^3$ car F n'est pas stable par multiplication externe : $(1,1,1) \in F$ mais $2(1,1,1) = (2,2,2) \notin F$

b. $F = \{(x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 / \begin{cases} 2x + y + 3z + t - 2w = 0 \\ 3x - y + z + 2t + w = 0 \\ 5x - 2y - z + t + 3w = 0 \end{cases} \}$ (*).

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}^5$ et $F = \text{vect} \left(\left(1, \frac{19}{3}, -4, \frac{11}{3}, 0 \right), \left(0, \frac{5}{3}, 0, \frac{1}{3}, 1 \right) \right)$.

$$\text{Car } \begin{cases} 2x + y + 3z + t - 2w = 0 \\ 3x - y + z + 2t + w = 0 \\ 5x - 2y - z + t + 3w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + 3z + t - 2w = 0 \\ -x - 3y - 5z + 5w = 0 \\ 3x - 3y - 4z + 5w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + 3z + t - 2w = 0 \\ -x - 3y - 5z + 5w = 0 \\ 4x + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{3}w + \frac{11}{3}x \\ y = \frac{1}{3}(19x + 5w) \\ z = -4x \end{cases}$$

c. Soit $n \geq 3$ et $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{k=1}^n kx_k = \sum_{k=1}^n x_k = 0\}$ (*)

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}^5$ et $F = \text{vect} \left(\left(\left((k-2), (1-k), 0, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{k\`eme composantes}}}{1}, 0, \dots, 0 \right) \right) \right)$.

$$\text{Car } \sum_{k=1}^n kx_k = \sum_{k=1}^n x_k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^n kx_k = 0 \\ \sum_{k=1}^n x_k = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^n kx_k = 0 \\ \sum_{k=2}^n (k-1)x_k = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 - \sum_{k=3}^n kx_k \\ x_2 = \sum_{k=3}^n (1-k)x_k \end{cases}$$

Donc $F = \{(\sum_{k=3}^n (k-2)x_k, \sum_{k=3}^n (1-k)x_k, x_3, x_4, \dots, x_n) / (x_3, x_4, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-2}\}$

$$F = \left\{ \sum_{k=3}^n x_k \left((k-2), (1-k), 0, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{k\`eme composantes}}}{1}, 0, \dots, 0 \right) / (x_3, x_4, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-2} \right\}$$

d. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x-y)^2 = (x+y)^2\}$.

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / xy = 0\} = \{(0, y, z), (y, 0, z) / y, z \text{ réels}\}$.

NON F n'est pas un ss-e-v de $\mathbb{R}^3$ car F n'est pas stable par addition : $(0,1,1) \in F$ et $(1,0,1) \in F$ mais $(0,1,1) + (1,0,1) = (1,1,2) \notin F$.

Ex 5 Ensembles de vecteurs de l'espace géométrique E

Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels d'un e-v de référence à préciser ? Dans les cas (*), chercher une famille génératrice puis une base et la dimension de F . On précisera quand F est un plan ou une droite vectoriel(le).

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \in E^2$.

- $F = \{\vec{u} \in E / \exists (\mu, \gamma) \in \mathbb{R}^2; \vec{u} = \mu\vec{i} + \gamma\vec{j}\}$ (*)
- $F = \{a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \text{ et } a + b + c = 0\}$ (*)
- Soit a un réel fixé. $F = \{\vec{u} \in E / \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{i}}_{\substack{\text{produit} \\ \text{scalaire}}} = a\}$.

Ex 6 Ensembles de suites

Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels d'un e-v de référence à préciser ? Dans les cas (*), chercher une famille génératrice puis une base et la dimension de F . On précisera quand F est un plan ou une droite vectoriel(le).

- F est l'ensemble des suites complexes vérifiant : $\forall n, u_{n+3} = u_n$. (*)
- Soit a un réel fixé. F est l'ensemble des suites réelles vérifiant : $\forall n, u_{n+2} + u_{n+1} + u_n = a$. (*)
- F est l'ensemble des suites vérifiant : $\forall n, u_{n+1} = u_n^2$.
- Soit r un complexe non nul fixé. F est l'ensemble des suites arithmétiques de raison r .
- F est l'ensemble des suites complexes et bornées.
- Soit u une suite réelle fixée. F est l'ensemble des suites équivalentes à u .

Ex 7 Ensembles de polynômes

Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels d'un e-v de référence à préciser ? Dans les cas (*), chercher une famille génératrice puis une base et la dimension de F . On précisera quand F est un plan ou une droite vectoriel(le). Soit $n \in \mathbb{N}$.

- F est l'ensemble des polynômes de degré 4.

NON car F ne contient pas le polynôme nul.

- $F = \{P \in \mathbb{R}[X] / (X^2 + 1)P'' - 6P = 0\}$. (*)

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}[X]$ et $F = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} X + X^3 \\ \text{libre car } X + X^3 \text{ n'est pas} \\ \text{le polynôme nul} \\ \text{en degré donc } \dim F = 1. \end{pmatrix} \right)$. En effet, décrivons autrement les éléments de F pour trouver une famille

généralisatrice de F .

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

Si $\deg(P) \leq 1$ alors $P'' = 0$ donc $(X^2 + 1)P'' = 6P \Rightarrow P = 0$.

Si $\deg(P) \geq 2$ alors $(X^2 + 1)P'' = 6P \Rightarrow \begin{cases} \deg[(X^2 + 1)P''] = \deg[6P] \\ \text{codom}[(X^2 + 1)P''] = \text{codom}[6P] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 + (d-2) = d \\ d(d-1)a_d = 6a_d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (d^2 - d - 6)a_d = 0 \\ d = 3 \end{cases}$

Soit $P = a + bX + cX^2 + dX^3$.

$(X^2 + 1)P'' = 6P \Leftrightarrow (X^2 + 1)(6dX + 2c) = 6(a + bX + cX^2 + dX^3) \Leftrightarrow 2c + 6dX + 2cX^2 + 6dX^3 = 6a + 6bX + 6cX^2 + 6dX^3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2c = 6a \\ 6d = 6b \\ 2c = 6c \\ 6d = 6d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = a = 0 \\ b = d \end{cases}. \text{ Donc, } F = \{dX + dX^3 / d \in \mathbb{R}\} = \text{vect}(X + X^3).$$

- F est l'ensemble des polynômes constants. (*)

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}[X]$ et $F = \text{vect} \left(\begin{array}{c} 1 \\ \text{libre car } 1 \text{ n'est pas} \\ \text{le polynôme nul} \\ \text{en degré donc } \dim F = 1. \end{array} \right)$.

b. $F = \{P \in \mathbb{R}[X] / P(1) = P'(1) = 1\}$.

NON car F ne contient pas le polynôme nul.

c. $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] / \int_0^1 \tilde{P}(t) dt = 0\} (*)$

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_n[X]$ et $F = \text{vect} \left(\begin{array}{c} (X - \frac{1}{2}), (X^2 - \frac{1}{3}), \dots, (X^n - \frac{1}{n+1}) \\ \text{libre car} \\ \text{échelonnée en degré donc } \dim F = n. \end{array} \right) = \text{vect} \left(\left(X^k - \frac{1}{k+1} \right)_{k=1..n} \right)$. En effet, En effet, décrivons

autrement les éléments de F pour trouver une famille génératrice de F .

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}_n[X]$

$\int_0^1 \tilde{P}(t) dt = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 \sum_{k=0}^n a_k t^k dt = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k \left(\int_0^1 t^k dt \right) = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k \frac{1}{k+1} = 0 \Leftrightarrow a_0 = -\sum_{k=1}^n a_k \frac{1}{k+1}$. Donc

*par linéarité
de l'opérateur
intégral*

$$F = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}_n[X] / a_0 = -\sum_{k=1}^n a_k \frac{1}{k+1} \right\} = \left\{ -\sum_{k=1}^n a_k \frac{1}{k+1} + \sum_{k=1}^n a_k X^k / a_1, \dots, a_n \text{ réels} \right\}$$

$$= \left\{ \sum_{k=1}^n a_k \left(X^k - \frac{1}{k+1} \right) / a_1, \dots, a_n \text{ réels} \right\} = \text{vect} \left(\left(X^k - \frac{1}{k+1} \right)_{k=1..n} \right)$$

a. $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] / P(1) = P'(1)\}$.

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_n[X]$ et $F = \text{vect} \left(\begin{array}{c} X, (X-1)^2, (X-1)^3, \dots, (X-1)^n \\ \text{libre car} \\ \text{échelonnée en degré donc } \dim F = n. \end{array} \right) = \text{vect}(X, (X-1)^k)_{k=2..n}$. En effet, En effet, décrivons

autrement les éléments de F pour trouver une famille génératrice de F .

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k (X-1)^k \in \mathbb{R}_n[X]$. Ici je choisis d'écrire P dans la base de Taylor en 1.

$P(1) = P'(1) \Leftrightarrow a_0 = a_1$.

Donc $F = \{ \sum_{k=0}^n a_k (X-1)^k \in \mathbb{R}_n[X] / a_0 = a_1 \}$

$F = \{ a_0 + a_0(X-1) + a_2(X-1)^2 + a_3(X-1)^3 + \dots + a_n(X-1)^n / a_0, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n \text{ réels} \}$

$F = \{ a_0(1 + X - 1) + a_2(X-1)^2 + a_3(X-1)^3 + \dots + a_n(X-1)^n / a_0, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n \text{ réels} \}$

b. $E = \{P \in \mathbb{R}_5[X] / \tilde{P}(1) = \tilde{P}(3) = \tilde{P}'(3) = 0\} (*)$

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_5[X]$ et $F = \text{vect} \left(\begin{array}{c} 2(X-3)^2 + (X-3)^3, (X-3)^4 - 4(X-3)^2, (X-3)^5 + 8(X-3)^2 \\ \text{libre car échelonnée en degré donc base de } F \text{ et } \dim F = 3 \end{array} \right)$. En effet,

Soit $P = a + b(X-3) + c(X-3)^2 + d(X-3)^3 + e(X-3)^4 + f(X-3)^5 \in \mathbb{R}_5[X]$. Ici je choisis d'écrire P dans la base de Taylor en 3.

$\tilde{P}(1) = \tilde{P}(3) = \tilde{P}'(3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a - 2b + 4c - 8d + 16e - 32f = 0 \\ a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4c - 8d + 16e - 32f = 0 \\ a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2d - 4e + 8f \\ a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$. Donc,

$E = \{ a + b(X-3) + c(X-3)^2 + d(X-3)^3 + e(X-3)^4 + f(X-3)^5 \in \mathbb{R}_5[X] / \begin{cases} c = 2d - 4e + 8f \\ a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \}$

$E = \{ (2d - 4e + 8f)(X-3)^2 + d(X-3)^3 + e(X-3)^4 + f(X-3)^5 \in \mathbb{R}_5[X] / d, e, f \text{ réels} \}$

$E = \{ d[2(X-3)^2 + (X-3)^3] + e[(X-3)^4 - 4(X-3)^2] + f[(X-3)^5 + 8(X-3)^2] \in \mathbb{R}_5[X] / d, e, f \text{ réels} \}$

c. $E = \{P \in \mathbb{R}_n[X] / \tilde{P}(1) = \tilde{P}'(3) \text{ et } \tilde{P}'(1) = \tilde{P}(3)\} (*)$

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_n[X]$ et $F = \text{vect} \left(\begin{array}{c} (26 - X + X^3), (5 - \frac{11}{2}X + X^2), (X^k(X-1)^2(X-3)^2)_{k=0..(n-4)} \\ \text{libre car échelonnée en degré donc base de } F \text{ et } \dim F = n-1 \end{array} \right)$. En effet,

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Posons $H = (X-1)^2(X-3)^2$. D'après le théorème de la division euclidienne, il existe deux uniques polynômes Q et R tels que : $P = HQ + R$ et $\deg(R) < \deg(H) = 4$. Donc $R(X) = a + bX + cX^2 + dX^3$.

Alors, $P(X) = \underbrace{(X-1)^2(X-3)^2 Q(X)}_{=T(X)} + a + bX + cX^2 + dX^3$.

T admet 1 et 3 comme racines au moins double donc $\tilde{T}(1) = \tilde{T}'(1) = \tilde{T}(3) = \tilde{T}'(3) = 0$. Alors, $\begin{cases} \tilde{P}(1) = a + b + c + d \\ \tilde{P}'(1) = b + 2c + 3d \\ \tilde{P}(3) = a + 3b + 9c + 27d \\ \tilde{P}'(3) = b + 6c + 27d \end{cases}$

Donc, $\tilde{P}(1) = \tilde{P}'(3)$ et $\tilde{P}'(1) = \tilde{P}(3) \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + d = b + 6c + 27d \\ b + 2c + 3d = a + 3b + 9c + 27d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 5c - 26d = 0 \\ a + 2b + 6c + 24d = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 5c + 26d \\ 5c + 26d + 2b + 6c + 24d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5c + 26d \\ b = -\frac{11}{2}c - d \end{cases}$

Donc, $F = \{ (X-1)^2(X-3)^2 Q(X) + 5c + 26d + (-\frac{11}{2}c - d)X + cX^2 + dX^3 / Q \in \mathbb{R}_{n-4}[X], c, d \text{ réels} \}$.

$F = \{ (X-1)^2(X-3)^2 (\sum_{k=0}^{n-4} a_k X^k) + 5c + 26d + (-\frac{11}{2}c - d)X + cX^2 + dX^3 / a_4, a_5, \dots, a_n, c, d \text{ réels} \}$

$F = \{ (\sum_{k=0}^{n-4} a_k X^k (X-1)^2(X-3)^2) + c(5 - \frac{11}{2}X + X^2) + d(26 - X + X^3) / a_4, a_5, \dots, a_n, c, d \text{ réels} \}$

d. $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] / \tilde{P}(3) + 2\tilde{P}''(3) = \tilde{P}'(3)\} (*)$

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_n[X]$ et $F = \text{vect} \left(\underbrace{X - 2, X^2 + 6X - 27, (X - 3)^3, (X - 3)^4, \dots, (X - 3)^n}_{\text{libre car échelonnée en degré donc base de } F \text{ et } \dim F = n} \right)$. En effet,

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k (X - 3)^k \in \mathbb{R}_n[X]$. $\tilde{P}(3) + 2\tilde{P}''(3) = \tilde{P}'(3) \Leftrightarrow a_0 + 2 \times 6 \times a_2 = a_1$.

Donc, $F = \{ \sum_{k=0}^n a_k (X - 3)^k \in \mathbb{R}_n[X] / a_0 + 2 \times 6 \times a_2 = a_1 \}$

$$F = \{ a_0 + (a_0 + 2 \times 6 \times a_2)(X - 3) + a_2(X - 3)^2 + a_3(X - 3)^3 + \dots + a_n(X - 3)^n \in \mathbb{R}_n[X] / a_0, a_2, a_3, \dots, a_n \text{ réels} \}$$

$$F = \{ a_0[1 + (X - 3)] + a_2[(X - 3)^2 + 12(X - 3)] + a_3(X - 3)^3 + \dots + a_n(X - 3)^n \in \mathbb{R}_n[X] / a_0, a_2, a_3, \dots, a_n \text{ réels} \}$$

$$F = \{ a_0[X - 2] + a_2[X^2 + 6X - 27] + a_3(X - 3)^3 + \dots + a_n(X - 3)^n \in \mathbb{R}_n[X] / a_0, a_2, a_3, \dots, a_n \text{ réels} \}$$

a. $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] / P(X + 1) = P(X) \}$

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_n[X]$ et $F = \text{vect}(1)$. En effet,

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P \neq 0$ et $n = \deg(P)$. Alors $a_n = \text{codom}(P) \neq 0$.

$$P(X + 1) = P(X) \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k (X + 1)^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

$$\Leftrightarrow a_n(X + 1)^n + a_{n-1}(X + 1)^{n-1} + \underbrace{\sum_{k=2}^n a_k (X + 1)^k}_{T(X)} = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \underbrace{\sum_{k=2}^n a_k X^k}_{U(X)}$$

$\stackrel{FBN}{\Leftrightarrow} a_n(X^n + nX^{n-1} + Q(X)) + a_{n-1}(X^{n-1} + H(X)) + T(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + U(X)$ où Q, H, T et U de degré inf à $n - 2$
par unicité des coeff.

$$\Leftrightarrow na_n + a_{n-1} = a_{n-1}$$

$$\Rightarrow na_n = 0$$

car $a_n \neq 0$

$$\Leftrightarrow n = 0$$

$$\Rightarrow P \text{ constant.}$$

De plus, si P est constant alors $P(X + 1) = P(X)$.

Donc F est l'ensemble des polynômes constants i.e. $F = \text{vect}(1)$.

Autre méthode

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Si P est constant alors $P(X + 1) = P(X)$.

Imaginons un instant qu'il existe un polynôme P non constant tel que $P(X + 1) = P(X)$. Comme P n'est pas constant alors P admet au moins une racine complexe α d'après d'Alembert-Gauss. Alors $P(\alpha + 1) = P(\alpha) = 0$. Donc, $\alpha + 1$ est racine de P . Alors $P(\alpha + 2) = P(\alpha + 1) = 0$. Donc, $\alpha + 2$ est racine de P . Et on montre facilement par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}, \alpha + k$ est racine de P . Donc P a une infinité de racines et est donc le polynôme nul ce qui contredit le fait que P n'est pas constant. Ainsi, F est l'ensemble des polynômes constants i.e. $F = \text{vect}(1)$.

b. $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] / \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} = 0 \}$

OUI F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_n[X]$ et $F = \text{vect} \left(\underbrace{(X^k - 1)_{k=1..n}}_{\text{libre car échelonnée en degré donc base de } F \text{ et } \dim F = n} \right)$. En effet,

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}_n[X]$ alors $\forall \epsilon \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

$$P \in F \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k = 0 \Leftrightarrow a_0 = -\sum_{k=1}^n a_k \Leftrightarrow P = -\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n a_k X^k = \sum_{k=1}^n a_k (X^k - 1)$$

Donc, $F = \{ \sum_{k=1}^n a_k (X^k - 1) / a_1, a_2, \dots, a_n \text{ réels} \}$.

Ex 8 Ensembles de matrices

Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels d'un e-v de référence à préciser ? Dans les cas (*), chercher une famille génératrice puis une base et la dimension de F . On précisera quand F est un plan ou une droite vectoriel(le).

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

- F est l'ensemble des matrices complexes carrées d'ordre 3 dont la trace est nulle. (*) Idem avec ordre n .
- F est l'ensemble des matrices complexes carrées d'ordre 2 de déterminant nul.
- Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $F = \{ M \in M_n(\mathbb{R}) / AM = MA \}$ ((*) dans le cas où $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$).
- Soit $A \in M_n(K)$ et $F = \{ M \in M_n(\mathbb{R}) / \exists P \in GL_n(K); M = PAP^{-1} \}$ (de telles matrices M sont dites semblables à A).
- $F = \left\{ \begin{pmatrix} x+y & y+z & x+z \\ -y & z & -x \end{pmatrix} / (x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \right\}$ (*)
- $F = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} / xy = 0 \right\}$
- $F = S_3(\mathbb{R})$. (*)
- $F = D_n(\mathbb{R})$. (*)
- F est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n nilpotentes.

II Somme, intersection, supplémentaires, somme directe or nothing

Ex 9 dans K^n

1. Soit $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - 2z = 0 \}$ et $G = \{ (a, 3a, b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \}$

- Montrer que G et F sont deux plans vectoriels de

On donnera pour chaque ss-e-v deux familles génératrices et une base et on donnera une équation de G .

- Donner une famille génératrice de $F + G$, de $F \cap G$.
- Trouver un vecteur $X \in G$ tel que F et $\text{vect}(X)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $F = \{ (a + 2b, a, 2a + b, b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \}$ et $G = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - z = 0 \text{ et } x + y - t = 0 \}$

- Montrer que F et G sont deux plans vectoriels de $\mathbb{R}^4$.
- Justifier que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$.
- Ecrire $X = (1, 2, 3, 4)$ comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

3. $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \text{vect}((1,1,\dots,1,1))$ et $G = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{k=1}^n x_k = 0\}$.

- Justifier que F et G sont des ss-e-v de E et en déterminer une famille génératrice puis une base.
- Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

4. Soit $F = \{(x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 / \begin{cases} 3x - y + z - t + w = 0 \\ 2x - y - 2z - t - w = 0 \end{cases}\}$ et $G = \{(a, a + 2b, b - a, 2a + b, a + b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

- Montrer que F et G sont deux ss-e-v de $\mathbb{R}^5$.
- Montrer que $F = \text{vect}((-2, -6, 0, 1, 1), (3, 9, -1, -1, 0), (1, 4, -1, -1, 1))$
- Pour quelles valeurs du réel x , $(2x, 0, 3, -3, x) \in G$?
- Donner un système d'équations décrivant G (comme pour F).
- F et G sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^5$?

a. $G = \{a(1,1,-1,2,1) + b(0,2,-1,2,1) / a, b \in \mathbb{R}^2\} = \text{vect}((1,1,-1,2,1), (0,2,-1,2,1))$. Comme $(1,1,-1,2,1)$ et $(0,2,-1,2,1)$ sont dans $\mathbb{R}^5$, G est un ss-e-v de $\mathbb{R}^5$. $(1,1,-1,2,1), (0,2,-1,2,1)$ ne sont clairement pas colinéaires donc $((1,1,-1,2,1), (0,2,-1,2,1))$ est une base de G et $\dim G = 2$.

$F \subset \mathbb{R}^5$. Prenons $x = y = z = t = w = 0$. Alors $\begin{cases} 3x - y + z - t + w = 0 \\ 2x - y - 2z - t - w = 0 \end{cases}$. Donc $(0,0,0,0,0) \in F$.

Considérons $X_1 = (x_1, y_1, z_1, t_1, w_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2, z_2, t_2, w_2)$ deux éléments de F et a_1 et a_2 deux réels.

$a_1 X_1 + a_2 X_2 = a_1(x_1, y_1, z_1, t_1, w_1) + a_2(x_2, y_2, z_2, t_2, w_2) = (a_1 x_1 + a_2 x_2, a_1 y_1 + a_2 y_2, a_1 z_1 + a_2 z_2, a_1 t_1 + a_2 t_2, a_1 w_1 + a_2 w_2)$ et

$$\begin{cases} 3(a_1 x_1 + a_2 x_2) - (a_1 y_1 + a_2 y_2) + a_1 z_1 + a_2 z_2 - (a_1 t_1 + a_2 t_2) + a_1 w_1 + a_2 w_2 \\ = a_1 \left(\underbrace{3x_1 - y_1 + z_1 - t_1 + w_1}_{=0} \right) + a_2 \left(\underbrace{3x_2 - y_2 + z_2 - t_2 + w_2}_{=0} \right) = 0 \\ \text{de même, } 2(a_1 x_1 + a_2 x_2) - (a_1 y_1 + a_2 y_2) - 2(a_1 z_1 + a_2 z_2) - (a_1 t_1 + a_2 t_2) - (a_1 w_1 + a_2 w_2) = 0 \end{cases}$$

Donc, $a_1 X_1 + a_2 X_2 \in F$. Ainsi F est un ss-e-v de $\mathbb{R}^5$.

b. OU BIEN par liberté + dimension : Cherchons une famille génératrice de F pour obtenir une base puis la dimension de F .

$$\begin{cases} 3x - y + z - t + w = 0 \\ 2x - y - 2z - t - w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y + z - t + w = 0 \\ -x - 3z - 2w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y + z - t + w = 0 \\ x = -3z - 2w \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(-3z - 2w) - y + z - t + w = 0 \\ x = -3z - 2w \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -8z - 5w - t \\ x = -3z - 2w \end{cases}$$

Donc, $F = \{(x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 / \begin{cases} y = -8z - 5w - t \\ x = -3z - 2w \end{cases}\} = \{(-3z - 2w, -8z - 5w - t, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 / (z, w, t) \in \mathbb{R}^3\}$

$= \{z(-3, -8, 1, 0, 0) + w(-2, -5, 0, 0, 1) + t(0, -1, 0, 1, 0) / (z, w, t) \in \mathbb{R}^3\} = \text{vect}((-3, -8, 1, 0, 0), (-2, -5, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 1, 0))$.

Donc, $((-3, -8, 1, 0, 0), (-2, -5, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 1, 0))$ est une famille génératrice de F . De plus, cette famille est libre car échelonnée en 0 (par la droite). Donc, $(\underbrace{(-3, -8, 1, 0, 0)}_{=U}, \underbrace{(-2, -5, 0, 0, 1)}_{=V}, \underbrace{(0, -1, 0, 1, 0)}_{=W})$ est une base de F et $\dim F = 3$.

Les trois vecteurs $(-2, -6, 0, 1, 1), (3, 9, -1, -1, 0), (1, 4, -1, -1, 1)$ sont éléments de F car ces 5-uplets vérifient les deux équations de F . De

plus, ces trois vecteurs forment une famille libre car $a(-2, -6, 0, 1, 1) + b(3, 9, -1, -1, 0) + c(1, 4, -1, -1, 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + 3b + c = 0 \\ -6a + 9b + 4c = 0 \\ -b - c = 0 \\ a - b - c = 0 \\ a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} -2a + 3b + c = 0 \\ -6a + 9b + 4c = 0 \\ b = -c \\ -b = 0 \\ a = -c \end{cases} \Leftrightarrow a = b = c = 0. \text{ Comme } \dim F = 3, ((-2, -6, 0, 1, 1), (3, 9, -1, -1, 0), (1, 4, -1, -1, 1)) \text{ est libre et maximale dans } F$$

donc est une base de F . Et ainsi, $F = \text{vect}((-2, -6, 0, 1, 1), (3, 9, -1, -1, 0), (1, 4, -1, -1, 1))$.

OU bien par double inclusion je remarque que $X = (-2, -6, 0, 1, 1), Y = (3, 9, -1, -1, 0), Z = (1, 4, -1, -1, 1)$ vérifient $\begin{cases} Y = -U - W \\ X = V + W \\ Z = -U + V - W \end{cases}$.

Donc, X, Y et Z sont dans F et par suite $\text{vect}(X, Y, Z) \subset F$. De plus, $X + Y - Z = W$ et $\begin{cases} Y + X + Y - Z = -U \\ X - (X + Y - Z) = V \\ X + Y - Z = W \end{cases}$. Donc U, V et W sont des combinaisons linéaires de X, Y et Z et par conséquent, $F \subset \text{vect}(X, Y, Z)$. Ainsi, $F = \text{vect}(X, Y, Z)$.

c. $G = \{(a, a + 2b, b - a, 2a + b, a + b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

$(2x, 0, 3, -3, x) \in G \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / (2x, 0, 3, -3, x) = (a, a + 2b, b - a, 2a + b, a + b)$

$$\Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} a = 2x \\ a + 2b = 0 \\ b - a = 3 \\ 2a + b = -3 \\ a + b = x \end{cases} \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} a = 2x \\ 3a = -6 \\ 3b = 3 \\ 2a + b = -3 \\ a + b = x \end{cases} \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} x = -1 \\ a = -2 \\ b = 1 \\ -3 = -3 \\ x = -1 \end{cases}$$

Ainsi, $(2x, 0, 3, -3, x) \in G \Leftrightarrow x = -1$.

d. $(x, y, z, t, w) \in G \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / (x, y, z, t, w) = (a, a + 2b, b - a, 2a + b, a + b)$

$$\Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} a = x \\ a + 2b = y \\ b - a = z \\ 2a + b = t \\ a + b = w \end{cases} \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} a = x \\ 3a = y - 2z \\ 3b = y + z \\ 2a + b = t \\ a + b = w \end{cases} \Leftrightarrow \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} x = \frac{1}{2}(y - 2z) \\ a = \frac{1}{2}(y - 2z) \\ b = \frac{1}{3}(y + z) \\ (y - 2z) + \frac{1}{3}(y + z) = t \\ \frac{1}{2}(y - 2z) + \frac{1}{3}(y + z) = w \end{cases}$$

Ainsi, $G = \{(x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 / \begin{cases} 2x - y + 2z = 0 \\ (y - 2z) + \frac{1}{3}(y + z) = t \\ \frac{1}{2}(y - 2z) + \frac{1}{3}(y + z) = w \end{cases}\}$.

e. F et G sont des ss-e-v de $\mathbb{R}^5$. Notons $B_c = ((1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^5$. Alors, F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^5$

$\Leftrightarrow$ la concaténation d'une base de F et d'une base de G est une base de $\mathbb{R}^5$

$\Leftrightarrow ((-3, -8, 1, 0, 0), (-2, -5, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 1, 0), (1, 1, -1, 2, 1), (0, 2, -1, 2, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^5$

$\Leftrightarrow M = \text{mat}_{B_c}(U, V, W, A, B)$ est inversible

$\Leftrightarrow \text{rg}(M) = 5$.

Or, $\text{mat}_{B_c}(U, V, W, A, B) = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -8 & -5 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_4 \leftarrow C_4 - C_5} \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -8 & -5 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_5 \leftarrow C_5 - C_2 - 2C_3 + C_1 + C_4} \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -8 & -5 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Donc, M n'est pas inversible et ainsi, F et G ne sont pas supplémentaires dans $\mathbb{R}^5$.

Ex 10 dans $F(D, \mathbb{R})$

1. Soit E l'espace vectoriel des applications de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ continues sur $[0, 1]$. Soit F l'ensemble des applications de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ constantes et $G = \{f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) / \int_0^1 f(t) dt = 0\}$

- a. Justifier que F est une droite vectorielle.
- b. Montrer que F et G sont deux ss-e-v de E supplémentaires dans E .
- c. Décomposer $(x \mapsto x^2 \ln(1+x))$ comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

a. $F = \{(x \mapsto a) / a \in \mathbb{R}\} = \{a(x \mapsto 1) / a \in \mathbb{R}\} = \text{vect}(f_0)$ où $f_0: (x \mapsto 1)$. Comme f_0 n'est pas la fonction nulle et appartient à E , j'en déduis que F est une droite vectorielle de E .

b. En particulier, F est un ss-e-v de E .

Montrons que G est aussi un ss-e-v de E .

- $G = \{f \in E / \int_0^1 f(t) dt = 0\}$ donc $G \subset E$.
- La fonction $w: (x \mapsto 0)$ est élément de G car $\int_0^1 w(t) dt = \int_0^1 0 dt = 0$.
- Soit f et g deux éléments de G et a et b deux réels. Comme f et g sont continues sur $[0, 1]$, $af + bg$ l'est aussi et $\int_0^1 (af + bg)(t) dt = a \underbrace{\int_0^1 f(t) dt}_{=0} + b \underbrace{\int_0^1 g(t) dt}_{=0} = 0$. Donc, $af + bg \in G$.

Ainsi, G est un ss-e-v de E .

Montrons que $F \oplus G = E$.

Soit $\varphi \in E$. Je cherche $f \in F$ et $g \in G$ telles que $\varphi = f + g$.

Analyse : supposons que de telles fonctions f et g existent.

Alors $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = f(x) + g(x) \\ \int_0^1 g(t) dt = 0 \end{cases}$. Alors, $\int_0^1 \varphi(t) dt = \int_0^1 f(t) + g(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \underbrace{\int_0^1 g(t) dt}_{=0 \text{ car } g \in G} = \int_0^1 a dt + 0 = a$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^1 \varphi(t) dt$ et $g(x) = \varphi(x) - \int_0^1 \varphi(t) dt$.

Ainsi, si f et g existent alors nécessairement $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^1 \varphi(t) dt$ et $g(x) = \varphi(x) - \int_0^1 \varphi(t) dt$ donc f et g sont uniques.

Synthèse Soit f et g définies par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^1 \varphi(t) dt$ et $g(x) = \varphi(x) - \int_0^1 \varphi(t) dt$.

Alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + g(x) = \int_0^1 \varphi(t) dt + \varphi(x) - \int_0^1 \varphi(t) dt = \varphi(x)$.

De plus, f est constante i.e. $f \in F$.

Enfin, posons $\lambda = \int_0^1 \varphi(t) dt$. Alors, $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \varphi(x) - \lambda dx = \int_0^1 \varphi(x) dx - \lambda \int_0^1 1 dx = \int_0^1 \varphi(x) dx - \lambda = 0$. Donc $g \in G$.

Ainsi, f et g conviennent et d'après l'analyse, sont les seules qui conviennent.

J'en conclus que $F \oplus G = E$.

c. Prenons $\varphi(x) = x^2 \ln(1+x)$.

Alors $\varphi = f + g$ où $f \in F$ et $g \in G$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^1 t^2 \ln(1+t) dt$ et $g(x) = x^2 \ln(1+x) - f(x)$.

Or, $\int_0^1 t^2 \ln(1+t) dt \stackrel{\substack{CV \\ u=1+t \\ du=dt}}{=} \int_1^2 (u-1)^2 \ln(u) du \stackrel{IPP}{=} \left[\frac{(u-1)^3}{3} \ln(u) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{(u-1)^3}{3} \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \ln(2) - \frac{1}{3} \int_1^2 u^2 - 3u + 3 - \frac{1}{u} du$

$$= \frac{1}{3} \ln(2) - \frac{1}{3} \left[\frac{u^3}{3} - \frac{3u^2}{2} + 3u - \ln(u) \right]_1^2 = \frac{1}{3} \ln(2) - \frac{1}{3} \left(\frac{8}{3} - 6 + 6 - \ln(2) - \frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 3 \right) = -\frac{1}{3} \left(\frac{14+9-18}{6} \right) + \frac{2}{3} \ln(2) = \frac{2}{3} \ln(2) - \frac{5}{18}$$

Donc, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{2}{3} \ln(2) - \frac{5}{18}$ et $g(x) = x^2 \ln(1+x) - \frac{2}{3} \ln(2) + \frac{5}{18}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, $E = C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $F = \{f \in E / f(0) = f'(0) = 0\}$, G l'ensemble des applications affines et H l'ensemble des applications polynomiales de degré inférieur ou égal à n .

- Montrer que F et G sont deux ss-e-v de E supplémentaires dans E .
- Déterminer $f \in F$ et $g \in G$ telles que $\exp = f + g$. Donner une expression intégrale à f .
- Décrire $F \cap H$ et $G \cap H$.
- Montrer que $F \cap H \oplus G = H$.

Ex 11 dans $\mathbb{R}^N$

1. Soit $p \in \mathbb{N}$ et $F = \{u \in \mathbb{R}^N / \forall n, u_{n+4} = u_n\}$ et $G = \{u \in \mathbb{R}^N / u_3 = u_2 = u_1 = u_0 = 0\}$

- Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^N$ supplémentaires dans $\mathbb{R}^N$.
- Déterminer une base de F .

1. Montrons tout d'abord que F et G sont deux ss-e-v de $\mathbb{R}^N$.

$F = \text{vect}(r, s, t, y)$ où $r = (1, 0, 0, \dots)$, $s = (0, 1, 0, 0, \dots)$, $t = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$ et $y = (0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$. Donc F est un ss-e-v de $\mathbb{R}^N$.
 $G \subset \mathbb{R}^N$ et la suite nulle est évidemment élément de G .

Soit $(u, v) \in G^2$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. $\forall k \in \{0, 1, 2, 3\}, u_k = v_k = 0$ donc $au_k + bv_k = 0$. Donc, $au + bv \in G$. Ainsi G est un ss-e-v de $\mathbb{R}^N$.
Montrons qu'ils sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^N$.

Soit u une suite réelle. Je cherche une suite $v \in F$ et une suite $w \in G$ telles que $u = v + w$.

Analyse : Supposons que v et w existent. Alors, $\forall n, u_n = v_n + w_n$ et $v_{n+4} = v_n$ et $w_3 = w_2 = w_1 = w_0 = 0$. Alors, $u_0 = v_0, u_1 = v_1, u_2 = v_2$ et $u_3 = v_3$. Donc $v = (u_0, u_1, u_2, u_3, u_0, u_1, u_2, u_3, \dots) = u_0 r + u_1 s + u_2 t + u_3 y$.
Alors, $\forall n, w_n = u_n - v_n$.

Les seules suites v et w qui peuvent convenir sont $v = (u_0, u_1, u_2, u_3, u_0, u_1, u_2, u_3, \dots) = u_0 r + u_1 s + u_2 t + u_3 y$ et $\forall n, w_n = u_n - v_n$.

Synthèse Soit $v = (u_0, u_1, u_2, u_3, u_0, u_1, u_2, u_3, \dots) = u_0 r + u_1 s + u_2 t + u_3 y$ et $\forall n, w_n = u_n - v_n$.

Alors, $u = v + w$ et $v \in \text{vect}(r, s, t, y) = F$ et $w_0 = u_0 - v_0 = 0, w_1 = u_1 - v_1 = 0, w_2 = u_2 - v_2 = 0$ et $w_3 = u_3 - v_3 = 0$ i.e. $w \in G$. Donc v et w conviennent et d'après l'analyse sont les seules suites qui conviennent.

J'en conclus que toute suite réelle s'écrit de manière unique comme somme d'une suite de F et d'une suite de G . Ainsi, F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^N$.

2. Soit $E = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 3u_{n+1} + 2u_n\}$, $F = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n = 0\}$ et G l'ensemble des suites géométriques de raison 2.

- Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -e-v.
- Montrer que F est un plan vectoriel de E et G une droite vectorielle de E .
- Prouver que F et G sont supplémentaires dans E . En déduire une base de E .
- Si l'on définissait une équation caractéristique de E , quelle serait-elle ? Quelles seraient ses solutions ? Est-ce cohérent avec le résultat de la question 3. et le cours sur les suites récurrentes d'ordre 2 ?

a. $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

La suite nulle telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \omega_n = 0$ vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, \omega_{n+3} = 0 = 3 \times 0 + 2 \times 0 = 3\omega_{n+1} + 2\omega_n$. Donc $\omega \in E$.

Soit u et v deux éléments de E et a et b réels.

$\forall n \in \mathbb{N}, (au + bv)_{n+3} = au_{n+3} + bv_{n+3} = a(3u_{n+1} + 2u_n) + b(3v_{n+1} + 2v_n) = 3(au_{n+1} + bv_{n+1}) + 2(au_n + bv_n) = (au + bv)_{n+3} = 3(au + bv)_{n+1} + 2(au + bv)_n$. Donc $au + bv \in E$.

J'en conclus que E est un ss-e-v de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et est donc un $\mathbb{R}$ -e-v.

b. **F ?** Posons (e.c) : $r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$.

Donc, $F = \{((an + b)(-1)^n)_{n \in \mathbb{N}} / a, b \text{ réels}\} = \text{vect}\left(\underbrace{((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}}_{\in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}}, \underbrace{((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}}_{\in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}}\right)$. Donc F est un ss-e-v de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Montrons que $r = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ et $s = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N}, r_{n+3} - 3r_{n+1} - 2r_n = (n+3)(-1)^{n+3} - 3(n+1)(-1)^{n+1} - 2n(-1)^n = [-(n+3) + 3(n+1) - 2n](-1)^n = 0$
 $s_{n+3} - 3s_{n+1} - 2s_n = (-1)^{n+3} - 3(-1)^{n+1} - 2(-1)^n = [-1 + 3 - 2](-1)^n = 0$.

Donc, $r \in E$ et $s \in E$. Alors comme E est stable par combinaison linéaire, $F = \text{vect}(r, s) \subset E$.

J'en conclus que F est un ss-e-v de E .

Montrons que (r, s) est libre. Soit a et b réels tels que : $ar + bs = 0$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, a n(-1)^n + b(-1)^n = 0$.

En particulier, pour $n = 0, b = 0$ puis pour $n = 1, a(-1)^1 + \underset{=0}{b}(-1)^1 = 0$ donc $a = 0$.

Ainsi, (r, s) est libre i.e. r et s ne sont pas colinéaires. J'en déduis que F est un plan vectoriel de E .

G ? $G = \{(a2^n)_{n \in \mathbb{N}} / a \text{ réel}\} = \text{vect}((2^n)_{n \in \mathbb{N}})$. Donc G est un ss-e-v de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Montrons que $t = (2^n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N}, t_{n+3} - 3t_{n+1} - 2t_n = 2^{n+3} - 3 \times 2^{n+1} - 2 \times 2^n = \left[\underbrace{2^3 - 3 \times 2^1 - 2}_{=0} \right] 2^n = 0$. Donc, $t \in E$. Alors comme E est stable par

combinaison linéaire, $G = \text{vect}(t) \subset E$. J'en conclus que G est un ss-e-v de E . Comme t n'est pas la suite nulle, G est une droite vectorielle dans E .

c. Montrons que toute suite de E s'écrit de manière unique comme somme d'une suite de F et d'une suite de G .

Soit u une suite de E . Je cherche $v \in F$ et $w \in G$ telles que $u = v + w$. **NB : v et w dépendent de u .**

Analyse : Supposons que de telles suites v et w existent. Exprimons v et w en fonction de u .

$$\text{Alors } \begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + w_n \\ \exists a \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N}, w_n = a2^n \end{cases} \text{ . Donc, } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = a2^n + v_n.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 = v_{n+2} + 2v_{n+1} + v_n = u_{n+2} - a2^{n+2} + 2(u_{n+1} - a2^{n+1}) + u_n - a2^n = u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n - a(4 + 4 + 1)2^n \text{ et}$$

Donc, $a = \frac{1}{9 \cdot 2^n} [u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n]$. Mais a ne doit pas dépendre de n . Montrons que $a = \left(\frac{1}{9 \cdot 2^n} [u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n] \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{9 \cdot 2^{n+1}} [u_{n+3} + 2u_{n+2} + u_{n+1}] - \frac{1}{9 \cdot 2^n} [u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n] \\ &= \frac{1}{9 \cdot 2^{n+1}} \left[\left[\begin{array}{c} u_{n+3} \\ = 3u_{n+1} + 2u_n \end{array} \right] + 2u_{n+2} + u_{n+1} \right] - [2u_{n+2} + 4u_{n+1} + 2u_n] \text{ car } u \in E \\ &= \frac{1}{9 \cdot 2^{n+1}} [3u_{n+1} + 2u_n + 2u_{n+2} + u_{n+1}] - [2u_{n+2} + 4u_{n+1} + 2u_n] = 0. \end{aligned}$$

Donc, (a_n) est constante. Ainsi, $a = \frac{1}{9 \cdot 2^n} [u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n] = \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$. Par suite, $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$.

J'en déduis que si v et w existent, v et w sont uniques et valent : $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$ et

$$v_n = u_n - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n.$$

Synthèse : Posons $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$ et $v_n = u_n - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$. Alors $w + v = u$ et $w \in G$.

$$\text{Et, } v_{n+2} + 2v_{n+1} + v_n = u_{n+2} - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^{n+2} + 2 \left(u_{n+1} - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^{n+1} \right) + u_n - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$$

$$= u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^{n+2} - \frac{2}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^{n+1} - \frac{1}{9} [u_2 + 2u_1 + u_0] 2^n$$

$$\stackrel{\text{d'après } (*)}{=} 9 \cdot 2^n a - \frac{1}{9} [9(u_2 + 2u_1 + u_0)] 2^n$$

$$\stackrel{\text{d'après } (*)}{=} 9 \cdot 2^n a - \frac{9}{9} a \cdot 2^n = 0. \text{ Donc } v \in F.$$

Ainsi, v et w conviennent et sont les seules qui conviennent d'après l'analyse.

J'en conclus que F et G sont supplémentaires dans E .

d. Alors le cours (chap e-v de dimension finie, théo 22) assure que la concaténation d'une base de F et d'une base de G est une base de E . Ainsi, $((2^n)_{n \in \mathbb{N}}, ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, (n(-1)^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est une base de E .

e. L'équation caractéristique serait $(e.c) : r^3 - 3r - 2 = 0$. Ses racines sont (-1) , racine double, et 2 , racine simple. Donc si, pour les suites récurrentes d'ordre 3 homogène, il existait un théorème analogue à celui des suites récurrentes d'ordre 2, on aurait pu directement affirmer que :

$$E = \{(a2^n + b(-1)^n + cn(-1)^n)_{n \in \mathbb{N}} / a, b, c \text{ réels}\} = \text{vect}((2^n)_{n \in \mathbb{N}}, ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, (n(-1)^n)_{n \in \mathbb{N}})$$

Ex 12 dans $\mathbb{R}[X]$.

1. Soit Q un polynôme réel fixé non nul et de degré p . Soit F l'ensemble des polynômes divisibles par Q . Montrer que F et $\mathbb{R}_{p-1}[X]$ sont deux sous-e-v supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.

■ $\mathbb{R}_{p-1}[X] = \text{vect}(1, X, X^2, \dots, X^{p-1})$ est un ss-e-v de $\mathbb{R}[X]$.

Montrons que $F = \{QU / U \in \mathbb{R}[X]\}$ est un ss-e-v de $\mathbb{R}[X]$.

- $F \subset \mathbb{R}[X]$.
- Si P est le polynôme nul alors $P = 0 \times U$ donc le polynôme nul est élément de F .
- Soit P_1 et P_2 deux polynômes de F . Soit a et b deux réels. Alors il existe U_1 et U_2 tels que $P_1 = QU_1$ et $P_2 = QU_2$.
Donc, $aP_1 + bP_2 = aQU_1 + bQU_2 = Q(aU_1 + bU_2) = Q(aU_1 + bU_2)$. Donc $aP_1 + bP_2 \in F$.

Ainsi F est un ss-e-v de $\mathbb{R}[X]$.

■ $F \oplus \mathbb{R}_{p-1}[X] = \mathbb{R}[X]$ est une autre façon d'écrire le théorème de la division euclidienne. En effet, $\forall P \in \mathbb{R}[X], \exists! (U, V) \in \mathbb{R}[X]^2 / P = QU + V$ et $\deg(V) < \deg(Q)$ ce qui s'écrit aussi $\forall P \in \mathbb{R}[X], \exists! H \in F, \exists! V \in \mathbb{R}_{p-1}[X] / P = H + V$. Cela signifie que $F \oplus \mathbb{R}_{p-1}[X] = \mathbb{R}[X]$.

2. $F = \{P \in \mathbb{R}[X] / \tilde{P}(1) = 0\}$ et $G = \{aX / a \in \mathbb{R}\}$.

- Montrer que G est une droite vectorielle.
- Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}[X]$.
- Donner un sous espace vectoriel de E qui ne soit pas supplémentaire de F dans $\mathbb{R}[X]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner une famille génératrice de $F \cap \mathbb{R}_n[X]$.
a. $G = \text{vect}(X)$. Comme X est un polynôme non nul de $\mathbb{R}[X]$, G est une droite vectorielle de $\mathbb{R}[X]$.

b. Montrons tout d'abord que F est un ss-e-v de $\mathbb{R}[X]$.

$$F \subset \mathbb{R}[X].$$

Comme $\mathbb{R}[X]$ est de dimension infinie, je ne peux pas utiliser la caractérisation de ss-e-v supplémentaires par concaténation des bases.

Je vais donc **montrer que tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$, s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G .**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Je cherche $U \in F$ et $V \in G$ tels que $P = U + V$.

Analyse : supposons que de tels polynômes U et V existent.

Alors $\begin{cases} P = U + V \\ \tilde{U}(1) = 0 \end{cases}$. Donc, $P(X) = U(X) + aX$ et par suite, $\tilde{P}(1) = \tilde{U}(1) + a = a$.

Donc $V(X) = \tilde{P}(1)X$ et $U(X) = P(X) - \tilde{P}(1)X$. Donc si U et V existent, ils sont uniques et valent $V(X) = \tilde{P}(1)X$ et $U(X) = P(X) - \tilde{P}(1)X$.

Synthèse posons $V(X) = \tilde{P}(1)X$ et $U(X) = P(X) - \tilde{P}(1)X$. Alors $U(X) + V(X) = P(X)$ et $V \in G$ et $\tilde{U}(1) = \tilde{P}(1) - \tilde{P}(1) = 0$ donc $U \in F$. Ainsi, U et V conviennent et sont les seuls polynômes qui conviennent.

J'en conclus que $F \oplus G = \mathbb{R}[X]$.

Exemple : $X^2 = \underbrace{(X^2 - X)}_{\in F} + \underbrace{X}_{\in G}$ est la décomposition de X^2 dans la somme directe $F \oplus G$.

c. $H = \text{vect}(X - 1) \subset F$ (car $X - 1 \in F$ et F est stable par combinaison linéaire). Donc, $F \cap H = H \neq \{\vec{0}\}$.

J'en déduis que F et H ne sont pas supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.

d. Soit $n \in \mathbb{N}$. $F \cap \mathbb{R}_n[X] = \{P \in \mathbb{R}_n[X] / \tilde{P}(1) = 0\}$

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Ecrivons P dans la base de Taylor en 1 : $P = \sum_{k=0}^n a_k (X - 1)^k$. Alors,

$$P \in F \Leftrightarrow \tilde{P}(1) = 0 \Leftrightarrow a_0 = 0 \Leftrightarrow P = \sum_{k=1}^n a_k (X - 1)^k.$$

Ainsi, $F \cap \mathbb{R}_n[X] = \{\sum_{k=1}^n a_k (X - 1)^k / a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}\} = \text{vect}((X - 1)^k)_{k=1 \dots n}$. De plus, $((X - 1)^k)_{k=1 \dots n}$ est échelonnée en degré sans polynôme nul donc est libre. J'en conclus que $((X - 1)^k)_{k=1 \dots n}$ est une base de $F \cap \mathbb{R}_n[X]$ qui est par conséquent de dimension n .

a.

Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(X^2) = X^2 P(X)\}$ et $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / \tilde{P}(-1) = \tilde{P}(2)\}$. Montrer que F et G sont deux ss-e-v de $\mathbb{R}_3[X]$ supplémentaires dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Soit $P = a + bX + cX^2 + dX^3 \in \mathbb{R}_3[X]$.

$$P \in F \Leftrightarrow P(X^2) = X^2 P(X) \Leftrightarrow a + bX^2 + cX^4 + dX^6 = aX^2 + bX^3 + cX^4 + dX^5 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ b = a \\ 0 = b \\ c = c \\ d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ b = a \\ 0 = b \\ c = c \\ d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = d = 0.$$

Donc, $F = \{cX^2 / c \text{ réel}\} = \text{vect}(X^2)$. Donc F est un ss-e-v de $\mathbb{R}_3[X]$. Comme X^2 n'est pas le polynôme nul, (X^2) est libre et est donc une base de F et $\dim F = 1$.

$P \in G \Leftrightarrow \tilde{P}(-1) = \tilde{P}(2) \Leftrightarrow a - b + c - d = a + 2b + 4c + 8d \Leftrightarrow b = -c - 3d$

$\Leftrightarrow P = a - (c + 3d)X + cX^2 + dX^3 = a + c(X^2 - X) + d(X^3 - 3X)$

Donc, $G = \text{vect}(1, X^2 - X, X^3 - 3X)$. Donc G est un ss-e-v de $\mathbb{R}_3[X]$. De plus, la famille $(1, X^2 - X, X^3 - 3X)$ génératrice de G est libre car échelonnée en degré et sans polynôme nul donc $(1, X^2 - X, X^3 - 3X)$ est une base de G et $\dim G = 3$.

Pour prouver que $F \oplus G = \mathbb{R}_3[X]$, il suffit alors de prouver que la concaténation de la base de F et celle de G est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

Prouvons que $B' = (X^2, 1, X^2 - X, X^3 - 3X)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

Première méthode : Notons $H = \text{vect}(X^2, 1, X^2 - X, X^3 - 3X)$.

Alors, $H \stackrel{P_3 \leftarrow P_3 - P_1}{=} \text{vect}(X^2, 1, X^2 - X - X^2, X^3 - 3X) = \text{vect}(X^2, 1, -X, X^3 - 3X)$. $(X^2, 1, -X, X^3 - 3X)$ est libre car échelonnée en degré.

Donc $\dim H = 4 = \dim \mathbb{R}_3[X]$. Comme H est un ss-e-v de $\mathbb{R}_3[X]$, je peux affirmer que $H = \mathbb{R}_3[X]$. Ainsi, $(X^2, 1, X^2 - X, X^3 - 3X)$ est génératrice de $\mathbb{R}_3[X]$ et minimale dans $\mathbb{R}_3[X]$ (cardinal 4 égal à $\dim \mathbb{R}_3[X]$). Ainsi, $(X^2, 1, X^2 - X, X^3 - 3X)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$. J'en conclus que $F \oplus G = \mathbb{R}_3[X]$.

Deuxième méthode (matricielle). Notons $B = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$

$B' = (X^2, 1, X^2 - X, X^3 - 3X)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X] \Leftrightarrow \text{mat}_B B'$ est inversible $\Leftrightarrow \text{rg}(\text{mat}_B B') = 4$.

$$\text{Or, } P = \text{mat}_B B' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{C_3 \leftarrow C_3 - C_1}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Donc, } \text{rg}(P) = 4. \text{ Ainsi, } B' = (X^2, 1, X^2 - X, X^3 - 3X) \text{ est une base de } \mathbb{R}_3[X].$$

J'en conclus que $F \oplus G = \mathbb{R}_3[X]$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_n$ des réels tous distincts.

a. Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer l'unique polynôme $L_i \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que : $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{i\}, \tilde{L}_i(a_k) = 0$ et $\tilde{L}_i(a_i) = 1$.

b. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

c. Déterminer les composantes du polynôme constant 1 dans cette base.

d. En déduire que $\varphi: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ définie par : $\varphi(P) = (\tilde{P}(a_0), \tilde{P}(a_1), \dots, \tilde{P}(a_n))$ est bijective.

e. On définit $F = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f \text{ polynomiale et } \deg(f) \leq n\}$ et $G = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f(a_0) = f(a_1) = \dots = f(a_n) = 0\}$. Montrer que F et G sont deux ss-e-v de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ supplémentaires dans $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

a. Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

$$\begin{cases} L_i \in \mathbb{R}_n[X] \\ L_i(a_i) = 1 \\ \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{i\}, L_i(a_k) = 0 \end{cases}$$

un polynôme non nul de degré inférieur à n qui admet n racines distinctes est scindé à racines simples $\Leftrightarrow \begin{cases} a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n \text{ sont les seules racines de } L_i, \\ \text{elles sont simples et il existe un réel } \lambda \text{ tq:} \\ L_i(X) = \lambda \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (X - a_k) \\ \text{et } L_i(a_i) = 1 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} L_i \in \mathbb{R}_n[X] \\ L_i(a_i) = 1 \\ \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{i\}, a_k \text{ est racine de } L_i \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} L_i(X) = \lambda \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (X - a_k) \\ 1 = \lambda \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (a_i - a_k) \end{cases} \Leftrightarrow L_i(X) = \frac{1}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (a_i - a_k)} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (X - a_k).$$

Ainsi, $L_i(X) = \frac{1}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (a_i - a_k)} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (X - a_k)$ est le seul polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que : $L_i(a_i) = 1$ et $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{i\}, L_i(a_k) = 0$.

- b. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i \Rightarrow \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \tilde{P}(a_k) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(a_k) = \lambda_k L_k(a_k) = \lambda_k \Rightarrow P = \sum_{i=0}^n \tilde{P}(a_i) L_i$. Donc si l'écriture de P comme combinaison linéaire des polynômes $L_0, L_1, \dots, L_n$ existe alors cette écriture est unique et $P = \sum_{i=0}^n \tilde{P}(a_i) L_i$.

Soit $T = P - \sum_{i=0}^n \tilde{P}(a_i) L_i$.

$\deg(T) \leq \max(\deg(\tilde{P}), \deg(L_0), \deg(L_1), \dots, \deg(L_n)) = n$.

$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, T(a_k) = \tilde{P}(a_k) - \sum_{i=0}^n \tilde{P}(a_i) \underset{=0 \text{ si } i \neq k}{L_i(a_k)} = \tilde{P}(a_k) - \tilde{P}(a_k) L_k(a_k) = 0$. Donc, $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont $n + 1$ racines distinctes de

T . Donc T a strictement plus de racines que son degré et est ainsi le polynôme nul. J'en conclus que $P = \sum_{i=0}^n \tilde{P}(a_i) L_i$.

Ainsi, $P = \sum_{i=0}^n \tilde{P}(a_i) L_i$ est l'unique écriture de P comme combinaison linéaire des polynômes $L_0, L_1, \dots, L_n$. J'en conclus que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

- c. Soit $T = (\sum_{i=0}^n L_i) - 1$

$\deg(T) \leq \max(\deg(L_0), \deg(L_1), \dots, \deg(L_n), \deg(1)) = n$.

$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \tilde{T}(a_k) = \left[\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \tilde{L}_i(a_k) \right] - 1 = \tilde{L}_k(a_k) - 1 = 0$. Donc, $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont $n + 1$ racines distinctes de T . Donc T a

strictement plus de racines que son degré et est ainsi le polynôme nul. J'en conclus que $\sum_{i=0}^n L_i = 1$. Donc $(1, 1, \dots, 1)$ sont les composantes du polynôme 1.

- d. Soit $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Alors $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i \Rightarrow \deg(P) \leq n$ et $\forall k, \tilde{P}(a_k) = \lambda_k$. Donc $\varphi(\sum_{i=0}^n \lambda_i L_i) = (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$; autrement dit, $\sum_{i=0}^n \lambda_i L_i$ est un antécédent de $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ par φ . De plus, $\varphi(P) = \varphi(Q) \Rightarrow (\tilde{P}(a_0), \tilde{P}(a_1), \dots, \tilde{P}(a_n)) = (\tilde{Q}(a_0), \tilde{Q}(a_1), \dots, \tilde{Q}(a_n)) \Rightarrow \forall k, \tilde{P}(a_k) = \tilde{Q}(a_k) \Rightarrow P - Q$ a davantage de racines que son degré $\Rightarrow P = Q$. Donc, φ est injective.

- d. $F = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f \text{ polynomiale et } \deg(f) \leq n\}$ et $G = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f(a_0) = f(a_1) = \dots = f(a_n) = 0\}$.

$F = \text{vect}((x \mapsto 1), (x \mapsto x), \dots, (x \mapsto x^n))$ est un ss-e-v de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

$G \subset F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Si w est la fonction nulle alors $w(a_0) = w(a_1) = \dots = w(a_n) = 0$ donc $w \in G$. Soit f et g deux éléments de G et u et v deux réels. Alors $(uf + vg)(a_k) = u \underset{=0}{\underbrace{f(a_k)}} + v \underset{=0}{\underbrace{g(a_k)}} = 0$. Donc $uf + vg \in G$. Ainsi, G est un ss-e-v de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

■ Pour prouver que F et G sont supplémentaires dans $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, je vais montrer que tout élément de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G . (Comme $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est de dimension infinie, la caractérisation par concaténation de bases ne peut pas s'appliquer ici).

Soit $h \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Je cherche $f \in F$ et $g \in G$ telles que $h = f + g$.

Analyse : supposons que de telles fonctions f et g existent.

Alors $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, h(x) = f(x) + g(x) \\ f = \tilde{P} \text{ avec } P \in \mathbb{R}_{n-1}[X] \\ g(a_0) = g(a_1) = \dots = g(a_n) = 0 \end{cases}$. Alors $h(a_0) = f(a_0) = \tilde{P}(a_0)$, $h(a_1) = f(a_1) = \tilde{P}(a_1), \dots$ et $h(a_n) = f(a_n) = \tilde{P}(a_n)$ donc $\varphi(P) = h$. Par conséquent, $P = \varphi^{-1}(h)$, $f = \tilde{P}$ et $g = h - f = h - \tilde{P}$.

Donc si f et g existent, elles sont uniques et valent $f = \tilde{P}$ et $g = h - \tilde{P}$ où $P = \varphi^{-1}(h)$.

Synthèse : Soit $P = \varphi^{-1}(h)$ et $f = \tilde{P}$ et $g = h - \tilde{P}$

Alors, $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ donc $f \in F$ et $f(a_0) = \tilde{P}(a_0) = h(a_0)$, $f(a_1) = \tilde{P}(a_1) = h(a_1), \dots, f(a_n) = \tilde{P}(a_n) = h(a_n)$. Par conséquent, $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, g(a_k) = f(a_k) - \tilde{P}(a_k) = 0$. Donc, $g \in G$. Ainsi, f et g conviennent et d'après l'éneluse sont les seules fonctions telles que $f \in F$ et $g \in G$ et $h = f + g$.

Ainsi, $F \oplus G = F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Ex 13 Dans $M_n(\mathbb{R})$

1. $E = M_n(\mathbb{R})$. Soit F l'ensemble des matrices de E de trace nulle.

Démontrer que F et $\text{vect}(I_n)$ sont deux sous-e-v de $M_n(\mathbb{R})$ supplémentaires dans $M_n(\mathbb{R})$.

2. $A = \begin{pmatrix} -5 & -3 & 6 \\ 0 & -2 & 0 \\ -3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$.

- a. Montrer que le système $(S_\lambda): AX = \lambda X$ n'est pas de Cramer si $\lambda \in \{-2, 1\}$. Soit $H = \text{Sol}((S_1))$ et $K = \text{Sol}((S_{-2}))$.
- b. Montrer que H et K sont deux ss-e-v de $M_{3,1}(\mathbb{R})$ supplémentaires dans $M_{3,1}(\mathbb{R})$.

3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $F = \{M \in M_3(\mathbb{R}) / AM = O_3\}$ et $G = \{M \in F / AM = MA\}$.

- Montrer F est un ss-e-v de $M_3(\mathbb{R})$ et trouver une famille génératrice de F .
- A est-elle inversible ? Les éléments de F sont-ils inversibles ?
- Déterminer toutes les matrices M de F telles que $A + M$ est inversible.
- Montrer que G est une droite vectorielle de F .
- Prouver que F et G sont stables par produit matriciel.

1. $F = \{M \in M_3(\mathbb{R}) / AM = O_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}) / \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = O_3 \right\}$

$$2. = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}) / \begin{cases} a_2 - a_3 = 0 \\ a_1 - a_2 = 0 \\ a_1 - a_3 = 0 \\ b_2 - b_3 = 0 \\ b_1 - b_2 = 0 \\ b_1 - b_3 = 0 \\ c_2 - c_3 = 0 \\ c_1 - c_2 = 0 \\ c_1 - c_3 = 0 \end{cases} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}) / \begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 \\ b_1 = b_2 = b_3 \\ c_1 = c_2 = c_3 \end{cases} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{pmatrix} / a_1, b_1, c_1 \text{ réels} \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} / a, b, c \text{ réels} \right\}$$

$$= \text{vect} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{F \text{ famille génératrice de } F} \right).$$

F est un ss-e-v de $M_3(\mathbb{R})$.

De plus $a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a = b = c = 0$. Donc F est libre. J'en conclus que F est une base de F et $\dim(F) = 3$.

$$3. G \subset F, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in G \text{ car } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in F \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} A = 0 = A \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considérons M et N deux matrices de G et α et β deux réels. Alors, $\alpha M + \beta N \in F$ puisque M et N sont dans G donc dans F et F est stable par combinaison linéaire. Et, $A(\alpha M + \beta N) = A(\alpha M) + A(\beta N) = \alpha(AM) + \beta(AN) \stackrel{\substack{\text{car } M \in G \\ \text{et } N \in G}}{=} \alpha(MA) + \beta(NA)$

$= (\alpha M)A + (\beta N)A = (\alpha M + \beta N)A$. Donc $\alpha M + \beta N \in G$. Nous en concluons que G est un ss-e-v de F .

Cherchons une famille génératrice de G .

$$G = \{M \in F / AM = MA\} = \{M \in F / 0 = MA\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} / a, b, c \text{ réels et } \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} / a, b, c \text{ réels et } \begin{cases} 0 = b - c \\ a - b = 0 \\ -a + c = 0 \\ b - c = 0 \\ a - b = 0 \\ -a + c = 0 \\ 0 = b - c \\ a - b = 0 \\ -a + c = 0 \end{cases} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} / a, b, c \text{ réels et } a = b = c \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix} / a \text{ réel} \right\} =$$

$\text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$. De plus, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \neq (0)$, donc $\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$ est libre. J'en déduis que $\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de G et G est une droite vectorielle de F .

4. Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Soit $F = \{M \in M_2(\mathbb{R}) / AM = MA\}$. Soit (e) l'équation $M^3 = A$ d'inconnue $M \in M_2(\mathbb{R})$.

1. Montrer que F est une ss-e-v de $M_2(\mathbb{R})$ et en trouver une famille génératrice.
2. Montrer que si M est solution de (e) alors $M \in F$.
3. En déduire les solutions de (e) .

III Familles libres, familles liées. Bases.

Ex 14 Liberté ou liaison d'une famille de fonctions

1. Soit, $f_0 = 2$, $f_1 : (x \mapsto \ln(3x))$, $f_2 : (x \mapsto \frac{1}{x})$, $f_3 : (x \mapsto \ln(7x))$, $f_4 : (x \mapsto \frac{1}{x^2+x})$, $f_5 : (x \mapsto \frac{1}{x+1})$, $f_6 : (x \mapsto \frac{\ln(x)}{x})$. Déterminer une base de $\text{vect}(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6)$.

$f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$ sont des fonctions de $C^\infty(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$. Donc, $F = \text{vect}(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6)$ est un ss-e-v de $C^\infty(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$.

- Cherchons tout d'abord des relations de dépendance linéaires entre les vecteurs $f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$.

Le théorème de décomposition en éléments simples assure que f_4 est combinaison linéaire de f_5 et f_2 .

$$\forall x > 0, \ln(7x) = \ln\left(\frac{7}{3}3x\right) = \ln\left(\frac{7}{3}\right) + \ln(3x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{7}{3}\right) 2 + \ln(3x) \text{.. Donc, } f_3 = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{7}{3}\right) f_0 + f_1.$$

Nous en déduisons que $F = \text{vect}(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6) = \text{vect}(f_0, f_1, f_2, f_5, f_6)$. Autrement dit $(f_0, f_1, f_2, f_5, f_6)$ est génératrice de F .

- Montrons que $(f_0, f_1, f_2, f_5, f_6)$ est libre.

Soit a, b, c, d, e des réels tels que : $af_0 + bf_1 + cf_2 + df_5 + ef_6 = 0$ i.e. $\forall x > 0, a + b \ln(3x) + \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} + \frac{e \ln(x)}{x} = 0 (**)$.

Imaginons que $b \neq 0$. Alors, $a + b \ln(3x) + \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} + \frac{e \ln(x)}{x} \sim_{+\infty} b \ln(3x)$ ce qui signifie d'après (**), que $0 \sim_{+\infty} b \ln(3x)$ ce qui est impossible puisque $b \neq 0$ donc $(x \mapsto b \ln(3x))$ n'est pas la fonction nulle. Donc nécessairement $b = 0$ et désormais (**), s'écrit :

$$\forall x > 0, a + \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} + \frac{e \ln(x)}{x} = 0 (**).$$

Imaginons que $e \neq 0$. Alors, $a + \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} + \frac{e \ln(x)}{x} \sim_{+\infty} \frac{e \ln(x)}{x}$ ce qui signifie d'après (**), que $0 \sim_{+\infty} \frac{e \ln(x)}{x}$ ce qui est impossible puisque $e \neq 0$ donc $(x \mapsto \frac{e \ln(x)}{x})$ n'est pas la fonction nulle. Donc nécessairement $e = 0$ et désormais (**), s'écrit : $\forall x > 0, a + \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} = 0 (**)$.

Alors, $0 \stackrel{\text{par (**)}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} a + \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} = a$. Désormais (**), s'écrit : $\forall x > 0, \frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} = 0 (**)$. En particulier, $\begin{cases} \text{pour } x = 1, c + \frac{d}{2} = 0 \\ \text{pour } x = 2, \frac{c}{2} + \frac{d}{3} = 0 \end{cases}$. Donc, $c =$

$d = 0$. J'en conclus que $(f_0, f_1, f_2, f_5, f_6)$ est libre et finalement $(f_0, f_1, f_2, f_5, f_6)$ est une base de F . Ainsi, $\dim F = 5$.

2. Soit $a \in \mathbb{R}, f_1 = \sin, f_2 : (t \mapsto \sin(t+a))$ et $f_3 : (t \mapsto \cos(t+a))$. (f_1, f_2, f_3) est-elle libre ?

3. Soit $f_1 = \exp, f_2 : (t \mapsto \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) e^{-\frac{t}{2}})$ et $f_3 : (t \mapsto \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) e^{-\frac{t}{2}})$ et $F = \text{vect}(f_1, f_2, f_3)$.

a) Soit a, b, c trois réels tels que $af_1 + bf_2 + cf_3 = 0$. Montrer que $a = b = c = 0$ par deux méthodes.

i. Prendre des valeurs de t et conclure.

ii. Utiliser un développement limité de $af_1 + bf_2 + cf_3$ au voisinage de 0 et conclure.

b) Quelle est $\dim(F)$?

c) Soit $G = \{f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f'' + f' + f = 0\}$. Montrer que $F = G \oplus \text{vect}(f_1)$.

d) Déterminer une base de $\text{vect}(g_1, g_2, g_3, g_4)$ où

$$g_1 : (t \mapsto 3e^{-\frac{t}{2}}(\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) - 2\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)))$$

$$g_2 : (t \mapsto e^t - e^{-\frac{t}{2}}(\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)))$$

$$g_3 : (t \mapsto e^{-\frac{t}{2}}(2\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)) + e^{3t/2})$$

$$g_4 : (t \mapsto e^{-\frac{t}{2}}(-\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + 3\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)) + 4e^t).$$

a.i. $\forall t \in \mathbb{R}, ae^t + b \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) e^{-\frac{t}{2}} + c \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) e^{-\frac{t}{2}} = 0$. En particulier,

pour $t = 0, a + c = 0$. Donc $c = -a$.

$$\text{pour } t = \frac{\pi}{\sqrt{3}}, a e^{\frac{\pi}{\sqrt{3}}} + b e^{-\frac{\pi}{2\sqrt{3}}} = 0. \text{ Donc } b = -a e^{\frac{3\pi}{2\sqrt{3}}}$$

$$\text{pour } t = -\frac{\pi}{\sqrt{3}}, a e^{-\frac{\pi}{\sqrt{3}}} - b e^{\frac{\pi}{2\sqrt{3}}} = 0. \text{ Donc } b = a e^{\frac{3\pi}{2\sqrt{3}}}$$

$$\text{Donc } -a e^{\frac{3\pi}{2\sqrt{3}}} + a e^{\frac{3\pi}{2\sqrt{3}}} = 0 \text{ et par suite } a = 0 \text{ puis } b = c = 0.$$

Nous en concluons que (f_1, f_2, f_3) est libre et constitue une base de F .

a.ii. $\forall t \in \mathbb{R}, ae^t + b \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) e^{-\frac{t}{2}} + c \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) e^{-\frac{t}{2}} = 0$. Donc $\forall t \in \mathbb{R}, ae^{\frac{3t}{2}} + b \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + c \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) = 0$.

$$\text{Donc } a \left(1 + \frac{3t}{2} + \frac{9t^2}{8} + o_0(t^2)\right) + b \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + o_0(t^2)\right) + c \left(1 - \frac{3}{8}t^2 + o_0(t^2)\right) = 0$$

$$\text{Autrement dit, } (a + c) + \left(\frac{3a}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}b\right)t + \left(\frac{9}{8}a - \frac{3}{8}c\right)t^2 + o_0(t^2) = 0$$

Alors par unicité de la partie polynomiale du développement limité de la fonction nulle, nous pouvons affirmer que :

$$\begin{cases} a + c = 0 \quad (L_1) \\ \frac{3a}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}b = 0 \quad (L_2) \\ \frac{9}{8}a - \frac{3}{8}c = 0 \quad (L_3) \end{cases} \text{ Par conséquent, } L_1 \text{ et } L_3 \text{ donnent } a = c = 0 \text{ et ensuite grâce à } L_2, b = 0.$$

b. Ainsi, nous retrouvons à nouveau que $B = (f_1, f_2, f_3)$ est libre et constitue donc une base de F . J'en déduis que $\dim F = 3$.

c. $G = \{f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f'' + f' + f = 0\}$ = ensemble des solutions de l'EDL2h à coeff. constants $y'' + y' + y = 0$.

Donc, $G = \{(x \mapsto (a \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + b \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)) e^{-\frac{t}{2}}) / a, b \text{ réels}\} = \text{vect}(f_2, f_3)$.

Comme (f_1, f_2, f_3) est libre, (f_2, f_3) est libre. Donc, (f_2, f_3) est une base de G . Comme $f_1 \neq 0, \neq (f_1)$ est une base de $\text{vect}(f_1)$.

Comme la base (f_1, f_2, f_3) de F est la concaténation d'une base de G et d'une base de $\text{vect}(f_1)$, nous pouvons conclure que :

$$F = G \oplus \text{vect}(f_1)$$

d. $G = (g_1, g_2, g_3, g_4)$ est une famille de vecteurs de F . Comme F est de dimension 3, G , étant de cardinal 4, G est liée.

$$\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3 + \lambda_4 g_4 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1(3f_2 - 6f_3) + \lambda_2(f_1 - f_2) + \lambda_3(f_1 + 2f_2 + f_3) + \lambda_4(4f_1 - f_2 + 3f_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda_2 + \lambda_3 + 4\lambda_4)f_1 + (3\lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_4)f_2 + (-6\lambda_1 + \lambda_3 + 3\lambda_4)f_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 + \lambda_3 + 4\lambda_4 = 0 \\ 3\lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \\ -6\lambda_1 + \lambda_3 + 3\lambda_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_3 - 4\lambda_4 \\ \frac{1}{2}(\lambda_3 + 3\lambda_4) + \lambda_3 + 4\lambda_4 + 2\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 = \frac{1}{6}(\lambda_3 + 3\lambda_4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_3 - 4\lambda_4 \\ \lambda_3 = -\frac{9}{7}\lambda_4 \\ \lambda_1 = \frac{1}{6}(\lambda_3 + 3\lambda_4) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = \frac{9}{7}\lambda_4 - 4\lambda_4 = \frac{-19}{7}\lambda_4 \\ \lambda_3 = -\frac{9}{7}\lambda_4 \\ \lambda_1 = \frac{2}{7}\lambda_4 \end{cases} \text{ Donc, } \forall \lambda_4 \in \mathbb{R}, \frac{2}{7}\lambda_4 g_1 - \frac{19}{7}\lambda_4 g_2 - \frac{9}{7}\lambda_4 g_3 + \lambda_4 g_4 = 0.$$

En particulier, pour $\lambda_4 = 1, \frac{2}{7}g_1 - \frac{19}{7}g_2 - \frac{9}{7}g_3 + g_4 = 0$. En particulier, $g_4 = -\frac{2}{7}g_1 + \frac{19}{7}g_2 + \frac{9}{7}g_3$ est combinaison linéaire de g_1, g_2, g_3 . Donc, $\text{vect}(g_1, g_2, g_3, g_4) = \text{vect}(g_1, g_2, g_3)$.

De plus, $\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3 = 0 \Leftrightarrow$ il existe λ_4 réel tel que $\begin{cases} \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3 + \lambda_4 g_4 = 0 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \text{il existe } \lambda_4 \text{ réel tel que } \begin{cases} \lambda_2 = \frac{9}{7}\lambda_4 - 4\lambda_4 = -\frac{19}{7}\lambda_4 \\ \lambda_3 = -\frac{9}{7}\lambda_4 \\ \lambda_1 = \frac{2}{7}\lambda_4 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Donc, (g_1, g_2, g_3) est libre et est donc une base de $\text{vect}(g_1, g_2, g_3, g_4)$.

AUTRE METHODE:

$$\text{mat}_B G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -6 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Or, } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -6 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim_c \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim_c \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & -6 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} g_2 & g_1 & g_3 - g_2 & g_4 - 4g_2 \\ g_2 & g_1 & g_3 - g_2 & g_4 - 4g_2 - g_1 \\ g_2 & g_1 & g_3 - g_2 - g_1 & g_4 - 4g_2 - g_1 \end{matrix}$$

$$\sim_c \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 7 & 9 \end{pmatrix} \sim_c \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc, $\text{rg}(g_1, g_2, g_3, g_4) = 3$. Et $(g_2, g_1, g_3 - g_2 - g_1)$ est une base de $\text{vect}(g_1, g_2, g_3, g_4)$.

4. Montrer que ces familles sont libres

a. Pour tout entier naturel k , on pose, $f_k: (x \rightarrow \text{Arctan}^k(x))$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $(f_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre.

c

Considérons le polynôme $P(X) = \lambda_0 + \lambda_1 X + \dots + \lambda_n X^n$. Alors l'égalité $(**)$ s'écrit $\forall x \in \mathbb{R}, \tilde{P}(\text{Arctan}(x)) = 0$ ce qui signifie que $\forall x \in \mathbb{R}, \text{Arctan}(x)$ est racine de P . Or, $\{\text{Arctan}(x) / x \in \mathbb{R}\} =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Donc P admet tous les réels strictement compris en $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$ comme racines, P admet donc une infinité de racines. Par conséquent, P est le polynôme nul et par suite ses coefficients $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont tous nuls. J'en conclus que la famille $(f_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre.

Pour tout entier naturel k , on pose $h_k: (x \rightarrow \cos(kx))$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $(h_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre.

$\forall a \in \mathbb{R}$, on pose $f_a: (x \rightarrow x^a)$. Soit $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels distincts Montrer que la famille $(f_{a_1}, f_{a_2}, \dots, f_{a_n})$ est libre dans $C^\infty(\mathbb{R}^{**}, \mathbb{R})$.

- Deux remarques préliminaires :

$\forall a \in \mathbb{R}, x^a = e^{a \ln(x)}$ donc $f_a: (x \rightarrow x^a)$ est définie sur $\mathbb{R}^{**}$ et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^{**}$.

Comme l'ordre des vecteurs d'une famille n'influe pas sur son caractère libre ou liée, on peut supposer que $a_1 < a_2 < \dots < a_n$

- Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que : $\lambda_1 f_{a_1} + \lambda_2 f_{a_2} + \dots + \lambda_n f_{a_n} = 0$ i.e. $\forall x \in \mathbb{R}^{**}, \lambda_1 x^{a_1} + \lambda_2 x^{a_2} \dots + \lambda_n x^{a_n} = 0$ (**).

Si nous imaginons un instant que $\lambda_n \neq 0$ alors $\lambda_1 x^{a_1} + \lambda_2 x^{a_2} \dots + \lambda_n x^{a_n} \sim_{+\infty} \lambda_n x^{a_n}$ et en utilisant (**), nous obtenons $0 \sim_{+\infty} \lambda_n x^{a_n}$ ce qui est impossible car λ_n étant non nul, $(x \mapsto \lambda_n x^{a_n})$ n'est pas toute nulle au voisinage de $+\infty$. Nous en déduisons que l'hypothèse « $\lambda_n \neq 0$ » est fautive et ainsi $\lambda_n = 0$. Alors (**) s'écrit : $\forall x \in \mathbb{R}^{**}, \lambda_1 x^{a_1} + \lambda_2 x^{a_2} \dots + \lambda_{n-1} x^{a_{n-1}} = 0$. Et on recommence le procédé précédent (Si nous imaginons un instant que $\lambda_{n-1} \neq 0$ alors) pour prouver que $\lambda_{n-1} = 0$ puis $\lambda_{n-2} = 0$ puis Après avoir prouvé que $\lambda_{n-1} = \lambda_{n-2} = \dots = \lambda_2 = 0$, (**) s'écrit : $\forall x \in \mathbb{R}^{**}, \lambda_1 x^{a_1} = 0$; il suffit alors de remarquer que x^{a_1} ne s'annule jamais et par conséquent, $\lambda_1 = 0$. Ainsi, je peux conclure que la famille $(f_{a_1}, f_{a_2}, \dots, f_{a_n})$ est libre dans $C^\infty(\mathbb{R}^{**}, \mathbb{R})$.

$\forall a \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi_a: (x \rightarrow \sqrt{|x-a|})$. Soit $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels distincts. Montrer que la famille $(\varphi_{a_1}, \varphi_{a_2}, \dots, \varphi_{a_n})$ est libre dans $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Soit $a \in \mathbb{R}$. $\varphi_a: (x \rightarrow \sqrt{|x-a|})$ est continue sur $\mathbb{R}$ mais n'est dérivable que sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$.

En effet, la valeur absolue et la racine carrée sont continues sur tout le domaine de définition respectif donc $\varphi_a: (x \rightarrow \sqrt{|x-a|})$ est continue sur son domaine de définition $\mathbb{R}$. De plus, la valeur absolue et la racine carrée ne sont pas dérivables en 0 mais sont dérivables sur leur domaine de définition respectif privé de 0. Et $x = a \Leftrightarrow x - a = 0 \Leftrightarrow |x - a| = 0$. Donc, φ_a est au moins dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$. Enfin, $\forall x \neq a$,

$$a, \tau(x) = \frac{\varphi_a(x) - \varphi_a(a)}{x-a} = \frac{\sqrt{|x-a|}}{x-a} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x-a|}} & \text{si } x > a \\ \frac{-1}{\sqrt{|x-a|}} & \text{si } x < a \end{cases}. \text{ Donc, } \lim_{x \rightarrow a^+} \tau(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow a^-} \tau(x) = -\infty. \text{ Ainsi, } \varphi_a \text{ n'est pas dérivable en } a.$$

- Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que : $\lambda_1 \varphi_{a_1} + \lambda_2 \varphi_{a_2} + \dots + \lambda_n \varphi_{a_n} = 0$ i.e. $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_1 \varphi_{a_1}(x) + \lambda_2 \varphi_{a_2}(x) \dots + \lambda_n \varphi_{a_n}(x) = 0$.

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors, $\lambda_k \varphi_{a_k} = -\lambda_1 \varphi_{a_1} - \dots - \lambda_{k-1} \varphi_{a_{k-1}} - \lambda_{k+1} \varphi_{a_{k+1}} - \dots - \lambda_n \varphi_{a_n}$. Or, si $\lambda_k \neq 0$ alors $\lambda_k \varphi_{a_k}$ n'est pas dérivable en a_k tandis que $-\lambda_2 \varphi_{a_2} - \dots - \lambda_{k-1} \varphi_{a_{k-1}} - \lambda_{k+1} \varphi_{a_{k+1}} - \dots - \lambda_n \varphi_{a_n}$ est dérivable en a_k (comme combinaison linéaire de fonctions dérivables en a_k) .. ce qui n'est pas possible puisque ces deux fonctions sont égales. J'en déduis que $\lambda_k = 0$. Ainsi la famille $(\varphi_{a_1}, \varphi_{a_2}, \dots, \varphi_{a_n})$ est libre.

$\forall a \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi_a: (x \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } x = a \\ 0 & \text{si } x \neq a \end{cases})$. Soit $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels distincts. Montrer que la famille $(\varphi_a)_{a \in I}$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que : $\lambda_1 \varphi_{a_1} + \lambda_2 \varphi_{a_2} + \dots + \lambda_n \varphi_{a_n} = 0$ i.e. $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_1 \varphi_{a_1}(x) + \lambda_2 \varphi_{a_2}(x) \dots + \lambda_n \varphi_{a_n}(x) = 0$ (**).

d'après (**)

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors, $\lambda_k \varphi_{a_k}(a_k) \stackrel{(**)}{=} \sum_{j \neq k} \lambda_j \varphi_{a_j}(a_k) = 0$. Or, $\lambda_k \varphi_{a_k}(a_k) \stackrel{(**)}{=} \lambda_k \cdot 1$. Donc, $\lambda_k = 0$.

Ainsi la famille $(\varphi_{a_1}, \varphi_{a_2}, \dots, \varphi_{a_n})$ est libre.

Ex 14 TD 17 Famille de polynômes.

1. Etudier la liberté de la famille $(P_1, P_2, \dots, P_5)$ tel que $P_1 = 1 - 2X + X^3$, $P_2 = -2X - X^4$, $P_3 = X^2 - 2X^3 + 2X^4$, $P_4 = 3 + 2X - 3X^4$, $P_5 = 1 - X^2 - X^3 - X^4$.

$(P_1, P_2, \dots, P_5)$ est une famille de polynôme de $\mathbb{R}_4[X]$. Et $\text{card}(P_1, P_2, \dots, P_5) = 5 = \dim \mathbb{R}_4[X]$.

Donc, $(P_1, P_2, \dots, P_5)$ est libre $\Leftrightarrow (P_1, P_2, \dots, P_5)$ est une base de $\mathbb{R}_4[X]$ $\Leftrightarrow M = \text{mat}_B(P_1, P_2, \dots, P_5)$ est inversible $\Leftrightarrow \text{rg}(M) = 5$.
où $B = (1, X, X^2, X^3, X^4)$ base canonique de $\mathbb{R}_4[X]$

$$\text{Or, } M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_5 \leftarrow C_5 - C_1 \\ C_4 \leftarrow C_4 - 3C_1}]{\sim_C} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_5 \leftarrow C_5 + C_2 \\ C_4 \leftarrow C_4 + 4C_2}]{\sim_C} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_5 \leftarrow C_5 + C_3}]{\sim_C} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{C_4 \leftarrow C_4 - 3C_5}]{\sim_C} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Donc } \text{rg}(M) = 5.$$

Ainsi, $(P_1, P_2, \dots, P_5)$ est une famille **LIBRE** de polynômes de $\mathbb{R}_4[X]$.

2. Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tq $a \neq b$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la famille de polynômes $((X+a)^{n-k}(X+b)^k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre dans $\mathbb{C}_n[X]$.

Soit $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que : $\sum_{k=0}^n \lambda_k (X+a)^{n-k}(X+b)^k = 0$ i.e. $\lambda_0(X+a)^n + \lambda_1(X+a)^{n-1}(X+b)^1 + \dots + \lambda_n(X+b)^n = 0$ (*).

Evaluons cette égalité en $-b$, nous obtenons : $\lambda_0(a-b)^n = 0$. Comme $a-b \neq 0$, nécessairement $\lambda_0 = 0$.

Alors, (*) s'écrit $\lambda_1(X+a)^{n-1}(X+b)^1 + \dots + \lambda_n(X+b)^n = 0$

i.e. $[\lambda_1(X+a)^{n-1} + \dots + \lambda_{n-1}(X+a)(X+b)^{n-2} + \lambda_n(X+b)^{n-1}](X+b) = 0$. Comme $X+b \neq 0$ et $\mathbb{R}[X]$ est intègre, nécessairement $\lambda_1(X+a)^{n-1} + \dots + \lambda_{n-1}(X+a)(X+b)^{n-2} + \lambda_n(X+b)^{n-1} = 0$ (**).

Evaluons cette égalité en $-b$, nous obtenons : $\lambda_1(a-b)^{n-1} = 0$. Comme $a-b \neq 0$, nécessairement $\lambda_1 = 0$.

Alors, (**) s'écrit Itérons ce précédé pour prouver que $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$. A la dernière étape, (*) s'écrit : $\lambda_n(X+b)^n = 0$. Comme $(X+b)^n \neq 0$, nécessairement $\lambda_n = 0$.

J'en conclus que $((X+a)^{n-k}(X+b)^k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre.

Exemple analogue fait dans le cours

3. Soit $n \in \mathbb{N}$ et pose pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $L_i(X) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^{n-k} \frac{X-k}{i-k}$. Montrer que la famille $(L_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Déterminer les composantes d'un polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$ dans cette base.

Posons pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $a_i = i$. Alors $(L_0, L_1, \dots, L_n)$ est la famille des polynômes de Lagrange associée aux réels $a_0, \dots, a_n$.

Cette famille est

- une famille de polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$
- libre car $\sum_{i=0}^n \lambda_i L_i = 0 \Rightarrow \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sum_{i=0}^n \lambda_i \underbrace{L_i(k)}_{=\delta_{ik}} = 0 \Rightarrow \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \lambda_k = 0$.
- de cardinal $n+1$ égale à la dimension de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exemple analogue fait dans le cours

Alors, la caractérisation « liberté-maximale » d'une base assure que $(L_0, L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

4. Déterminer une $\mathbb{R}$ -base du $\mathbb{R}$ -e-v $\mathbb{C}_3[X]$.

$$\begin{aligned} \mathbb{C}_3[X] &= \{z_0 + z_1X + z_2X^2 + z_3X^3 / z_0, z_1, z_2, z_3 \text{ complexes}\} \\ &= \{a_0 + ib_0 + (a_1 + ib_1)X + (a_2 + ib_2)X^2 + (a_3 + ib_3)X^3 / a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \text{ réels}\} \\ &= \text{vect}_{\mathbb{R}}(1, i, X, iX, X^2, iX^2, X^3, iX^3) \end{aligned}$$

NB : $\mathbb{C}_3[X]$ est avant tout un $\mathbb{C}$ -e-v et $\mathbb{C}_3[X] = \text{vect}_{\mathbb{C}}(1, X, X^2, X^3)$

5. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ tq $\deg(P) = n$. Justifier que $(P, P', \dots, P^{(n)})$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P^{(k)} = \deg(P) - k = n - k$. Donc $(P, P', \dots, P^{(n)})$ est une famille de polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$, échelonnée en degré sans polynôme nul donc cette famille est libre. Enfin, cette famille est de cardinal $(n+1)$ égal à $\dim(\mathbb{R}_n[X])$. J'en conclus par la caractérisation « liberté-maximale » que $(P, P', \dots, P^{(n)})$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 15 Famille de suites.

1. Montrer que la famille de suites (u, v, w, z) est libre où les suites u, v, w, z sont définies par : $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \ln^2(n+1), v_n = \sqrt{n}, w_n = (-1)^n, z_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n$$

2. $\forall k \in \mathbb{N}, v_k = (n^k)_{n \in \mathbb{N}}$ (on note $v_k(n) = n^k$). Soit $m \in \mathbb{N}$. Montrer que $(v_0, v_1, \dots, v_m)$ est une famille libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

3. Déterminer est une base du $\mathbb{C}$ -e-v des suites complexes 4-périodiques.

Soit $u = (1, 10, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, \dots)$, $v = (0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots)$, $w = (1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, \dots)$ et $t = (0, 0, 3, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, \dots)$. Montrer que (u, v, w, t) est une autre base du $\mathbb{C}$ -e-v des suites complexes 4-périodiques.

Exercice 16- Dans un K-e-v E de dimension quelconque.

1. Soit $L = (\vec{u}_i)_{i=1..n}$ une famille libre de vecteur d'un K- espace vectoriel E.

- Etudier la liberté de la famille $F = (\vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{u}_2 + \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_{n-1} + \vec{u}_n, \vec{u}_1 + \vec{u}_n)$.
- Soit $p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ (ici $n > 1$). Justifier que $\text{vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ et $\text{vect}(\vec{u}_{p+1}, \dots, \vec{u}_n)$ sont en somme directe.
- Soit F et G deux ss-e-v de E tels que : $F \oplus G = E$ et $G = \text{vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$.

Soit $\vec{a} \in F$ et $G_a = \text{vect}(\vec{a} + \vec{u}_1, \vec{a} + \vec{u}_2, \dots, \vec{a} + \vec{u}_p)$.

i. Montrer que G_a et F sont supplémentaires dans E .

2. Justifier que G_a est de dimension finie et déterminer sa dimension. Ici E est de dimension finie p , de base $B = (\vec{e}_i)_{i=1..p}$. On pose : $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \vec{\varepsilon}_i = \vec{e}_i - (\vec{e}_{i+1} + \vec{e}_{i+2} + \dots + \vec{e}_p)$ et $\vec{\varepsilon}_p = \vec{e}_p$. Montrer que $B' = (\vec{\varepsilon}_i)_{i=1..p}$ est une base de E . Soit $\vec{x} \in E$. Exprimer les composantes de $\vec{x}$ dans la base B' en fonction des composantes de $\vec{x}$ dans B .