

Séries réelles ou complexes .

I Généralités

1 Définition : Soit une suite (u_n) de nombres réels ou complexes.

- La **série de terme général** u_n est la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : pour tout entier naturel n , $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
- La série de terme général u_n est notée $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou $\sum u_n$.
- Pour chaque entier n , S_n est appelée **somme partielle** de rang n de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$.
- On dit que la **série** $\sum_{n \geq 0} u_n$ **converge** (resp. **diverge**) lorsque la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge (resp. diverge).
- Etudier La nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$, c'est étudier son caractère divergent ou convergent.

2 Définition Lorsque la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, la limite finie de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ ou $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ ou $\sum_{p=0}^{+\infty} u_p$ et est appelée **la somme** de la série et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - S_n$ est le **reste de rang n** .

3 Remarque : il arrive que la suite u ne soit définie qu'à partir d'un certain rang n_0 . Alors $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ et la série de terme général u_n est notée $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et si elle existe, sa somme est notée $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$.

4 Exemple : On pose $u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+5)}$. Montrons que $\sum u_n$ converge et déterminons sa somme.

5 Condition nécessaire de convergence : $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. **La réciproque est fausse.** 

6 NB Pour que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, il faut que (u_n) tende vers 0 mais **cela ne suffit pas** comme le prouve la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$.

7 Définition : Lorsque la suite (u_n) ne tend pas vers 0 alors on dit que (S_n) est **grossièrement divergente**.

8 Exemple : pour quelles valeurs du réel a , la série $\sum_{n \geq 1} a^n (\ln(n+1) - \ln(n))$ diverge-t-elle grossièrement ?

II Opérations

9 Théorème : Soit une suite (u_n) de nombres complexes. On pose $a_n = \operatorname{Re}(u_n)$ et $b_n = \operatorname{Im}(u_n)$.

$$\sum_{n \geq 0} u_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} a_n \text{ et } \sum_{n \geq 0} b_n \text{ convergent.}$$

Et le cas échéant, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + i \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ i.e. $\operatorname{Re}(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n)$ et $\operatorname{Im}(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n)$.

10 Propriétés : Soit u et v deux suites complexes.

- Si u et v sont deux suites telles qu'à partir d'un certain rang, $u_n = v_n$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature. Par contre, leurs sommes, si elles existent, ne sont pas égales.
- $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} \overline{u_n}$ sont de même nature. Et le cas échéant, $\overline{\sum_{n=0}^{+\infty} u_n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{u_n}$.
- Soit $a \in \mathbb{C}^*$. Alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} a u_n$ sont de même nature et le cas échéant, $\sum_{n=0}^{+\infty} a u_n = a \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
- Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ convergent alors pour tous complexes a et b , alors $\sum_{n \geq 0} a u_n + b v_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a u_n + b v_n = a \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + b \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.
- Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge et $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} u_n + v_n$ diverge.

III Séries particulières

11 Séries géométriques (complexes ou réelles) : Soit $a \in \mathbb{C}$. La série de terme général a^n , $\sum a^n$, est dite série géométrique de raison a . La série géométrique $\sum a^n$ converge **si et seulement si** $|a| < 1$. Et si $|a| < 1$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$. 

12 Séries de Taylor (complexes ou réelles) : Soit f est de classe C^∞ sur un intervalle $[a, b]$ à valeurs complexes ou réelles.

Si $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe un réel M_n tel que, $\forall x \in [a, b]$, $|f^{(n)}(x)| \leq M_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n \frac{|b-a|^n}{n!} = 0$

alors la série de Taylor de terme général $\frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n = f(b)$.

13 Exemples : Soit a un réel. Justifier que les séries suivantes convergent et déterminer leur somme $\sum \frac{a^n}{n!}$, $\sum \frac{a^{2n}}{2n!}$ et $\sum \frac{(-1)^n a^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

14 Une série complexe (ou réelle) particulière : Pour tout complexe z , la série de terme général $\frac{z^n}{n!}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$.

15 Séries de Riemann (séries réelles). La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.



16 Deux séries de Riemann particulières déjà étudiées :

- $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge et $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n)$.
- $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge et $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

IV Séries réelles et à termes positifs

On considère une suite u réelle et pour tout entier naturel n , $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

**ou seulement à partir d'un certain rang

17 Prop : Si u est positive (**), alors

1. la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (**)
2. $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si et seulement si $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée
3. Et le cas échéant, $\forall n \in \mathbb{N}, S_n \leq \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$.



18 NB : si la suite (u_n) est négative à partir d'un certain rang, alors la suite $-u_n$ est positive et on pourra appliquer les résultats suivants à la série de terme général $-u_n$ puis en déduire la nature de la série de terme général u_n .

19 Théorème de comparaison (1): Soit u et v deux suites réelles telles que : $\forall n \in \mathbb{N}$ (**), $0 \leq u_n \leq v_n$.

1. $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
2. $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.



20 Exemples : Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \sin(e^{-n})$?

21 Théorème de comparaison (2): Soit u et v deux suites positives (**) telles que : $u_n = O(v_n)$ ou $u_n \sim v_n$ ou $u_n = o(v_n)$

1. $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
2. $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.



22 Exemples :

- 1) Montrons que la série de terme général $u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ est convergente.
- 2) Montrons que la série $\sum \frac{2^n}{1+t^2}$ diverge.
- 3) Pour quelles valeurs du réel a , la série $\sum_{n \geq 1} n^2 x^n$ converge-t-elle ?

23 En pratique : Le plus souvent, on compare u_n avec une suite géométrique réelle a^n ou une suite de Riemann $\frac{1}{n^\alpha}$

- $\forall n \geq n_0, u_n \geq 0$ et $u_n \underset{\text{ou } \sim}{=} o(a^n)$ avec $a \in]-1; 1[\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- $\forall n \geq n_0, u_n \geq 0$ et $u_n \underset{\text{ou } \sim}{=} o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- $\forall n \geq n_0, u_n \geq 0$ et $a^n \underset{\text{ou } \sim}{=} o(u_n)$ avec $a \geq 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ diverge grossièrement.
- $\forall n \geq n_0, u_n \geq 0$ et $\frac{1}{n^\alpha} \underset{\text{ou } \sim}{=} o(u_n)$ avec $\alpha \leq 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

24 Exemple : Etudier la nature des séries suivantes : $\sum_{n \geq 1} e^{-\sqrt{n}}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1+a^n}{n^2}$ où $a > 0$, $\sum_{n \geq 1} \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^3}$.


25 Théorème : Si la suite (u_n) est de signe constant (**) et $u_n \sim v_n$ alors les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature.

26 Exemples : Etudier la nature des séries suivantes $\sum_{n \geq 1} 1 - \cos\left(\frac{1}{na}\right)$ - où $a \in \mathbb{R}^+ -$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \ln(n) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$

V Comparaison série-intégrale

30 Théorème Soit f une fonction continue et décroissante et positive sur $[n_0, +\infty[$. Posons $I_n = \int_{n_0}^n f(t) dt$ et $S_n = \sum_{k=n_0}^n f(k)$

1. $\forall n \geq n_0, I_{n+1} \leq S_n \leq I_n + f(n_0)$.
2. la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ converge $\Leftrightarrow$ la suite (I_n) converge.



31 Exemples : Etude de la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n \ln(n)^\beta}$ où $\beta > 1$ et $\sum_{n \geq 3} \frac{1}{n \ln(n) \ln(\ln(n))}$.

32 Application à l'étude de la nature des Séries de Riemann

VI Séries absolument convergentes

33Définition : La série de terme général u_n est absolument convergente lorsque la série de terme général $|u_n|$ est convergente. On note alors $\sum_{n \geq 0} |u_n| < +\infty$.

34Théorème : Si la série de terme général u_n est absolument convergente alors la série de terme général u_n est convergente et $|\sum_{k=0}^{+\infty} u_k| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|$. 

35NB : la réciproque est fausse. Contre-exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} CV$ mais $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} DV$ donc $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ n'est pas absolument convergente.

36Exemples :

- 1) Etudier la nature des séries $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi \sqrt[3]{n^3 + 1})$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(n)}{\frac{11}{n^{10}} + \cos(n)}$.
- 2) Montrer que $\varphi: ((P, Q) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} P(n)Q(n)e^{-n})$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

VII Lien suite- serie. Séries télescopiques.

27Prop : La suite (u_n) converge si et seulement si la série de terme général $u_{n+1} - u_n$ converge. 

28Exemples : Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n!}{\prod_{k=0}^n (\alpha + k)}$.

1. Montrer que la suite u converge. On note ℓ sa limite.
2. Montrer que si $\ell \neq 0$ alors $u_{n+1} - u_n \sim \frac{-\alpha \ell}{n}$.
3. En déduire que $\ell = 0$.

29Séries télescopiques

Exemples Calculer les sommes suivantes après avoir justifié de leur existence ($x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$)

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{1+n+n^2}\right), S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n-1}{n^2+3n^2+2n}, S = \sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(\frac{(n-1)(n+1)^3}{n^4+2n^3}\right), S = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \operatorname{th}(2^{-n}x), S(p) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{n+p}{n}}.$$