Ex 1

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} e^{1-\frac{1}{x}} & \text{si } x \in]0,1[\\ ax^2 + bx + 1 & \text{si } x \in]1,2[\\ 2 \frac{x^3+3x^2-16x+12}{x^2-4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Justifier que f est au moins continue et dérivable sur $]0,1[\cup]1,2[\cup]2, +\infty[$.

Posons :

$$\forall x \in]0,1[, \alpha(x) = \sqrt{x} e^{1-\frac{1}{x}}$$

$$\forall x \in]1,2[, \beta(x) = ax^2 + bx + 1$$

$$\forall x \in]2, +\infty[, \delta(x) = 2 \frac{x^3+3x^2-16x+12}{x^2-4} = 2 \frac{(x-2)(x^2+5x-6)}{(x-2)(x+2)} = 2 \frac{x^2+5x-6}{x+2} \stackrel{\text{division euclidienne de } x^2+5x-6 \text{ par } x+2}{=} 2 \frac{(x+2)(x+3)-12}{x+2} = 2(x+3) - \frac{24}{x+2}$$

f et α coïncident sur l'intervalle ouvert $]0,1[$. Comme α est de classe C^∞ sur $]0,1[$ car $(x \mapsto \sqrt{x})$ et $(x \mapsto e^{1-\frac{1}{x}})$ le sont, f est de classe C^∞ sur $]0,1[$ et $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in]0,1[, f^{(k)}(x) = \alpha^{(k)}(x)$ et en particulier, $f'(x) = \alpha'(x) = e \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \frac{1}{x^2} \right] e^{-\frac{1}{x}}$.

Idem sur $]1,2[$ et sur $]2, +\infty[$. Et, $\forall x \in]1,2[, f'(x) = \beta'(x) = 2ax + b$ et $\forall x \in]2, +\infty[, f'(x) = \delta'(x) = 2 + \frac{24}{(x+2)^2}$.

2. f est-elle prolongeable par continuité en 0 ? Si oui, son prolongement est-il dérivable en 0 ?

$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} e^{1-\frac{1}{x}} = 0$. Donc f est prolongeable par continuité en 0 par la valeur 0. Posons $\tilde{f}: (x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ f(x) & \text{si } x > 0 \end{cases})$ est donc continue en 0 et

dérivable sur $]0,1[$ et $\forall x \in]0,1[, \tilde{f}'(x) = f'(x) = e \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \frac{1}{x^2} \right] e^{-\frac{1}{x}}$. De plus, $e \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \frac{1}{x^2} \right] e^{-\frac{1}{x}} = \frac{e}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\frac{3}{2}} + e \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\frac{3}{2}}$. Et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\forall \alpha \in$

$\mathbb{R}^{++}, \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^\alpha}{e^t} \stackrel{cc}{=} 0$. Donc par composition, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\frac{3}{2}} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}}$. J'en déduis que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tilde{f}'(x) = 0$. Alors le critère de dérivabilité permet de conclure que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x - 0} = 0$. J'en conclus que $\tilde{f}$ est dérivable en 0 et $\tilde{f}'(0) = 0$.

3. Déterminer une relation entre a et b pour que : f soit continue en 1.

f est continue en 1 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{x} e^{1-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} ax^2 + bx + 1 = f(1)$.

Or, $f(1) = \sqrt{1} e^{1-\frac{1}{1}} = 1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{x} e^{1-\frac{1}{x}}$. Et, $\lim_{x \rightarrow 1^+} ax^2 + bx + 1 = a + b + 1$.

Par conséquent, f est continue en 1 $\Leftrightarrow a + b + 1 = 1 \Leftrightarrow b = -a$.

4. Montrer que f est dérivable en 1 si et seulement si $\begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$.

f est dérivable en 1 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ existe et est finie $\Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \text{ existent, sont finies et égales} \\ b = -a \end{cases}$

Prenons $b = -a$ (puisque c'est une condition nécessaire pour que f soit dérivable en 1). Etudions $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.

Alors f est continue en 1 et dérivable au moins sur $]0,1[$ et $\forall x \in]0,1[, f'(x) = e \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \frac{1}{x^2} \right] e^{-\frac{1}{x}}$. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{e^{\frac{1}{2}+1}}{e} = \frac{3}{2}$. Alors le critère de dérivabilité permet de conclure que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{3}{2}$.

De même, f est continue en 1 et dérivable au moins sur $]1,2[$ et $\forall x \in]1,2[, f'(x) = 2ax + b = 2ax - a$. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = a$. Alors le critère de dérivabilité permet de conclure que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = a$.

J'en conclus que : f est dérivable en 1 $\Leftrightarrow \begin{cases} b = -a \\ a = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$

Désormais $\begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$ et $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} e^{1-\frac{1}{x}} & \text{si } x \in]0,1[\\ \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1 & \text{si } x \in]1,2[\\ 2(x+3) - \frac{24}{x+2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$. L'équation de la tangente à C_f en 1 est $y = \frac{3}{2}(x-1) + 1 = \frac{1}{2}(3x-1)$.

5. Montrer que f est continue en 2.

f est continue en 2 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1 = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2(x+3) - \frac{24}{x+2} = f(2)$.

$f(2) = \frac{3}{2} \cdot 4 - \frac{3}{2} \cdot 2 + 1 = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1$. Et $\lim_{x \rightarrow 2^+} 2(x+3) - \frac{24}{x+2} = 10 - 6 = 4$. Ainsi, f est continue en 2.

6. f est-elle dérivable en 2 ?

f est dérivable en 1 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$ existe et est finie $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$ existent, sont finies et égales.

D'une part, f est continue en 2 et dérivable au moins sur $]2, +\infty[$ et $\forall x \in]2, +\infty[, f'(x) = 2 + \frac{24}{(x+2)^2}$. Donc, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 5$. Par conséquent, $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = 5$.

D'autre part, f est continue en 2 et dérivable au moins sur $]1, 2[$ et $\forall x \in]1, 2[, f'(x) = 3x - \frac{3}{2}$. Donc, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \frac{9}{2}$. Par conséquent, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{9}{2}$. Comme $\frac{9}{2} \neq 5$, j'en conclus que f n'est pas dérivable en 2. Par contre f est dérivable à droite et à gauche en 2 et $f'_d(2) = 5$ et $f'_g(2) = \frac{9}{2}$. Cf a donc deux demi-tangentes au point $A(2,4)$ de pente 5 à droite et $\frac{9}{2}$ à gauche.

7. Quelle est la limite de f en $+\infty$?

$\forall x \in]2, +\infty[, f(x) = \delta(x) = 2(x+3) - \frac{24}{x+2}$. Donc, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2(x+3) - \frac{24}{x+2} = +\infty$.

8. Montrer que Cf a une asymptote oblique en $+\infty$ et déterminer son équation.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2(x+3) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{24}{x+2} = 0$. Donc, la droite d'équation $y = 2x + 6$ est asymptote à Cf en $+\infty$.

9. Etudier les variations de f .

$\forall x \in]0, 1[, f'(x) = e^{\left[\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\frac{1}{x^2}\right]} e^{-\frac{1}{x}} > 0$, $\forall x \in]1, 2[, f'(x) = 3x - \frac{3}{2} > 0$ et $\forall x \in]2, +\infty[, f'(x) = 2 + \frac{24}{(x+2)^2} > 0$.

Par conséquent, f est strictement croissante sur chaque intervalle $]0, 1[,]1, 2[$ et $]2, +\infty[$. Comme, de plus, f est continue en 1 et en 2, f est strictement croissante sur $Df =]0, +\infty[$.

10. a) Justifier que f est bijective de Df sur Df

b) Montrer que f^{-1} est dérivable sur $Df \setminus \{4\}$. Calculer $(f^{-1})'(10)$.

c) Que dire de Cf^{-1} au point $B(4,2)$?

a) Comme f est continue et strictement croissante sur Df , le TBCSM assure que $f(Df) =]\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[=]0, +\infty[$ et f est bijective de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

$$b) \text{ De plus, } f \text{ est dérivable sur } Df \setminus \{2\} \text{ et } \forall x \in Df \setminus \{2\}, f'(x) = \begin{cases} e^{\left[\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\frac{1}{x^2}\right]} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x \in]0, 1[\\ \frac{3}{2} & \text{si } x = 1 \\ 3x - \frac{3}{2} & \text{si } x \in]1, 2[\\ 2 + \frac{24}{(x+2)^2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Donc, $\forall x \in Df \setminus \{2\}, f'(x) > 0$. Alors le TDBR assure que f^{-1} est dérivable sur $f(Df \setminus \{2\}) = Df \setminus \{4\}$. En particulier f^{-1} est dérivable en 10 et $(f^{-1})'(10) = \frac{1}{f'(f^{-1}(10))}$. D'après les variations de f , $f^{-1}(10)$, l'unique antécédent de 10 par f se trouve dans $]2, +\infty[$ et est donc le réel a tel que :

$$\begin{cases} a > 2 \\ f(a) = 10 \end{cases} \text{ i.e. } \begin{cases} a > 2 \\ 2(a+3) - \frac{24}{a+2} = 10 \end{cases} \text{ Or, } 2(a+3) - \frac{24}{a+2} = 10 \Leftrightarrow (2a+6)(a+2) - 24 - 10(a+2) = 0 \Leftrightarrow 2a^2 - 32 = 0 \Leftrightarrow a = \pm 4.$$

Donc, $a = 4$. Ainsi, $f^{-1}(10) = 4$ et $(f^{-1})'(10) = \frac{1}{f'(4)} = \frac{1}{2 + \frac{24}{(4+2)^2}} = \frac{1}{2 + \frac{24}{36}} = \frac{1}{2 + \frac{2}{3}} = \frac{3}{8}$.

c) Le point $A(2,4)$ est un point anguleux de Cf avec deux demi-tangentes de pentes $\frac{9}{2}$ et 5. Donc par symétrie entre Cf et Cf^{-1} , je peux affirmer que le point $B(4,2)$ est un point anguleux de Cf^{-1} avec deux demi-tangentes de pentes $\frac{2}{9}$ et $\frac{1}{5}$.

11. Représenter Cf : on s'appliquera à préciser la courbe au voisinage des points d'abscisses 1 et 2 et on donnera une allure très grossière sur $]0,1[$.