

✏️ Thème II. Mouvements et interactions (Mécanique) TD n°16 Mouvement d'un solide

Exercice n°	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacités								
Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.				✏️				
Exploiter, pour un solide, la relation entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d'inertie fourni.	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️
Relier qualitativement le moment d'inertie à la répartition des masses.							✏️	
Définir une liaison pivot et justifier le moment qu'elle peut produire.		✏️						
Exploiter le théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️	✏️
Pendule pesant : Établir l'équation du mouvement. Établir l'intégrale première du mouvement.	✏️	✏️				✏️		✏️
Pendule de torsion : Établir l'équation du mouvement. Établir l'intégrale première du mouvement.					✏️			
Utiliser l'expression de l'énergie cinétique, l'expression du moment d'inertie étant fournie.							✏️	
Prendre en compte le travail des forces intérieures pour un système déformable.							✏️	

Parcours possibles

- ☁ Si vous avez des difficultés sur ce chapitre : exercices n°1, 2 et 3.
- 🌤 Si vous vous sentez moyennement à l'aise, mais pas en difficulté : exercices n°3, 4, 5 (sauf Q4).
- ☀ Si vous êtes à l'aise : exercices n°5, 6, 7.


I Exercices d'application directe du cours

Exercice n°1 Hand-spinner

La mesure du moment d'inertie J_{Oz} d'une pièce complexe équilibrée peut s'effectuer en rajoutant une masselotte m à une distance a de l'axe.

Le moment d'inertie est alors : $J'_{Oz} = J_{Oz} + ma^2$.



On considère le jeu pour enfant ci-contre auquel une masse m est ajoutée à une extrémité M .



- Q1. Écrire le moment cinétique de l'ensemble selon l'axe Oz .
- Q2. Effectuer un bilan des actions mécaniques agissant sur l'ensemble.
- Q3. En appliquant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle du mouvement.
- Q4. Exprimer la période propre T_0 des petites oscillations.
En déduire l'expression du moment d'inertie J_{Oz} en fonction de T_0 , m , g et a .
- Q5. On mesure une période $T_0 = 0,82$ s pour une masse $m = 3,0$ g accrochée à une distance $a = 3,5$ cm, déterminer J_{Oz} .

Exercice n°2 Métronome

Un métronome est constitué de deux masses accrochées à une tige de masse négligeable pouvant tourner autour d'une liaison parfaite d'axe Oz . La masse inférieure de masse M et de rayon R est fixe et située à une distance L de l'axe Oz . La masse supérieure, notée m , est mobile et peut être accrochée à différents points d'abscisse x . Elle est considérée comme ponctuelle.



On note $J = \frac{MR^2}{4} + ML^2$ le moment d'inertie du disque par rapport à Oz .

Le but est de comprendre l'origine de la graduation non linéaire présente sur les métronomes.

- Q1. Déterminer le moment cinétique de l'ensemble¹ selon l'axe Oz .
- Q2. Effectuer un bilan des actions mécaniques agissant sur l'ensemble des deux masses et de la tige.
- Q3. En appliquant le théorème du moment cinétique, exprimer la période T_0 des petites oscillations en fonction de la position x de la masse supérieure.
- Q4. Pourquoi pour augmenter la fréquence d'oscillation d'une même quantité, le déplacement de la masselotte n'est pas toujours le même ?

Exercice n°3 Démarrage d'un moteur

On étudie la phase de mise en rotation du rotor S (partie tournante) d'un moteur de robotique dans le référentiel terrestre. Le rotor S , de moment d'inertie $J = 10,7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ est soumis à un couple moteur C_m dont la valeur est proportionnelle à l'intensité du courant i traversant le stator (partie fixe) du moteur : $C_m = ki$, avec $k = 22 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{A}$. Le courant i est constant : $i = I_0 = 0,10 \text{ A}$. On suppose que le centre de masse G du rotor est sur l'axe de rotation Δ . Dans un premier temps, on néglige tous les frottements.

- Q1. En utilisant le théorème du moment cinétique, écrire l'équation donnant la vitesse angulaire $\omega(t)$ de S .
- Q2. La résoudre en supposant qu'au départ S est au repos.
- Q3. Déterminer et calculer le temps T_0 mis pour atteindre la vitesse $\omega_0 = 1800 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

En réalité, le rotor S est soumis à un couple de frottement sec $C_s = -400 \mu\text{N} \cdot \text{m}$ et à un couple de frottement fluide $C_f = -\lambda\omega$, avec $\lambda = 1,0 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$, tous deux s'opposant au mouvement.

- Q4. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse angulaire $\omega(t)$.
- Q5. Quelle est la vitesse angulaire maximale que pourra atteindre le moteur ?
- Q6. Déterminer le temps T mis pour atteindre le régime permanent (à 5%). Conclure.


Exercice n°4 Monter un mur

On utilise une grue pour dresser un mur en béton préfabriqué à la verticale. Le mur est initialement posé sur le sol ($\theta = 0$). La grue le soulève en exerçant une force \vec{F} toujours verticale appliquée en A . Le mur pivote alors autour de l'axe (Oy) fixe.

Le mur est de hauteur $H = OA = 3,0 \text{ m}$, de masse $m = 5,0 \cdot 10^3 \text{ kg}$ et son centre de masse G se situe à $OG = a = 1,2 \text{ m}$ de la base. Le moment d'inertie du mur par rapport à l'axe (Oy) est $J = 2,8 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

On néglige tous les frottements.

- Q1. Faire un bilan des actions mécaniques exercées sur le mur.
- Q2. Appliquer le théorème du moment cinétique au mur par rapport à l'axe Oy .
En déduire l'équation différentielle vérifiée par θ .
- Q3. Le mur pivote autour de sa base (Oy) avec une vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega_0 = 0,20 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ constante.
Déterminer et calculer la norme de la force \vec{F} exercée par la grue.
- Q4. Exprimer la puissance de la force \vec{F} puis le travail W effectué par la grue pour dresser le mur à la verticale.
Calculer W .



1. Indice : c'est la somme du moment cinétique de la masse m , ponctuelle (=point matériel), et du disque dont on donne le moment d'inertie dans l'énoncé.


II Exercices d'approfondissement

Exercice n°5 Pendule de torsion

Un pendule est formé d'une tige AB de longueur ℓ , de masse m et de moment d'inertie $J = \frac{1}{3}m\ell^2$ par rapport à l'axe Bx .

La tige est fixée en B par un ressort de torsion de couple de rappel $\mathcal{M}_{Bx} = -k\theta$.

On néglige les frottements.



Q1. Déterminer l'unité de la constante k .

Q2. Établir l'équation du mouvement de la tige grâce au théorème du moment cinétique.


Q3. En déduire l'équation du mouvement dans le cas des petits angles.

À quelle condition, portant sur m , ℓ , k et g , l'équation différentielle précédente est celle d'un oscillateur harmonique ?


Q4. Hors du cas particulier des petits angles, déterminer les positions d'équilibre possible pour $\theta \in [-\pi, \pi[$. Faire une résolution graphique.

À quelle condition existe-t-il trois positions d'équilibre ?

Exercice n°6 Chute d'un téléphone



À l'instant $t = 0$



À l'instant $t > 0$

Un matin, peu réveillé, vous posez votre téléphone en équilibre sur la table de la cuisine. Vous ne pouvez l'empêcher de chuter.

Le fin portable a une longueur $2L = 15$ cm et une masse $m = 170$ g.

Il est posé initialement sur la table comme indiqué sur la figure de gauche et il peut pivoter autour de l'arête Oz avant de tomber par terre. La distance OG est notée a avec $a = 2,0$ cm.

Le moment d'inertie J du portable par rapport à l'axe de rotation Oz vaut $J = 4,0 \cdot 10^{-4}$ kg · m².

Nous noterons la force de contact $\vec{R} = R_r \vec{u}_r + R_\theta \vec{u}_\theta$. Le glissement de frottement du portable sur l'arête de la table obéit aux lois de Coulomb avec un coefficient de frottement $f = 0,20$. Ainsi, le portable ne glisse pas sur l'arête tant que $|R_r| < f|R_\theta|$.

Nous négligeons tout frottement fluide.

Q1. Expliquer brièvement pourquoi la position initiale du portable n'est pas une position d'équilibre.

Q2. Nous nous intéressons à la première phase du mouvement au cours de laquelle le téléphone pivote sans glisser sur l'arête. Faire un bilan des forces exercées sur le téléphone.

Q3. Appliquer le théorème du moment cinétique au portable par rapport à l'axe Oz . En déduire l'équation différentielle vérifiée par θ .

Q4. Appliquer la loi de l'énergie cinétique au portable. En déduire une intégrale première du mouvement.

Q5. Appliquer la loi de la quantité de mouvement au portable. En déduire des expressions de R_r et R_θ en fonction de θ et des données de l'exercice.

Q6. Déterminer l'angle θ_0 à partir duquel le téléphone commence à glisser sur l'arête.

Q7. À partir de cet instant pris comme origine des temps, le téléphone quitte la table en un temps très bref, conservant quasiment la même orientation θ_0 et la même vitesse angulaire ω_0 .

Quel est, après avoir quitté la table, la loi d'évolution de la position selon la verticale ($x_G(t)$), où G est le barycentre du téléphone, en supposant que la tartine ne retouche plus la table ?

- Q8. Déterminer le temps τ pour lequel le téléphone touche le sol. On considère que la hauteur h de la table est nettement supérieure aux dimensions du téléphone et que la vitesse initiale du téléphone est très faible devant sa vitesse finale.
- Q9. On admet que pendant le vol, la vitesse angulaire du téléphone reste constante, égale à ω_0 .
Quelle est son expression ? En déduire $\theta(\tau)$.
A.N. pour $h = 70$ cm.
- Q10. De quel côté tombe le téléphone, si on suppose qu'il n'y a pas de rebond ?

Exercice n°7 Mouvement de salsa

Maria est danseuse de salsa. Lors des tours en pivot, elle tourne autour de son axe Gz vertical en donnant une petite impulsion à l'aide de son pied gauche, l'appui se faisant sur son pied droit. La position de ses bras lui permet de modifier sa vitesse de rotation ω . G est le centre de masse de Maria.

L'appui au sol s'accompagne d'un couple de frottement de moment C_f par rapport à l'axe Gz que nous supposons constant. Nous négligeons tout frottement fluide.

L'impulsion donne à Maria une vitesse angulaire initiale $\omega_0 = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Ses bras sont tendus de sorte que son moment d'inertie par rapport à son axe de rotation Gz est $J_1 = 2,4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Elle réalise alors juste un tour avant de s'arrêter.

- Q1. Déterminer la valeur du couple C_f .
- Q2. Quelle énergie a été dissipée dans les frottements au cours de son tour ?

Maria prend maintenant la même impulsion lui conférant la vitesse angulaire ω_0 puis replie presque instantanément ses bras de sorte que son moment d'inertie par rapport à Gz devient $J_2 = 0,80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

- Q3. Quelle vitesse angulaire ω'_0 possède Maria après avoir replié ses bras ? Combien de tours réalise-t-elle alors avant de s'arrêter ?

III Résolution de problème

Exercice n°8 Vitesse d'un marcheur

Retrouver, en fonction des dimensions de votre corps, l'ordre de grandeur de la vitesse de marche naturelle.

Donnée : le moment d'inertie d'une tige rectiligne, homogène, de masse m et longueur ℓ par rapport à une de ses extrémité vaut $J = \frac{1}{3}m\ell^2$.