Différence entre $\mathbb{R}$ -ev et $\mathbb{C}$ -ev

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, déterminer si les ensembles suivants sont des $\mathbb{K}$ -espaces-vectoriels :

1. $\{(x, y, z) \in \mathbb{K}^3 \text{ tel que } 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz + 2yz = 0\}$.
2. $\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \text{ tel que } \forall x \in \mathbb{R}, f(x^2) = f(x) - f(2-x)\}$.
3. $\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \text{ tel que } \bar{z}_1 + z_2 = 0\}$.

1. On commence par réécrire $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz + 2yz = (x + y + z)^2 + (x^2 + y^2 - 2xy) = (x + y + z)^2 + (x - y)^2$.

Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on a $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz + 2yz = 0$ ssi $(x + y + z = 0 \text{ et } x - y = 0)$ ssi $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ -2x \end{pmatrix}$. Donc cet ensemble est l'espace vectoriel engendré $\text{Vect}_{\mathbb{R}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.

Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on a $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz + 2yz = [(x + y + z) + i(x - y)][(x + y + z) - i(x - y)] = 0$ ssi $((x + y + z) + i(x - y) = 0 \text{ ou } (x + y + z) - i(x - y) = 0)$. Donc cet ensemble est l'union de deux espaces vectoriels donc ce n'est pas un $\mathbb{C}$ -ev. Plus précisément, $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}$ et $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs vérifiant la condition. Pourtant $u_1 + u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ne vérifie pas la condition.

2. Dans les deux cas, l'ensemble est un $\mathbb{K}$ -ev.

Non vide car $f_0 : x \mapsto 0$ vérifie $f_0(x^2) = f_0(x) - f_0(2-x)$.

Stable par CL Soit $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ vérifiant la condition. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $(f_1 + \lambda f_2)(x^2) = f_1(x^2) + \lambda f_2(x^2) = f_1(x) - f_1(2-x) + \lambda[f_2(x) - f_2(2-x)] = (f_1 + \lambda f_2)(x) - (f_1 + \lambda f_2)(2-x)$. Donc $(f_1 + \lambda f_2)$ vérifie également la condition.

3. Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on a $\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \text{ tel que } \bar{z}_1 + z_2 = 0\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 + iy_1 \\ x_2 + iy_2 \end{pmatrix} \text{ tel que } x_1 - iy_1 + x_2 + iy_2 = 0 \right\}$

Donc la condition devient $x_1 + x_2 = 0$ et $y_1 - y_2 = 0$. Puis $u = \begin{pmatrix} x_1 + iy_1 \\ -x_1 + iy_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + y_1 \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix}$. Donc cet ensemble est l'espace vectoriel engendré $\text{Vect}_{\mathbb{R}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} \right\}$.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ alors on a vu que $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est dans cet ensemble. Pourtant $iu = \begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix}$ n'est pas dans l'ensemble. Donc ce n'est pas un $\mathbb{C}$ -ev.

Polynôme de Tchebychev

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $T_n \in \mathbb{R}_n[X]$ vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}, T_n(\cos x) = \cos(nx)$.
Montrer que $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Il existe plusieurs méthodes classiques de construction des polynômes de Tchebychev.

Méthode par récurrence double.

On introduit $T_0 = 1$ et $T_1 = X$ de sorte que $T_0(\cos x) = \cos 0$ et $T_1(\cos x) = \cos x$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose connue T_n et T_{n+1} vérifiant la relation. On a $\cos[(n+2)x] = \cos x \cos[(n+1)x] - \sin x \sin[(n+1)x]$ et $\cos[nx] = \cos x \cos[(n+1)x] + \sin x \sin[(n+1)x]$. Donc en sommant, on trouve $\cos[(n+2)x] + \cos[nx] = 2 \cos x \cos[(n+1)x]$. Ainsi $\cos[(n+2)x] = 2 \cos x T_{n+1}(\cos x) - T_n(\cos x) = T_{n+2}(\cos x)$ en posant $T_{n+2}(X) = 2XT_{n+1}(X) - T_n(X)$ un polynôme.

Méthode par passage au complexe.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $\cos(nx) = \text{Re}(\cos x + i \sin x)^n$
 $= \text{Re} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k}(x) (i \sin x)^k \right)$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} \cos^{n-k}(x) i^k \sin^k x \\
&= \sum_{l=0}^{n/2} \binom{n}{2l} \cos^{n-2l}(x) (-1)^l (1 - \cos^2 x)^l = T_n(\cos x).
\end{aligned}$$

En posant $T_n(X) = \sum_{l=0}^{n/2} \binom{n}{2l} X^{n-2l} (X^2 - 1)^l$ un polynôme.

Dans les deux cas, on peut obtenir que $\deg T_n = n$. Le coefficient dominant est 2^{n-1} pour $n \geq 1$.

Donc la famille $\mathcal{F} = (T_0, T_1, \dots, T_n)$ est libre car échelonnée en degré.

Ainsi c'est une base car $\text{Card} \mathcal{F} = n + 1 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}_n[X])$.