Exercices : Chapitre 18 - Applications linéaires

♥ A savoir refaire - ♦ Eléments de correction en ligne

Exemples d'applications linéaires

♥ **18.1** Dire si $f : E \to F$ est linéaire dans les cas suivants :

a. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}^3$ et $f:(x,y) \mapsto (x + y, x - 2y, 0)$

b. $E = F = \mathbb{R}^3$ et $f:(x,y,z) \mapsto (x^2 + x, y - z, x + y - z)$

c. $E = F = \mathbb{R}^2$ et $f:(x,y) \mapsto (1, x - 2y)$

d. $E = \mathbb{R}^3$, $F = \mathbb{R}$ et $f:(x,y,z) \mapsto x - y + z$

e. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}$ et $f:(x,y) \mapsto xy$

f. $E = f = \mathbb{C}[X]$ et $f:P \mapsto P + (X^2+1)P'$

g. $E \mathbb{R}[X]$, $F = \mathbb{R}$ et $f : P \mapsto P(a)$ avec a réel fixé.

h. $E = \mathbb{C}$, $F = \mathbb{R}$ et $f:z \mapsto Re(z)$

i. $E = \{\text{suites réelles convergentes}\}$, $F = \mathbb{R}$ et $f : (u_n) \mapsto \lim u_n$

♦ **18.2** On considère les applications linéaires suivantes :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) \mapsto (x+2y, y, y+z) \end{cases}, \quad g : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \\ (x,y,z) \mapsto x+y+z \end{cases}, \quad h : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \\ (x,y) \mapsto (x+y, x-y) \end{cases}.$$

a. Préciser lesquelles sont des endomorphismes, des formes linéaires.

b. Déterminer $g \circ f$. Quelle est sa nature ?

c. Montrer que f est un automorphisme et expliciter f^{-1}.

d. Déterminer $h^2 = h \circ h$, puis $h^n = h \circ h \circ ... \circ h$ où $n \in \mathbb{N}$.

♥ **18.3** Les applications suivantes sont linéaires, pour chacune, déterminer Kerf et Imf et dire ce que l'on peut en déduire.

a. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}^3$ et $f:(x,y) \mapsto (x + y, x - y, x + y)$

b. $E = F = \mathbb{R}^3$ et $f(x,y,z) = (2x - y + 2z, x - 3y - z, 4x - 7y)$

c. $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$, $F = \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et $f:u \mapsto u'$

d. $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$, $F = \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(u)(x) = \int_0^x u(t)dt$

18.4 Déterminer unique application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ telle que
$f(1, 0, 0) = (1, 1)$, $f(0, 0, 1) = (-1, 0)$ et $f(1, 1, 1) = (0, 2)$. Donner une base de Ker f et Im f.

♥ **18.5** ***Trace d'une matrice carrée*** Soit M une matrice carrée on appelle trace de M et on note Tr(M) la somme de ses éléments diagonaux.

a. Montrer que $M \mapsto Tr(M)$ est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

b. Justifier que $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) | Tr(M) = 0\}$ est une SEV de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

c. Montrer que $\forall M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $Tr(MN) = Tr(NM)$

d. Existe-t-il un couple de matrices carrées (A,B) tel que $AB - BA = I_n$?

♥ **18.6** Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et φ définie sur E par $\varphi(P) = (X^2-X-1)P'-(2X-1)P$.

a. Justifier que φ est un endomorphisme de E.

b. Donner une base de $Ker(\varphi)$ et $Im(\varphi)$

♦ **18.7** ***Dérivation discrète***

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X] \\ P \mapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}$. Montrer que f est un endomorphisme et déterminer Ker f.

Endomorphismes d'un espace vectoriel :

Rappel: *Dans $\mathcal{L}(E)$ on note $f^n = f \circ f \circ ... \circ f$ (f itérée n fois)*

♥ **18.8**. Démontrer que pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$.

$Ker f = Ker f^2 \Leftrightarrow Im f \cap Ker f = \{\vec{0}_E\}$ et $Im f = Im f^2 \Leftrightarrow E = Im f + Ker f$.

18.9 Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 2Id_E = 0$

a. Justifier que $f \in GL(E)$ et préciser f^{-1}.

b. Démontrer que $Ker(f - Id_E)$ et $Ker(f - 2Id_E)$ sont des SEV supplémentaires de E.

♥ **18.10** Soit f et g deux endomorphismes qui commutent dans $\mathcal{L}(E)$.

Montrer que $f(Ker\ g) \subset Ker\ g$ et que $f(Im\ g) \subset Im\ g$

On dit que Ker g et Im g sont stables par f.

♦ **18.11** Soit f et g deux endomorphismes de $\mathcal{E}$ vérifiant $f \circ g = Id_E$.

a. Montrer que $Ker(g \circ f) = Ker f$ et $Im(g \circ f) = Im g$.

b. Montrer que Kerf et Img sont supplémentaires dans E.

c. A quelle condition sur f peut-on affirmer que f et $g \in GL(E)$ et $g = f^{-1}$?

18.12 Soit f un endomorphisme de E tel que pour tout x de E, x et f(x) sont colinéaires c'est à tel que $\forall x \in E, \exists \lambda_x, f(x) = \lambda_x.x$

a. Soit x et y deux vecteurs de E non nuls et colinéaires, montrer que $f(y) = \lambda_x.y$

b. Etablir cette égalité dans le cas où (x, y) est libre.

c. Montrer que f est une homothétie.

18.13 On note $0_{\mathcal{L}(E)}$ l'endomorphisme nul de $\mathcal{L}(E)$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^5 = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Montrer que $g = Id_E - f$ et $h = Id_E + f \in GL(E)$ et exprimer g^{-1} et h^{-1} en fonction de f^k, $k \in \mathbb{N}$.

Projecteurs et symétries

♥ **18.14** Soit $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + 3z = 0 \}$ et $G = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y - z = 0 \text{ et } 2x + z = 0 \}$

a. Démontrer que $E = F \oplus G$.

b. Soit f la projection sur F parallèlement à G déterminer f(1, 2, 0), puis f(x, y, z)

c. Donner l'expression de la symétrie par rapport à G parallèlement à F.

18.15 On a vu que $F = \{ f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}), \int_0^1 f(t)dt = 0 \}$, G le SEV des fonctions constantes sur $\mathbb{R}$ étaient supplémentaires dans $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ (exercice 16.8)

Déterminer la projection de la fonction exponentielle sur F parallèlement à G.

♦ **18.16** Dans $\mathbb{R}^2$ on note $D_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x = 3y\}$ et $D_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x + y = 0\}$

a. Montrer que $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$

b. Donner l'expression de la symétrie par rapport à D_1 parallèlement à D_2.

♥ **18.17** Soit $E = \mathbb{K}[X]$, on considère l'application f qui à tout polynôme P associe son reste dans la division euclidienne par $X^2 + 1$.

Montrer que f est un projecteur de E puis déterminer Ker f et Im f.

♥ **18.18** Soit $p: \begin{cases} \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) \mapsto (\frac{x-z}{2}, 0, \frac{-x+z}{2}) \end{cases}$, on note $I_3 = Id_E$ avec $E = \mathbb{R}^3$.

a. Montrer que p est un projecteur et donner ses éléments caractéristiques.

b. On pose $q = I_3 - p$, déterminer $p \circ q$ et $q \circ p$

c. On donne $g = p + 2I_3$. Exprimer $g^n = g \circ g \circ ... \circ g$ en fonction de p et q pour tout entier $n \geq 1$.

♦ **18.19** Soient f et g deux éléments de $\mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$(f \circ g = f \text{ et } g \circ f = g) \Leftrightarrow$ (f et g sont deux projecteurs de même noyau)

Applications linéaires en dimension finie

♥ **18.20** On donne f: $\begin{cases}\mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3 \\ (x,y,z) \mapsto (3x-y+z, x-3y-z, x+5y+3z)\end{cases}$

Déterminer le rang de f et préciser une base de Ker f et de Im f.
Que peut-on en déduire concernant f ?

♥ **18.21** Soit f: $\mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$ définie par : $\forall P \in \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = (1+X^2)P(2) + (X+1)P'(1)$
Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ et déterminer son rang.

♥ **18.22** Soit (e_1, e_2, e_3) une base de E espace vectoriel de dimension 3.
Soit f l'unique endomorphisme de E vérifiant : $f(e_1) = e_2 - e_3$, $f(e_2) = e_3 - e_1$ et $f(e_3) = e_1 - e_2$.
a. Déterminer le rang de f.
b. Montrer que Ker f et Im f sont supplémentaires.

18.23 ***Etude d'un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$***
Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et f: $\mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$ qui, à tout polynôme P associe le polynôme Q défini par :

$$Q(X) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X).$$

a. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$. Déterminer son noyau, son rang et son image.
b. Soit $Q \in$ Im f. Prouver que Q admet par f un unique antécédent P tel que $P(0) = P'(0) = 0$.

♦ **18.24** Soit f un endomorphisme de E de dimension finie n.
Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes:
(i) Im f et Ker f sont supplémentaires dans E (ii) Im f^2 = Im f (iii) Ker f = Ker f^2

18.25 Quelques résultats sur les endomorphismes nilpotents
Soit E un espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme nilpotent de E d'ordre p, $p \geq 2$.
a. Dans cette question, n= 3 et p = 2, déterminer le rang de f.
b. Dans cette question n = p =3, justifier qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $f^2(x_0) \neq 0$ et $(x_0, f(x_0), f^2(x_0))$ est une base de E
c. Soit x_0 tel que $f^{p-1}(x_0) \neq 0$. Montrer que $(x_0, f(x_0), \ldots f^{p-1}(x_0))$ est libre dans E.
Comparer p et n.

♦ **18.26** Soit E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies et $(f,g) \in (\mathcal{L}(E,F))^2$.
a. Montrer que : $|rg\, f - rg\, g| \leq rg(f+g) \leq rg\, f + rg\, g$.
b. Montrer que : $rg(f+g) = rg\, f + rg\, g \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Im } f \cap \text{Im } g = \{0\} \\ \text{Ker } f + \ker g = E \end{cases}$

Résolution d'une équation linéaire

♦ **18.27** Soit $f: \begin{cases}\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ u \mapsto v \text{ telle que } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n\end{cases}$.
a. Montrer que f est linéaire et déterminer Ker f
b. Déterminer les suites réelles vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n + n + 1$