

Exercices : Chapitre 15 - Espaces Vectoriels

♥ A savoir refaire - ♦ Éléments de correction en ligne

Sous-espaces Vectoriels♥ 15.1 Démontrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E .

- a. $A = \{ (x, x, y) \in \mathbb{R}^3, x, y \in \mathbb{R} \}$ dans $E = \mathbb{R}^3$.
- b. $B = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 2y = 0 \}$ dans $E = \mathbb{R}^3$.
- c. $D = \{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \}$ dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- d. $F = \{ x \in \mathbb{R} \mapsto a \cos x + b \sin x, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \}$ dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- e. $G = \{ f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}), \int_0^1 f(t) dt = 0 \}$ dans $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$.
- f. $H = \{ f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2f(x) \}$ dans $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- g. $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, a + d = 0 \right\}$ dans $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

♥ 15.2 Expliquer pourquoi la partie F n'est pas un sous-espace Vectoriel de E

- a. $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = 1 \}$.
- b. $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - y^2 = 0 \}$.
- c. $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $F = \{ f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0 \}$.

♦ 15.3 Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

- a. L'ensemble des fonctions affines sur $\mathbb{R}$?
- b. L'ensemble des fonctions f telles que $f(0) = 1$?
- c. L'ensemble des fonctions f telles que $f(1) = 0$?
- d. L'ensemble des fonctions de signe constant ?

♥ 15.4 Dans $E = \mathbb{R}^3$, on donne $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 0)$, $\vec{w} = (0, 1, 1)$ et $\vec{t} = (1, 0, 1)$.On pose $F = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ et $G = \text{Vect}(\vec{w}, \vec{t})$, Déterminer $F \cap G$ et montrer que $F + G = \mathbb{R}^3$.♦ 15.5 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace Vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

- a. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.
- b. Montrer que $F \cap G = F + G \Leftrightarrow F = G$

♥ 15.6 **Sous-espaces supplémentaires:** Dans chacun des cas suivants, démontrer que $E = F \oplus G$

- a. $F = \text{Vect}((1, -1))$, $G = \text{Vect}((1, 2))$ et $E = \mathbb{R}^2$
- b. $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - z = 0 \}$, $G = \text{Vect}((2, -1, 0))$ et $E = \mathbb{R}^3$.
- c. $F = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \}$, $G = \text{Vect}(\vec{u})$ avec $\vec{u} = (1, 1, \dots, 1)$ et $E = \mathbb{R}^n$.
- d. $F = \{ f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \int_0^1 f(t) dt = 0 \}$, G le SEV des fonctions constantes sur $\mathbb{R}$ et $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- e. $F = \{ f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), f(0) = f'(0) = 0 \}$, $G = \{ x \mapsto ax + b, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \}$ et $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- f. $F = \mathcal{S}_n(\mathbb{C})$ (matrices symétriques) et $G = \mathcal{A}_n(\mathbb{C})$ (matrices antisymétriques) dans $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

15.7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et A et B deux SEV de E . On note C un supplémentaire de $A \cap B$ dans B , c'est-à-dire tel que $A \cap B \oplus C = B$. Montrer que A et C sont supplémentaires dans $A + B$, c'est-à-dire que $A \oplus C = A + B$

15.8 Équations de sous-espaces vectoriels.

- a. Soit $u = (1, 1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
Trouver une CNS sur les réels x, y et z pour que $X = (x, y, z) \in \text{Vect}(u, v)$.
- b. Soit $u = (1, 1, 1, 0)$ et $v = (0, 0, 1, 1)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^4$.
Trouver une CNS sur les réels x, y, z et t pour que $X = (x, y, z, t) \in \text{Vect}(u, v)$.

Familles de Vecteurs

♥ 15.9 Préciser si $\mathcal{F}$ est libre ou liée dans E

- $\mathcal{F} = ((2, 3) (4, 5))$ dans $E = \mathbb{R}^2$
- $\mathcal{F} = ((1, 0, 1) (2, 1, 0) (0, -1, 2))$ dans $E = \mathbb{R}^3$.
- $\mathcal{F} = ((1, 1, 1) (2, 1, 0) (0, -1, 2))$ dans $E = \mathbb{R}^3$.
- $\mathcal{F} = (u, v)$ avec $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n$ et $v_n = n2^n$ dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$
- $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, f_1(x) = x, f_2(x) = xe^x$ et $f_3(x) = e^x$ dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, f_1(x) = \cos^2 x, f_2(x) = \cos(2x)$ et $f_3(x) = 1$ dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

15.10 Soit (u, v, w) une famille libre dans un espace vectoriel E .

Montrer que la famille $(u + v, v + w, w + u)$ est une famille libre dans E .

15.11 On pose $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f_k(x) = e^{kx}$

Démontrer, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que la famille $\mathcal{F}_n = (f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est libre dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

15.12 On pose $\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f_k(x) = \cos(kx)$ et on fixe n dans $\mathbb{N}^*$.

a. Soit p et q deux entiers naturels non nuls, calculer $I_{p,q} = \int_0^\pi \cos(px) \cos(qx) dx$.

En déduire que la famille $\mathcal{F}_n = (f_k)_{1 \leq k \leq n}$ est libre dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

♦ b. Redémontrer ce résultat par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$

On pourra dériver dans l'hérédité

♦ 15.13 Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille libre d'un espace vectoriel et $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de scalaires.

On pose : $u = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, v_i = u + e_i$.

Montrer que la famille $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ est liée si et seulement si $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -1$.

♦ 15.14 Soit $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base de E . On pose $\vec{u} = \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{v} = \vec{e}_3 - \vec{e}_1$ et $\vec{w} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$. Montrer que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de E .

Dimension d'un EV

♥ 15.15 Soit $e_1 = (1, 1, 2, 2), e_2 = (1; 1, 1, 1), e_3 = (1, 2, 3, 4), e_4 = (1, -1, 1, 1)$.

a) Montrer que $(e_1; e_2; e_3; e_4)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

b) Quelles sont les coordonnées de $(4, 3, 2, 1)$ dans cette base ?

15.16 Dans $\mathbb{R}^4$ on donne $e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (1, 2, 0, 0), e_3 = (1, 2, 3, 4), e_4 = (1, 3, 5, 7)$ et $e_5 = (0, 2, 0, -2)$. Déterminer la dimension de $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$

♥ 15.17 Dans chacun des cas, justifier que F un SEV de dimension finie de E et préciser sa dimension.

- $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - y + z = 0 \}$.
- $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + 3z = 0 \text{ et } 2x + y + z = 0 \}$.
- $F = \{ (x, x, y, y) \in \mathbb{R}^4, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$ et $E = \mathbb{R}^4$
- $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}), F = \{ f \in E, f'' - 3f' + 2f = 0 \}$
- $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}), F = \{ f \in E, f'' + f' + f = 0 \}$
- $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $F = \{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + u_n = 0 \}$
- $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $F = \{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = u_n \}$

h. $E = \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ de la forme $E \cap F = \{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a+c & b \\ c & b & a \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \}$.

15.18 Dans $\mathbb{R}^3$, a-t-on $\text{Vect}\{(2, 3, -1), (3, 7, 0)\} = \text{Vect}\{(1, -1, -2), (5, 0, -7)\}$?

Supplémentaire en dimension finie

♥ 15.19 Dans $E = \mathbb{R}^4$, on donne les SEV F et G suivants:

$F = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x = y = z \}$ et $G = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y + z + t = 0 \}$

a) Donner les dimensions respectives de F , de G , de $(F \cap G)$ et de $(F + G)$.

b) Déterminer un supplémentaire de F dans E .

c) Existe-t-il un SEV H supplémentaire commun à F et à G dans E ?

♥ 15.20 Dans $E = \mathbb{R}^3$ Déterminer une base puis un supplémentaire du SEV F dans les cas suivants:

a) $F = \text{Vect}((1,1,0); (2,1,1))$

b) $F = \text{Vect}((-1,1,0); (2,0,1); (1,1,1))$

c) $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 3x - 2y + z = 0 \}$

d) $F = \{ (\alpha, -\alpha, 2\alpha), \alpha \in \mathbb{R} \}$

15.21 On pose $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{ f \in E | \forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + 4f(x) = 0 \}$ et $G = \{ f \in E | \int_0^{\pi/2} f(t)dt = f(0) = 0 \}$.

a. Montrer que F est un SEV de dimension finie et préciser sa dimension.

b. Montrer que G est un SEV de E et que F et G sont supplémentaires dans E

c. G est-il de dimension finie ?

♥ 15.22 Dans $\mathbb{R}^3$, on considère : $P = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 2y - z = 0 \}$ et $D = \text{Vect}(w)$ où $w = (1, 0, -1)$.

Montrer que P et D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.



Rang d'une famille de Vecteurs

♥ 15.23 Déterminer le rang des familles de vecteurs suivantes:

- a) $\mathcal{F} = ((3,2,1,4); (-1,0,1,2); (1,1,1,3))$ dans $E = \mathbb{R}^4$.
 b) $\mathcal{F} = ((1,2,0); (3,-1,3); (a,2a, (1-a)))$ dans $E = \mathbb{R}^3$ avec $a \in \mathbb{R}$.
 c) $\mathcal{F} = (x \mapsto e^x, x \mapsto e^{-x}, x \mapsto \operatorname{ch}(x), x \mapsto \operatorname{sh}(x))$ dans $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

♦ 15.24 Soit f et g définie sur $\mathbb{R}$ par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$.
 Déterminer le rang de la famille $F = (f, g, f \circ f, f \circ g, g \circ f, g \circ g)$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

15.25 Montrer que la famille $((1,0,\dots,0), (1,1,0,\dots,0), \dots, (1,1,\dots,1))$ est une base de $\mathbb{R}^n$.

15.26 On pose $E = \mathbb{R}^3$ et on définit les Vecteurs : $x_1 = (1, -1, 0)$, $x_2 = (1, 1, 0)$, $x_3 = (0, 1, -1)$ et $x_4 = (1, 1, 1)$.

- a. La famille (x_1, x_2, x_3) est-elle libre ? Si oui, est-ce une base de E ? Dans ce cas, déterminer les coordonnées de x_4 dans cette base. Si la famille n'est pas libre, exprimer x_3 en fonction de x_1 et de x_2 .
 b. Préciser le rang de la famille (x_1, x_2, x_3, x_4) .
 c. La famille (x_3, x_4) est-elle libre ? Si oui, la compléter en une base E .
 d. Soit $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$. Montrer que G est un sous-espace vectoriel de E , en donner une base et un supplémentaire.

Vrai ou Faux ?

1. Soit E un $\mathbb{K}$ - EV de dimension finie n avec $n \geq 1$

- ① De toute famille libre dans E on peut extraire une base de E .
- ② Une famille génératrice de E contient au moins n vecteurs.
- ③ De toute famille génératrice de E on peut extraire une base de E .
- ④ Une famille libre dans E contient au moins n vecteurs.
- ⑤ Une famille génératrice de E peut se compléter en une base de E .
- ⑥ Il existe une base de E contenant n vecteurs.
- ⑦ Une famille libre peut être complétée en une base de E .

2. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n , F et G deux SEV de E de dimensions respectives 3 et 4.

- ① $F \times G$ est de dimension 12.
- ② $F + G$ est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 7.
- ③ $n \geq 4$
- ④ Si $n = 7$ alors F et G sont supplémentaires.
- ⑤ Si $n = 4$ alors F est le supplémentaire d'un sous-espace de dimension 1.
- ⑥ F admet une infinité de supplémentaires.