Exercices - Chapitre 24 : Séries numériques
Tous les exos sont corrigés

24.1 Montrer que les séries suivantes convergent et calculer leur somme :

$$a. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \quad b. \sum_{n \geq 1} \ln \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \right) \quad c. \sum_{n \geq 0} \frac{3^{n+2}}{5^{2n-1}}$$

24.2 Donner la nature des séries suivantes en appliquant directement le cours et préciser la somme quand c'est possible.

$$\begin{array}{lll} a. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n}} & b. \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} & c. \sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \\ d. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)} & e. \sum_{n \geq 1} \frac{3}{\sqrt{n}} & f. \sum_{n \geq 1} \left(\frac{3}{2^n} + \frac{1}{2n^2} \right) \\ g. \sum_{n \geq 0} \frac{(-2)^n}{n!} & h. \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln(n))^2} & \end{array}$$

24.3 Etudier la nature de la série de terme général u_n dans les cas suivants

$$\begin{array}{lll} a. u_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + (-1)^n} & b. u_n = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{n} \right)^n & c. u_n = \ln \left(\frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 + 3n + 1} \right) \\ d. u_n = \frac{\ln(n)}{n^2} & e. u_n = \frac{\ln(\ln(n))}{n^2} & f. u_n = \frac{n!}{n^n} \\ g. u_n = \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) - \frac{1}{n} & h. u_n = \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)^{n^2} - 1 & i. u_n = n - \sin \frac{1}{n} \end{array}$$

24.4 Soit $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries à termes strictement positifs telles que

$\sum a_n$ CV et $\sum b_n$ DV. Donner, si possible, la nature des séries suivantes :

$$\begin{array}{llll} a. \sum (a_n + n) & b. \sum n a_n & c. \sum (b_n + n) & d. \sum n b_n \\ e. \sum \left(a_n + \frac{1}{n} \right) & f. \sum \frac{a_n}{n} & g. \sum (a_n + b_n) & h. \sum \frac{b_n}{n} \end{array}$$

24.5 Donner la nature de la série de terme général u_n vérifiant $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos(u_n)$.

24.6 Donner la nature de la série de terme général $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \cos t dt$

24.7 Soit x un réel.

a. Donner la nature de la série de terme général, $u_n = nx^{n-1}$ en fonction des valeurs de x .

b. En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$

24.8 La constante d'Euler : On pose $\forall n \geq 1, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$.

a. A l'aide d'un développement limité d'ordre 2, donner un équivalent de $u_{n+1} - u_n$.

b. En déduire que (u_n) converge. Sa limite est la constante d'Euler notée γ .

c. Donner un équivalent simple de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

24.9 Série alternée

On s'intéresse à la série de Gregory : $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

a. Justifier la convergence de la série de Gregory

b. On note S_n la somme partielle $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n \int_0^1 (-t^2)^k dt$.

c. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{1+t^{2n+2}}{1+t^2} dt$.

d. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ converge et préciser sa somme.

24.10 A l'oral des concours

On considère la suite réelle définie par $a_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = 1 - e^{-a_n}$.

1. Montrer que $a_n \rightarrow 0$

2. En utilisant un développement asymptotique, donner la nature de la série de terme général a_n^2 .

3. Étudier la série de terme général $\ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$, en déduire la nature de $\sum_{n \geq 0} a_n$

24.11 Un autre

Pour tout $n \geq 1$, on pose $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

1. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} a_n$?

2. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + a_n)$?

C'est bientôt fini...

MACHINE A MOTIVER

Pour se remonter le moral, Zeno va à la fenêtre (A), relève le store (B), ce qui permet au soleil de faire fondre un bloc de glace (C). L'eau goutte dans la poêle (D) et à travers le tuyau (E) tombe dans le seau (F). Sous le poids du seau, la corde (G) se tend, guidant le marteau (H) sur les ciseaux (I), ce qui coupe le fil (J) aidant le poids (K) à tomber dans les filets (L). La poignée du filet pivote contre la boule (M), ce qui fait tomber le cactus (N), qui perce le ballon rempli d'eau (O). L'eau douche le chat (P) qui bondit en avant, tirant sur le fil (Q) attaché au levier (R), ce qui amène la chaussure (S) à se balancer et à motiver brusquement Zeno.

TD: Un calcul de $\zeta(2)$ avec les intégrales de Wallis

Le but de cet exercice est de prouver que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

1. Démontrer que $\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}], t \leq \frac{\pi}{2} \sin(t)$

On pose $\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt$

Intégrales de Wallis ♥

On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}, I_{2n+2} = \frac{2n+1}{2n+2} I_{2n}$ et $I_{2n} - I_{2n+2} = \frac{I_{2n}}{2(n+1)}$.

2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \cos^n(t) dt$.

a. Démontrer que $J_{2n} \leq \frac{\pi^2}{4} \frac{I_{2n}}{2(n+1)}$.

b. Via deux IPP successives, démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, J_{2n} = -\frac{I_{2n}}{n} + (2n-1)(J_{2n-2} - J_{2n})$

c. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{2n^2} = \frac{J_{2n-2}}{I_{2n-2}} - \frac{J_{2n}}{I_{2n}}$.

3.a. Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k^2} - \frac{J_0}{I_0} \right| \leq \frac{\pi^2}{4} \frac{1}{2(n+1)}$.

b. Justifier que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge et donner sa somme.