

Ensembles, logique et rédaction - Exercices

I. Logique

Exercice I.1. On considère A : « m et n sont deux entiers pairs » et B : « $m + n$ est un entier pair ». A-t-on $\forall m, n \in \mathbb{N}, A \Rightarrow B$? $\forall m, n \in \mathbb{N}, B \Rightarrow A$? $\forall m, n \in \mathbb{N}, A \iff B$? Justifier.

Exercice I.2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs dans \mathbb{R} . Écrire avec des quantificateurs les assertions suivantes puis leur négation.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La fonction f n'est pas la fonction nulle. 2. La fonction f ne s'annule jamais. 3. La fonction f est majorée par 5. 4. La fonction f est bornée. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Tout réel admet un antécédent par f. 6. 0 est le seul antécédent de 0 par f. 7. La fonction f est ni croissante ni décroissante sur I. |
|--|---|

Exercice I.3. 1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 - 3n + 2$ est pair.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $n^3 - n$.

Exercice I.4. Soit $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que : $(\forall \varepsilon > 0, |a| \leq \varepsilon) \Rightarrow a = 0$.
2. Montrer que : $(\forall \varepsilon > 0, a < b + \varepsilon) \Rightarrow a \leq b$.
3. Montrer que : $a < b \iff (\exists c \in \mathbb{R} \mid a < c < b)$.

Exercice I.5. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer par l'absurde que l'on a : $|z + 1| \geq 1$ ou $|z - 1| \geq 1$.

Exercice I.6. 1. Montrer que toute fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} s'écrit de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
2. Montrer que toute fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} s'écrit de façon unique comme la somme d'une fonction constante et d'une fonction qui s'annule en 0.

Exercice I.7. 1. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y$.
2. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + y$.

Exercice I.8. • Bonjour mon capitaine, je voudrais connaître l'âge de vos trois enfants.

- Hardi moussaillon, le produit de leurs âges est 36!
- Mais il me faudrait une information supplémentaire!
- Sacrebleu, la somme de leurs âges est égale au nombre de marins de mon équipage!
- Bon, je vais aller les compter
- ...
- Mon capitaine, il me faudrait en savoir plus pour conclure.
- Corne de saperlipopette! Le plus jeune de mes enfants ne sait pas nager!

Quel est l'âge des enfants du capitaine?

II. Ensembles

Exercice II.1. 1. Déterminer le complémentaire dans \mathbb{R} de $[1, 2[$.
2. Dans \mathbb{R}^2 , dessiner l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 2 \text{ et } y \leq 3\}$. Déterminer son complémentaire.
3. On pose $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y = 1\}$ et $B = \{(3t - 1, -2t + 1), t \in \mathbb{R}\}$. Montrer que $A = B$.

Exercice II.2. 1. Montrer que $\{x \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0, x < \varepsilon\} =]-\infty, 0]$.
2. Soit $a < b$ deux réels. Montrer que $[a, b] = \{ta + (1 - t)b, \text{ avec } t \in [0, 1]\}$.

Exercice II.3. On définit les ensembles :

$$E = \{0, 1\}, \quad F = \{x \in \mathbb{C} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n = x\} \quad \text{et} \quad G = \{x \in \mathbb{C} \mid \forall n \in \mathbb{N}, x^n = x\}.$$

1. Écrire en toutes lettres les définitions des ensembles F et G .

II. Ensembles

2. Montrer que $E \subset F$.
3. Montrer que l'un des ensemble F ou G est inclus dans l'autre.
4. E est-il inclus dans G ?
5. Déterminer l'ensemble G en extension.

Exercice II.4. 1. Soit $E = \{e\}$ un singleton. Déterminer $\mathcal{P}(E)$ puis $\mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$.

2. Soit $E = \{a, b, c\}$. Déterminer $\mathcal{P}(E)$.
3. Déterminer $\mathcal{P}(\emptyset)$, puis $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.
4. Soit $E = \{1, 2, 3\}$. Déterminer $(E \times E) \setminus \{(x, x) \mid x \in E\}$.

Exercice II.5. Soit $E = \llbracket 1, 4 \rrbracket$. Soient $A = \{(i, j) \in E^2 \mid i < j\}$, $B = \{(i, j) \in E^2 \mid i = j\}$ et $C = \{(i, j) \in E^2 \mid i > j\}$. Montrer que (A, B, C) forme une partition de E^2 .

Exercice II.6. Écrire sous forme d'un intervalle en justifiant les ensembles :

$$1. A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [0, n] \quad \left| \quad 2. B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{1}{n}\right] \quad \left| \quad 3. C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] \quad \left| \quad 4. D = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left]0, 1 + \frac{1}{n}\right[$$

Exercice II.7. Soit E un ensemble. Montrer par contraposée que :

1. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), (A \cap B = A \cup B) \Rightarrow A = B$.
2. $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), (A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \Rightarrow B = C$.

Exercice II.8. Soit E un ensemble et A, B, C trois parties de E . Montrer que :

1. $A \subset B \Rightarrow A \cup C \subset B \cup C$. Étudier la réciproque.
2. $A \subset B \Rightarrow A \cap C \subset B \cap C$. Étudier la réciproque.
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
4. $A \subset B \iff A \cap \bar{B} = \emptyset$.

Exercice II.9. Soient A, B et C trois parties d'un ensemble E telles que $E = A \cup B \cup C$. Soit $D \in \mathcal{P}(E)$ vérifiant : $A \cap D \subset B$, $B \cap D \subset C$ et $C \cap D \subset A$.

Montrer que $D \subset A \cap B \cap C$.

Exercice II.10. Soit E un ensemble. Soient A et B deux parties de E . On définit la différence symétrique de A et B par : $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

1. Montrer que $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ et faire un dessin.
2. On suppose que $A \Delta B = A \cap B$. Montrer que $A = B = \emptyset$.
3. Soit $C \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que $A \Delta B = A \Delta C \iff B = C$.
4. Résoudre l'équation $A \Delta X = \emptyset$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice II.11. Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Résoudre l'équation : $A \cup X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.