

Exercice 15. Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $n \leq p + q$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. De combien de façons peut-on choisir simultanément n entiers entre 1 et $p + q$ tels que exactement k d'entre eux sont inférieurs ou égaux à p ?

2. En déduire l'identité de Vandermonde : $\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$.

Exercice 16. Ma playlist Spotify comprend n morceaux ($n \geq 1$). Ces n morceaux sont en fait p répétitions de mon préféré et $n - p$ répétitions d'un autre. J'écoute ma playlist en mode random.

1. Combien y a-t-il de façons d'écouter ma playlist?

Je m'arrête d'écouter dès que j'ai écouté toutes les répétitions de mon morceau préféré.

2. Soit $k \in \llbracket p, n \rrbracket$. Combien de façons d'écouter ma playlist me permettent de m'arrêter après exactement k morceaux?

3. En déduire la formule : $\sum_{k=p}^n \binom{k-1}{p-1} = \binom{n}{p}$.

Exercice 17. 1. Montrer qu'il existe deux ensembles de 10 entiers dans $\llbracket 1, 100 \rrbracket$ qui ont la même somme.

2. On prend une partie E de $\llbracket 1, 100 \rrbracket$ de cardinal 10. Montrer qu'il existe deux sous-ensembles non vides et disjoints de E qui ont la même somme.

Exercice 18. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ non vide tel que $\sum_{i \in I} a_i$ est divisible par n .

Exercice 19. Soit E un ensemble à n éléments. Déterminer le nombre de couples (A, B) de parties telles que $A \subset B$ (on pourra, par exemple, essayer avec $n = 3$).

Exercice 20. Soit $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ un ensemble à n éléments ($n \geq 2$), p un entier compris entre 2 et n .

1. Dénombrer les parties de E à p éléments qui contiennent :

- a) x_1 et x_2 b) x_1 mais pas x_2 c) x_2 mais pas x_1 d) Ni x_1 ni x_2

2. En déduire la relation $\binom{n}{p} = \binom{n-2}{p-2} + 2\binom{n-2}{p-1} + \binom{n-2}{p}$.

3. Retrouver ce dernier résultat par le calcul.

Exercice 21. 1. Soit E un ensemble fini de cardinal n . Déterminer le cardinal de l'ensemble

$$\{(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3 \mid A \cup B \cup C = E\}$$

2. En s'inspirant de la démonstration ensembliste de la formule de Newton, démontrer la formule

$$(a + b + c)^n = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-i} \binom{n}{i} \binom{n-i}{j} a^i b^j c^{n-i-j}.$$

Exercice 22. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un ensemble de cardinal n .

1. Calculer $S = \sum_{X \in \mathcal{P}(E)} \text{card}(X)$.

2. On pose $U = \sum_{(X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2} \text{card}(X \cup Y)$, $V = \sum_{(X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2} \text{card}(X \cap Y)$ et $W = \sum_{(X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2} \text{card}(X \cap \bar{Y})$.

Calculer $U + V$ et $V + W$ et en déduire U , V et W .