

Semaine de colles n°23 du 22/04/24 au 26/04/24

DU PROGRAMME PRÉCÉDENT :• **Polynômes****I - L'ensemble $K[X]$ où $K = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C}** **II - Dérivation dans $K[X]$**

- ➔ Définition, propriétés, expression de la dérivé $k^{\text{ième}}$ d'un polynôme.
- ➔ Formule de Leibniz et formule de Taylor pour les polynômes.

III - Divisibilité dans $K[X]$

- ➔ Multiples et diviseurs d'un polynôme, division euclidienne, exemple pratique.

IV - Racines d'un polynôme

- ➔ Définition par divisibilité et caractérisation.
- ➔ Tout polynôme de degré $n \geq 0$ possède au plus n racines distinctes.
- Si un polynôme de degré $\leq n$ admet au moins $n + 1$ racines distinctes, c'est le polynôme nul.
- Ex. Trouver tous les polynômes P vérifiant : $P(X+1) = P(X)$. (*)
- ➔ Ordre de multiplicité d'une racine : définition par divisibilité et caractérisation.
- ➔ Un polynôme de degré $n \geq 0$ possède au plus n racines, comptées avec leur multiplicité.
- Si un polynôme de degré $\leq n$ admet au moins $n + 1$ racines, comptées avec leur multiplicité, c'est le polynôme nul.

V - Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

- ➔ Polynômes irréductibles, th. de D'Alembert-Gauss, polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et de $\mathbb{R}[X]$.
- ➔ Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.
- ➔ Ex. de factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$: $X^n - 1$ (*)

VI - Somme et produit des racines d'un polynôme

- ➔ Savoir retrouver les relations coefficients/racines pour un polynôme de degré 3. (*)
- ➔ Somme et produit des racines d'un polynôme scindé sur \mathbb{K} de degré $n \geq 1$.

NOUVEAU COURS :• **Dénombrements****I - Ensembles finis**

- ➔ Intervalles de \mathbb{N} , conditions sur p et n lorsqu'il existe une injection/surjection/bijection $[[1, p]]$ sur $[[1, n]]$.
- ➔ Définition d'un ensemble fini non vide et par convention, l'ensemble vide est fini.
- ➔ Parties d'un ensemble fini, cardinal d'une partie.
- ➔ Applications entre deux ensembles finis : Cardinal de $\mathcal{F}(E, F)$, conditions sur $\text{Card } E$ et $\text{Card } F$ lorsqu'il existe une injection/surjection/bijection E sur F .
- Si E et F finis tels que $\text{Card } E = \text{Card } F$ et $f : E \rightarrow F$ une application alors :
 f injective $\Leftrightarrow f$ surjective $\Leftrightarrow f$ bijective.

II - Opérations sur les ensembles finis

- ➔ Cardinal d'une réunion disjointe ou non, d'un produit cartésien.
- Rq. interrogateurs : La formule du crible est H.P.
- ➔ Définition d'une partition d'un ensemble, lien avec les cardinaux.
- ➔ Parties d'un ensemble fini : nombre total de parties (*) **Dem. par récurrence.**

III - Outils pour le dénombrement

- ➔ p -listes, p -arrangements, permutations.
- Applications : dénombrement des injections et des bijections de E dans F .
- ➔ p -combinaisons, nombre de parties de cardinal p d'un ensemble E fini.
- ➔ Un exemple classique : les anagrammes (*) **A savoir expliquer sur des exemples.**

IV - Propriétés des coefficients binomiaux

- ➔ Démonstrations combinatoires : Symétrie, somme, triangle de Pascal, Binôme de Newton.

(*) Démonstrations / Méthodes à connaître et TOUT le cours est à connaître !Prévisions semaine n° 24 : Probabilités sur un univers fini.**Déroulement d'une colle**

1. Une question de cours parmi celles signalées par (*)
2. Une ou deux questions de dénombrements faciles (cf. ex 18)
3. Exercice(s) au choix de l'interrogateur. La liste des exercices à savoir refaire est donnée ci-dessous mais l'interrogateur a le choix de poser ou non un exercice de cette liste.

Un cours non connu entraine une note < 10 .

Exercices Chap. 18

Exercice 4 :

Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que : $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$.

Exercice 7 :

On considère les ensembles : $E_1 = \{P \in \mathbb{R}_2[X], \tilde{P}(2) = 0\}$ et $E_2 = \{P \in \mathbb{R}[X], \tilde{P}(1) = 1\}$.

Ces ensembles sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$?

Si oui, sont-ils de dimensions finies ? Si oui, en donner une base.

Exercice 8 :

Soit $E = \mathbb{R}_5[X]$. On considère : $F = \{P \in E, P(1) = P'(0) = P(-1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(X^2, X(X+1), (X+1)^2)$.

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Donner une base de F et une base de G .

2. A-t-on $E = F \oplus G$?

Exercice 12 : Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(x \mapsto \cos^n(x))_{p \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une famille libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 13 : Polynômes interpolateurs de Lagrange.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $(n+1)$ réels tels que : $a_0 < a_1 < \dots < a_n$.

1. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe un unique polynôme $L_i \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que : $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, L_i(a_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

2. Montrer que (L_0, L_1, \dots, L_n) est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et déterminer les coordonnées d'un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ dans cette base.

3. On donne A_0, A_1, \dots, A_n ($n+1$) points d'abscisses 2 à 2 distinctes du plan. Déterminer une fonction polynomiale de degré au plus n dont la courbe représentative passe par les points A_0, A_1, \dots, A_n .

Exercice 15 : Déterminer le reste des divisions euclidiennes suivantes dans $\mathbb{R}[X]$:

1. $A = X^n$ par $B = X^2 - 3X + 2$ avec $n \geq 2$

2. $A = X^n$ par $B = X(X-1)^2$ avec $n \geq 3$

3. $A = (X \cos \theta + \sin \theta)^n$ par $B = X^2 + 1$ avec $n \geq 2$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Exercice 19 :

Soit $n \geq 1$ et $P = nX^{n+1} - (n+1)aX^n + a^{n+1}$ où a est un réel fixé. Montrer que P est divisible par $(X-a)^2$ et donner le quotient.

Exercice 23 : Une application aux matrices.

1. On considère : $A = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 - 3A + 2I_2$.

2. Soit $n \geq 2$. Déterminer le reste de la division euclidienne du polynôme X^n par $X^2 - 3X + 2$.

3. En déduire, A^n pour $n \geq 2$.

Exercice 28 : Montrer que pour tout n entier naturel, le polynôme $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} X^k$ n'a pas de racine multiple.

Exercice 33 :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, de degré $n \geq 2$. On notera \tilde{P} sa fonction polynomiale associée.

1. Montrer que si P est scindé à racines simples sur \mathbb{R} alors il en est de même pour son polynôme dérivé P' .

2. Montrer que si P est scindé sur \mathbb{R} , son polynôme dérivé P' est aussi scindé sur \mathbb{R} .

Exercice 38 :

On considère le polynôme : $P_n = (X+1)^n - (X-1)^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Étudier la fonction cotangente définie par : $\cotan : x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x}$.

2. Déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme P_n .

3. Démontrer que P_n admet $n-1$ racines imaginaires pures, deux à deux distinctes. En déduire la factorisation de P_n dans $\mathbb{C}[X]$.

4. Factoriser P_n dans $\mathbb{R}[X]$.

Problème : Les polynômes de Tchebychev.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique polynôme de $\mathbb{R}[X]$, noté P_n , tel que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, P_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$.

2. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$.

3. a. Calculer P_2, P_3 et P_4 .

b. Déterminer, pour $n \in \mathbb{N}$, le degré et le coefficient dominant de P_n . On demande de démontrer proprement vos résultats !

c. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$.

4. a. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer les racines de P_n appartenant à l'intervalle $[-1, 1]$.

On pourra remarquer que : $\forall x \in [-1, 1], \exists ! \theta \in [0, \pi], x = \cos \theta$.

b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Combien de racines de P_n appartiennent à l'intervalle $[-1, 1]$? Que pouvez-vous en déduire ?

c. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer la factorisation de P_n dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercices Chap. 19

Exercice 10 :

Soit E un ensemble à n éléments où $n \geq 1$.

a. Dénombrer les couples (A, B) de parties de E vérifiant : $A \subset B$.

b. Dénombrer les couples (A, B) de parties de E vérifiant : $A \not\subset B$ et $B \not\subset A$.

Exercice 14 : Formule de Vandermonde.

Soit n, n_1 et n_2 trois entiers naturels tels que : $n \leq n_1$ et $n \leq n_2$. Montrer de façon ensembliste que : $\sum_{k=0}^n \binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k} = \binom{n_1+n_2}{n}$.

Exercice 16 : Applications strictement croissantes.

Pour $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, déterminer le nombre d'applications strictement croissantes de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 18 : p -listes, p -arrangements ou p -combinaison ?

1. Nombre de codes possibles pour une carte bleue ?

2. Au loto, on tire au hasard 6 boules parmi 49. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?

3. Au tiercé, une course de chevaux comporte 20 partants. Combien peut-il y avoir de résultats possibles de tiercés dans l'ordre ?

4. Un porte-manteau comporte 5 patères. De combien de façons peut-on y accrocher 3 manteaux différents ?

Rq. Au plus un manteau par patère.

5. Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On en tire simultanément 3. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?

6. Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On en tire successivement 3 sans remise. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?

7. Combien de pièces contient un jeu de dominos ?

8. Quel est le nombre de façons de choisir 2 délégués dans la classe de PCPSI 3 ?

9. Quel est le nombre de façons de choisir 2 délégués dans la classe de PCPSI 3 si l'on impose un garçon et une fille ?

10. Quel est le nombre de plaques d'immatriculation possibles ?

Rq. Une plaque d'immatriculation est composée de « 2 lettres – 3 chiffres – 2 lettres »

11. Quel est le nombre de plaques d'immatriculation possibles dont tous les chiffres et les lettres sont deux à deux distincts ?

12. Quel est le nombre d'anagrammes du mot PREPA ?

13. Combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 3 entrées, 2 plats et 4 desserts ?

14. Un QCM, autorisant une seule réponse par question, comprend 15 questions qui ont chacune 4 réponses possibles.

De combien de façons peut-on répondre à ce questionnaire ?

Exercice 21 :

Combien de mains de 13 cartes peut-on constituer avec un jeu de 52 cartes telles que :

1. elles contiennent exactement un roi ?

2. elles contiennent au moins un roi ?

3. elles contiennent le roi de trèfle et au moins 2 piques ?

4. elles contiennent 6 cartes d'une couleur, 4 cartes d'une autre et 3 cartes d'une troisième ?

Exercice 25 :

Combien y a-t-il de n -entiers dont l'écriture comporte exactement n chiffres ($n \geq 3$) et comportant exactement deux chiffres 8 ?