

Fonctions continues par morceaux

formules de Taylor

1. FONCTIONS CONTINUES PAR MORCEAUX SUR UN SEGMENT

Dans tout le document, I désigne un intervalle « non trivial », i.e. de longueur strictement positive. Par $\mathbb{K}$, on désigne le corps des réels, $\mathbb{R}$, ou celui des complexes, $\mathbb{C}$.

On commence par le cas où $I = [a, b]$ est un *segment*.

Définition 1. Soit une fonction $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$. Soit une subdivision $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ de $[a, b]$. On suppose que, pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, f est continue sur $]x_i, x_{i+1}[$. Alors, l.p.s.s.e. :

- (i) La fonction f admet une limite finie à droite en tout point x_i de la subdivision pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et une limite finie à gauche en tout point x_i de la subdivision pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- (ii) Pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la restriction $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ de f à l'intervalle ouvert $]x_i, x_{i+1}[$ admet un prolongement par continuité à l'intervalle fermé $[x_i, x_{i+1}]$, noté $\tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}$ (qui n'est pas forcément $f|_{[x_i, x_{i+1}]}$).

S'il existe une subdivision $\mathcal{S}$ (finie par définition) de $[a, b]$ telle que les propositions ci-dessus soient vérifiées, alors f est dite continue par morceaux sur le segment $[a, b]$. La subdivision $\mathcal{S}$ est dite adaptée à f .

Propriétés et exemples — Les fonctions continues sont continues par morceaux.

- Les fonctions en escalier sont continues par morceaux.
- Les fonctions affines par morceaux sont continues par morceaux.
- Les fonctions continues par morceaux admettent une limite à droite et à gauche en tout point, mais la réciproque est fausse.

Exercice 1. Montrer la dernière propriété.

Proposition 1. Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$, il existe alors une subdivision adaptée minimale $\mathcal{S}_0$ associée à f , qui est constituée, outre a et b , des points de discontinuité de f . Autrement dit, toute subdivision $\mathcal{S}$ adaptée à f est telle que $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$.

Exercice 2. Montrer la proposition 1.

Théorème 1. Théorème des bornes atteintes (ou pas). Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue par morceaux, alors elle est bornée. En revanche, contrairement au cas continu, elle n'atteint pas nécessairement ses bornes.

Exercice 3. Prouver le théorème 1 en le déduisant du cas continu.

Notation 1. Si $[a, b]$ est un intervalle non trivial, on note $\mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions définies sur $[a, b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$ et continues par morceaux sur le segment $[a, b]$.

Proposition 2. Stabilité algébrique de la continuité par morceaux.
L'ensemble $\mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$ est un espace vectoriel stable par produit.

Exercice 4. Montrer que $\mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$ est un espace vectoriel.

Exercice 5. Stabilité par composition.

Soient I et J deux segments non triviaux, $f \in \mathcal{C}_{p.m.}^0(I)$ et $g \in \mathcal{C}^0(J)$.

1. On suppose que $f(I) \subset J$. Alors, $g \circ f$ est bien définie et continue par morceaux sur I .
2. On suppose que $g(J) \subset I$. Alors, $f \circ g$ est bien définie, mais pas nécessairement continue par morceaux sur J . Indication : Pour le contreexemple, on pourra prendre pour f la fonction d'Heaviside $f = H = \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}$.
3. Montrer que, dans la situation de la question 2, si l'on rajoute l'hypothèse que g est strictement monotone, alors $f \circ g$ est continue par morceaux.

Exercice 6. Montrer que, sur un segment, une fonction est continue par morceaux si, et seulement si, elle est la somme d'une fonction continue et d'une fonction en escalier. Pour montrer l'implication directe, on pourra commencer par le cas d'une fonction f telle que $\lim_{\substack{x \rightarrow u \\ x \neq u}} f(x)$ existe pour tout u .

Exercice 7. Théorème de Darboux

1. Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on pose $\varphi(x) = x^2 \sin(1/x)$. Vérifier que φ est prolongeable en une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ (toujours notée φ), mais que φ' n'est pas continue en 0.
2. Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f'(a) < 0 < f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ telle que $f'(c) = 0$.
3. Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Montrer que f' vérifie la propriété des valeurs intermédiaires (théorème de Darboux). Que peut-on dire de f' si f' est continue par morceaux ?

2. INTÉGRALE

Soit $[a, b]$ un segment non trivial de $\mathbb{R}$. On suppose connue la théorie de l'intégrale des fonctions de $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$. Le but de ce paragraphe est de l'étendre brièvement aux fonctions de $\mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$.

Théorème et définition 1. Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$ et si $\sigma: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ est une subdivision contenant les points de discontinuité de f (donc adaptée à f), on définit

$$\mathcal{I}(f, \mathcal{S}) = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}(t) dt.$$

Alors, $\mathcal{I}(f, \mathcal{S})$ ne dépend pas de $\mathcal{S}$. On peut alors poser

$$\int_a^b f(t) dt = \mathcal{I}(f, \mathcal{S}).$$

Démonstration. Notons que, par construction et pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la fonction $\tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}$ est continue sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$ et que $\mathcal{I}(f, \mathcal{S})$ est ainsi bien définie. Soient $\mathcal{S}_0$ la subdivision minimale associée à f et $\mathcal{S}$ une subdivision adaptée à f . D'après la proposition 1, $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$. Notons $\mathcal{S}_0 = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$ et $\mathcal{S} = (y_j)_{0 \leq j \leq m}$. Ainsi, il existe une unique suite d'entiers strictement croissante $(p_i)_{0 \leq i \leq n}$ telle que $x_i = y_{p_i}$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et l'on a

$$\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket: [x_i, x_{i+1}] \cap \mathcal{S} = \{y_j; j \in \llbracket p_i, p_{i+1} \rrbracket\} = \mathcal{S}_i.$$

Pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la fonction $\tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}$ est continue, donc $\tilde{f}_{(y_j, y_{j+1})}$ est la restriction de $\tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}$ à $[y_j, y_{j+1}]$ pour tout $j \in \llbracket p_i, p_{i+1} - 1 \rrbracket$. On peut ainsi appliquer la relation de Chasles, qui donne

$$\mathcal{I}(f|_{[x_i, x_{i+1}]}, \mathcal{S}_i) = \sum_{j=p_i}^{p_{i+1}-1} \int_{y_j}^{y_{j+1}} \tilde{f}_{(y_j, y_{j+1})}(t) dt = \sum_{j=p_i}^{p_{i+1}-1} \int_{y_j}^{y_{j+1}} \tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}(t) dt = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}(t) dt,$$

d'où, en sommant sur les valeurs de i ,

$$\mathcal{I}(f, \mathcal{S}) = \sum_{j=0}^{m-1} \int_{y_j}^{y_{j+1}} \tilde{f}_{(y_j, y_{j+1})}(t) dt = \sum_{i=0}^{n-1} \mathcal{I}(f|_{[x_i, x_{i+1}]}, \mathcal{S}_i) = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \tilde{f}_{(x_i, x_{i+1})}(t) dt = \mathcal{I}(f, \mathcal{S}_0).$$

□

Proposition 3. L'application $f \mapsto \int_a^b f(t) dt$ définit une forme linéaire sur $\mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$.

Propriétés. — Si l'on modifie les valeurs prises par une fonction continue par morceaux en un nombre fini de points, elle reste continue par morceaux et la valeur de son intégrale est inchangée.

— Pour $f \in \mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$, $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

— L'intégrale est positive et croissante.

Proposition 4 (Relation de Chasles). *Si $a < b < c$ sont trois réels, et si $f \in \mathcal{C}_{p.m.}^0([a, c], \mathbb{K})$, alors $f \in \mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b], \mathbb{K})$, $f \in \mathcal{C}_{p.m.}^0([b, c], \mathbb{K})$ et*

$$\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt.$$

Exercice 8. Montrer les propositions 3 et 4.

Remarque 1. L'application $(f, g) \mapsto \int_a^b f(t)g(t) dt$ **ne** définit **pas** un produit scalaire sur $\mathcal{C}_{p.m.}^0([a, b])$ comme c'est le cas sur $\mathcal{C}^0([a, b])$.

3. EXTENSION DE LA CONTINUITÉ PAR MORCEAUX AUX INTERVALLES QUELCONQUES.

Définition 2. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ de longueur non nulle. Une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux si sa restriction à tout segment inclus dans I l'est.

Notation 2. On note $\mathcal{C}_{p.m.}^0(I)$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux définies sur I . En cas de besoin, on peut préciser s'il s'agit des fonctions à valeurs réelles ou complexes en notant $\mathcal{C}_{p.m.}^0(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}_{p.m.}^0(I, \mathbb{C})$.

Propriétés. — La continuité par morceaux est stable par restriction.

— Si $\mathcal{D}$ est l'ensemble des points de discontinuité d'une fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et si $A \subset \mathbb{R}$ est bornée, alors $\mathcal{D} \cap A$ est fini.

— Les propositions 2 et l'exercice 5 s'étendent immédiatement au cas d'un intervalle quelconque.

Exemples. — Toute fonction continue est continue par morceaux ;

— la fonction $x \mapsto 1/x$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, mais pas prolongeable en une fonction de $\mathcal{C}_{p.m.}^0(\mathbb{R}_+)$;

— on peut dire la même chose des fonctions $x \mapsto \sin(1/x)$ et $x \mapsto \operatorname{sgn}(\sin(1/x))$ sur les mêmes intervalles ;

— toute fonction dont la restriction à tout segment est en escalier est continue par morceaux ; par exemple, $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ appartient à $\mathcal{C}_{p.m.}^0(\mathbb{R})$.

Exercice 9. Représenter graphiquement les fonctions suivantes. Lesquelles sont-elles continues par morceaux sur leur domaine de définition ?

(i) $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ pour $x \in \mathbb{R}$;

(ii) $0 \mapsto 0$ et $x \mapsto x \sin(1/x)$ si $x \in \mathbb{R}^*$;

(iii) $0 \mapsto 0$ et $x \mapsto x^2 \lfloor 1/x \rfloor$ sur $[0, 1]$;

(iv) $x \mapsto \varepsilon_k(x)$, k -ème chiffre du développement décimal de x sur $\mathbb{R}$.

Exercice 10. Une fonction continue par morceaux sur un intervalle non borné peut-elle avoir une infinité de points de discontinuité ? Et sur un intervalle borné ?

Exercice 11. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On note $\mathcal{D}$ l'ensemble de ses points de discontinuités. Montrer que l'un des quatre cas suivants est réalisé :

— $\mathcal{D}$ est fini et peut se représenter par une suite finie strictement croissante ;

— $\mathcal{D}$ est l'ensemble des valeurs prises par une suite réelle strictement croissante ;

— $\mathcal{D}$ est l'ensemble des valeurs prises par une suite réelle strictement décroissante ;

— $\mathcal{D}$ est l'ensemble des valeurs prises par une « suite » strictement croissante indicée par $\mathbb{Z}$.

Exercice 12. Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$ et $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T -périodique c.p.m. On pose $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on

pose $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T \cos(n\omega t) f(t) dt$ et $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T \sin(n\omega t) f(t) dt$. La série de Fourier de f est, par définition,

$$S(f)(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)].$$

Un célèbre théorème dû à Dirichlet affirme que, sous l'hypothèse que f est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, la série $S(f)$ converge simplement (*i.e.* pour tout $t \in \mathbb{R}$) et que

$$S(f)(t) = \frac{1}{2} \left(\lim_{\substack{u \rightarrow t \\ u < t}} f(u) + \lim_{\substack{u \rightarrow t \\ u > t}} f(u) \right).$$

Proposer une définition raisonnable de « $\mathcal{C}^1$ par morceaux » et expliquer pourquoi l'on ne peut pas avoir en général $S(f) = f$.

4. PRIMITIVATION

Définition 3. Si $f: I \rightarrow \mathbb{K}$, on appelle primitive de f une fonction $F: I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable telle que $F' = f$.

Théorème 2. Si f est continue par morceaux sur I et $x_0 \in I$, soit $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$.

1. Si f est continue, alors F est la seule primitive de f s'annulant en x_0 . Autrement dit, F est dérivable sur I , $F(x_0) = 0$ et, pour tout $x \in I$, $F'(x) = f(x)$.

2. Si f est seulement continue par morceaux, la fonction F est dérivable à droite en tout point $x \neq \sup(I)$ et l'on a $F'_d(x) = \lim_{\substack{t \rightarrow x \\ t > x}} f(t)$; elle est dérivable à gauche en tout point $x \neq \inf(I)$ et l'on a $F'_g(x) = \lim_{\substack{t \rightarrow x \\ t < x}} f(t)$.

Corrélativement, F est dérivable en $x \in I$ si, et seulement si, $\lim_{\substack{t \rightarrow x \\ t \neq x}} f(t)$ existe et, en ce cas, on a $F'(x) = \lim_{\substack{t \rightarrow x \\ t \neq x}} f(t)$.

3. La fonction F est la seule fonction continue sur I , nulle en x_0 , et dont la dérivée coïncide avec f en tout point où ses limites à droite et à gauche sont identiques, donc en particulier en tout point de continuité de celle-ci.

Démonstration. Par la relation de Chasles, les propriétés de dérivabilité de F ne dépendent pas du choix de x_0 . Soient $[a, b] \subset I$ un segment et $\mathcal{S} = (y_k)_{0 \leq k \leq n}$ une subdivision associée à $f|_{[a,b]}$. Pour $x \in [a, b]$, on pose $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Comme la restriction de f au segment $[a, b]$ est bornée par le théorème des bornes (théorème 1), posons $M = \sup_{a \leq t \leq b} |f(t)| \in \mathbb{R}_+$. Alors,

$$\forall (x, y) \in [a, b]^2: F(x) - F(y) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt = \int_y^x f(t) dt \quad \therefore \quad |F(x) - F(y)| \leq M|x - y|.$$

Autrement dit, F est M -lipschitzienne, donc continue. Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Pour $y_k < x < y_{k+1}$, on peut écrire

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = \int_a^{y_k} f(t) dt + \int_{y_k}^x f(t) dt = I_k + \int_{y_k}^x \tilde{f}_{(y_k, y_{k+1})}(t) dt.$$

Ainsi, la restriction $F|_{[y_k, y_{k+1}]}$ est continue comme restriction à un sous-intervalle d'une fonction continue. De plus, comme le montre l'expression ci-dessus, la restriction $F|_{[y_k, y_{k+1}[}$ est, elle, la somme de la constante I_k et de la primitive de la fonction continue $\tilde{f}_{(y_k, y_{k+1})}$ qui s'annule en y_k , donc une fonction dérivable, avec

$$\forall x \in]y_k, y_{k+1}[: F'(x) = \tilde{f}'_{(y_k, y_{k+1})}(x) = f(x).$$

Par hypothèse, f admet une limite finie aux bornes de $]y_k, y_{k+1}[$. On peut alors appliquer le théorème de la limite de la dérivée, qui montre que F est dérivable à droite en y_k avec $F'_d(y_k) = \lim_{\substack{x \rightarrow y_k \\ x > y_k}} f(x)$ et dérivable à gauche

en y_{k+1} avec $F'_g(y_{k+1}) = \lim_{\substack{x \rightarrow y_{k+1} \\ x < y_{k+1}}} f(x)$. Cela démontre les deux premiers items du théorème.

Concernant le troisième item, on vient de voir que la fonction F définie par $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ répond bien au cahier des charges. Si G vérifie les mêmes hypothèses, alors $F - G$ est continue et, pour tout segment $[a, b]$ inclus dans I et toute subdivision $\mathcal{S} = (y_k)_{0 \leq k \leq n}$ associée à $f|_{[a,b]}$, $F - G$ est dérivable sur $]y_k, y_{k+1}[$ et de dérivée nulle sur cet intervalle.

Donc $F - G$ est constante sur tous ces intervalles et, comme elle est continue, constante aussi sur $[y_k, y_{k+1}]$, donc constante sur $[a, b]$ et, enfin, constante sur I . Enfin, $F(x_0) = G(x_0)$, donc $F = G$. $\square$

Propriétés. — Toutes les fonctions continues admettent une unique primitive à une constante additive près, données, également à une constante additive près, par une intégrale.

— Dans le cas des fonctions continues par morceaux, ces intégrales $x \mapsto \int_{x_0}^x f$ ne sont pas *stricto sensu* des primitives, mais elles sont bien dérivables et de dérivée f **aux points de continuité de f** .

5. FORMULES DE TAYLOR

Théorème 3. 1. Formule de Taylor-Young. Si $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ est n fois dérivable en a , où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $a \in I$, alors,

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

2. Formule de Taylor avec reste intégral. Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, alors

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

3. Inégalité de Taylor-Lagrange. Sous les mêmes hypothèses,

$$\left| f(b) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}, \quad \text{où } M_{n+1} = \sup_{a \leq t \leq b} |f^{(n+1)}(t)|.$$

Remarque 2. 1. Les hypothèses sont faciles à retenir (pourquoi?) L'existence d'un développement limité à l'ordre 1 en un point est équivalente à la dérivabilité de la fonction en ce point. À un ordre supérieur, ce n'est plus vrai.

2. Par le changement de variable $x = a + h$, on obtient la forme suivante usuelle du développement limité :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

En posant $b = a + h$, puis $t = a + uh$ dans l'intégrale, la formule de Taylor avec reste intégral devient

$$f(a+h) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k = h^{n+1} \int_0^1 \frac{(1-u)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+uh) du.$$

Il n'est pas indispensable de retenir cette dernière forme par cœur.

6. EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

Exercice 13. Pour $x > 0$, on pose $f_{\alpha,\beta}(x) = x^\alpha \sin(x^{-\beta})$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta > 0$.

1. Pour quelles valeurs du couple (α, β) la fonction $f_{\alpha,\beta}$ est-elle prolongeable par continuité en 0? On suppose dans la suite que cette condition est vérifiée et que $f_{\alpha,\beta}$, dûment prolongée, est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

2. Pour quelles valeurs du couple (α, β) la fonction $f_{\alpha,\beta}$ est-elle dérivable en 0? Que vaut alors $f'_{\alpha,\beta}(0)$? La fonction $f_{\alpha,\beta}$ est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

3. Pour quelles valeurs du couple (α, β) la fonction $f_{\alpha,\beta}$ est-elle deux fois dérivable en 0? Pour $n \geq 2$, donner une valeur de (α, β) telle que $f_{\alpha,\beta}$ admette un développement limité à l'ordre n en 0 sans y être deux fois dérivable.

Exercice 14. Soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, continue. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = \exp \int_0^1 f(t) dt.$$

- Exercice 15.** 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'équation $e^x + x = n$ admet une unique solution x_n sur $\mathbb{R}$.
 2. Montrer que la suite $(x_n)_n$ est croissante.
 3. Montrer que

$$x_n = \ln n - \frac{\ln n}{n} - \frac{(\ln n)^2}{2n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln n}{n^2}\right).$$

Exercice 16. On donne $f(x) = xe^x$.

1. Montrer que f définit une bijection de $I =]-1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
 2. Montrer que f^{-1} est bien définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur J .
 3. Donner un développement limité de f^{-1} en 0 à l'ordre 3.
 4. Montrer que $f^{-1}(x) \sim \ln x$ quand x tend vers $+\infty$, puis donner un équivalent de $f^{-1}(x) - \ln x$.

Exercice 17. 1. *Formule de Taylor-Lagrange.*

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a < b$) une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose

$$\varphi_\lambda(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \lambda(b-x)^2.$$

- a. Montrer que l'on peut choisir λ tel que $\varphi_\lambda(a) = 0$.
 b. En déduire qu'il existe $c_2 \in]a, b[$ tel que

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2}f''(c_2).$$

- c. Montrer que si l'on suppose f de classe $\mathcal{C}^n$, alors il existe $c_n \in]a, b[$ tel que

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(c_n).$$

2. *Développement asymptotique du reste de Taylor-Lagrange.*

- a. Sous quelle hypothèse le c_n du reste de Taylor-Lagrange est-il nécessairement unique ?
 b. On fixe $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ une fois pour toutes. La formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n entre x et y peut s'écrire

$$f(y) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(y-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) + \frac{(y-x)^n}{n!} f^{(n)}(c(y)),$$

où $c(y)$ dépend de x , y et n , mais où l'on met en avant la dépendance en y , les autres paramètres étant fixées. On note p le plus petit entier strictement positif tel que $f^{(n+p)}(x) \neq 0$ (on fait l'hypothèse qu'un tel entier existe et que f est suffisamment régulière). Quelle est la limite de $c(y)$ quand y tend vers x ? Trouver un équivalent de $c(y) - x$ quand y tend vers x .

Exercice 18 (Mines). Déterminer les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en 0 telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2: f(x+y) = f(x)e^y + f(y)e^x.$$

Exercice 19. 1. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux (resp. trois) fois dérivable en 0. Calculer

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(h) + f(0)}{h^2} \text{ resp. } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h) - 3f(2h) + 3f(h) - f(0)}{h^3}.$$

2. Montrer que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^r = \begin{cases} (-1)^n n! & \text{si } r = n \\ 0 & \text{si } 0 \leq r < n. \end{cases}$$

Indication : on pourra s'intéresser au comportement en 0 de la fonction $T(x) = (1 - e^x)^n$.

3. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable en 0. Montrer que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(kh) = f^{(n)}(0).$$

Exercice 20. Montrer que $e \notin \mathbb{Q}$.