

Chapitre IV : Réduction des endomorphismes

Tout exercice sur le sujet.

Chapitre V : Intégrales impropres (aucun exercice n'a encore été traité)

- Introduction : intégration des fonctions continues par morceaux sur un segment. Notion générale de fonction continue par morceaux (sa restriction à tout segment l'est).
- Définition d'une intégrale impropre convergente. Intégrales de Riemann (en 0 et en $+\infty$), intégrales d'exponentielles décroissantes et intégrale de la fonction \ln au voisinage de 0.
- Convergence des intégrales faussement impropres.
- Relation de Chasles et indépendance de la borne atteinte : la convergence de $\int_{[a;b[} f$ ne dépend pas du choix de a .

Intégrales doublement impropres : $\int_{]a;b[} f$ converge si et seulement si $\int_{]a;c[} f$ et $\int_{[c;b[} f$ convergent pour un $c \in]a;b[$ (et donc pour tout $c \in]a;b[$).

- Existence d'intégrales sur \mathbb{R}_+ convergentes dont l'intégrande ne tend pas vers 0. Inversement, le fait que l'intégrande tende vers 0 n'entraîne pas la convergence de l'intégrale. En revanche, si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \neq 0$ alors l'intégrale $\int_{\mathbb{R}_+} f$ diverge.
- Propriétés de linéarité (et lien entre l'intégrale de f complexe et celle des ses parties réelles et imaginaires) ; de positivité / croissance.
Si f est continue, positive et d'intégrale nulle alors f est identiquement nulle. Si f n'est que continue par morceaux, f est nulle sauf sur un ensemble discret.
- Calcul d'une intégrale impropre : via une primitive ; théorème de changement de variable (qui assure la convergence de la nouvelle intégrale) ; intégration par parties (licite seulement si le terme intégré admet des limites finies aux bornes, assure alors la convergence du nouveau terme intégral).
- Comparaison d'intégrales de fonctions positives : critère de domination, critère d'équivalence.
- Comparaisons séries/intégrales. Si f est cpm, positive, décroissante, $\sum_{n \geq a} f(n)$ et $\int_{[a;+\infty[} f$ sont de même nature.
Plus précisément, la série $\sum_{n \geq a} f(n) - \int_n^{n+1} f$ converge.
Si f est cpm, positive sur $[a;b[$ et si (x_n) est une suite de limite b , alors $\int_{[a;b[} f$ est de même nature que $(\int_a^{x_n} f)$ donc que $\sum \int_{x_n}^{x_{n+1}} f$.
- Intégrales absolument convergentes. La convergence absolue entraîne la convergence.
Critère de domination général.
- Exemple d'intégrale semi-convergente : intégrale du sinus cardinal.

Questions de cours

- Théorème d'isomorphisme d'un supplémentaire du noyau sur l'image, théorème du rang (dem).
- Expression des polynômes interpolateurs de Lagrange.
- Sommes directes, caractérisation par l'unicité de la décomposition du vecteur nul (dem). Caractérisation en dimension finie.
- Toute matrice inversible à gauche (resp. à droite) est inversible (dem).

- Si A et B sont semblables, alors toute puissance de A (resp. tout polynôme en A) est semblable à la même puissance de B (resp. au même polynôme en B) (dem).
- Polynôme caractéristique d'une matrice compagnon.
- Déterminant de Vandermonde.
- Les sous-espaces propres sont en somme directe (dem).
- Le spectre est inclus dans l'ensemble des racines de tout polynôme annulateur (dem).
- Si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples alors u est diagonalisable et son spectre est inclus dans l'ensemble des racines du polynôme (dem).
- u est diagonalisable si et seulement si χ_u est scindé et pour toute valeur propre λ , on a $m_\lambda = \dim E_\lambda(u)$ (dem).
- Théorème de trigonalisation (énoncé).
- Critère de Riemann pour les intégrales impropres. (dem)
- Théorème de changement de variable pour les intégrales impropres (énoncé précis).