

Feuille d'exercices n°40 : Chapitre 16

Exercice 332. a) Montrer que \mathbb{N}^* est dénombrable.

b) Montrer que l'ensemble des nombres pairs est dénombrable.

c) Montrer que l'ensemble des nombres premiers est dénombrable.

d) Montrer que si $p \in \mathbb{N}^*$ alors $\mathbb{N} \times \llbracket 0; p \rrbracket$ est dénombrable.

e) Montrer que si $\begin{cases} A \text{ et } B \text{ sont dénombrables} \\ A \cap B = \emptyset \end{cases}$, alors $A \cup B$ est dénombrable.

Exercice 333. Dans cet exercice on veut démontrer, par **l'absurde**, que $\Omega = \{0; 1\}^{\mathbb{N}}$ est non-dénombrable.

Supposons que φ est une bijection de \mathbb{N} dans Ω . On note $\varphi(n) = \omega_n$ On a donc $\omega_n \in \Omega$.

On pose $\forall n \in \mathbb{N} \quad \theta_n = 1 - (\omega_n)(n)$.

a) Montrer que $\theta \in \Omega$.

b) En utilisant θ arriver à une absurdité et conclure l'exercice.

Exercice 334. (★)

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de \mathbb{N} dans \mathbb{N} . On définit F sur \mathbb{N} , par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F(n) = f_n(n) + 1$$

Montrer que $F \notin (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ est-il dénombrable ?

Exercice 335. (★★)

Dans cet exercice on veut montrer que \mathbb{R} n'est pas dénombrable. Pour cela on raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{u_n\}$

a) Construire deux suites adjacentes $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \notin [a_n, b_n]$ (on pourra "tricoter")

b) Montrer que \mathbb{R} n'est pas dénombrable.

c) Montrer que $[0, 1[$ n'est pas dénombrable.

Exercice 336. On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

Exercice 337. On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Calculer $\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}$

Exercice 338. Montrer que la famille $(\frac{1}{(p+q+1)^\alpha})_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable pour $\alpha > 2$