Opérateur divergence

- **Divergence** (définition Larousse)

- Situation de deux lignes, de deux rayons qui vont en s'écartant.
- Différence, désaccord entre les opinions, les intérêts des personnes, des groupes
- **Géographie:** Sur un plan horizontal, écartement vers l'extérieur (par rapport à une région donnée) d'un flux d'air ou d'un courant marin.
- **Mathématiques:** Fonction **scalaire** qui, au champ du **vecteur** $\vec{A}(M, t)$ associe la valeur:

$$\operatorname{div} \vec{A}(M, t) = \frac{\partial A_x(M, t)}{\partial x} + \frac{\partial A_y(M, t)}{\partial y} + \frac{\partial A_z(M, t)}{\partial z}$$

Quel sens donner à cette expression... compliquée?

Interprétation

Considérons un volume élémentaire $dV = dx dy dz$ situé en $M = (x, y, z)$

On oriente tous les vecteurs surface vers l'extérieur

On veut exprimer le flux total **sortant** d'un champ vectoriel $\vec{A}$ à travers dV

Rappel sur les flux

- Le flux d'un vecteur $\vec{A}$ (par exemple la vitesse) à travers une surface élémentaire orientée $d\vec{S}$ vaut:

$$d\Phi = \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

- Le flux à travers une surface macroscopique vaut:

$$\Phi = \int d\Phi = \iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

Rappel:

Flux total sortant du volume élémentaire

$$d\Phi_{\text{tot}} = d\Phi_1 + d\Phi_2 + d\Phi_3 + d\Phi_4 + d\Phi_5 + d\Phi_6$$

avec:

$$d\Phi_1 =$$

$$d\Phi_2 =$$

$$d\Phi_3 = \dots$$

$$\begin{aligned} \text{D'où: } d\Phi_{\text{tot}} &= -A_x(x, y, z)dydz + A_x(x + dx, y, z)dydz \\ &\quad - A_y(x, y, z)dx dz + A_y(x, y + dy, z)dx dz \\ &\quad - A_z(x, y, z)dxdy + A_z(x, y, z + dz)dxdy \end{aligned}$$

On reconnaît:

$$\begin{aligned} d\Phi_{\text{tot}} &= \frac{\partial A_x}{\partial x}dxdydz + \frac{\partial A_y}{\partial y}dydxdz + \frac{\partial A_z}{\partial z}dzdxdy \\ &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) dV \\ &= \text{div} \vec{A} dV \end{aligned}$$

- La divergence d'un vecteur en un point M mesure le flux sortant de ce vecteur au point M par unité de volume.

$$\text{div}\vec{A}(M, t) = \frac{d\Phi_{\text{tot}}(M, t)}{dV}$$

Si $\text{div}\vec{A}(M, t) > 0$: le champ diverge au point M,

Si $\text{div}\vec{A}(M, t) < 0$: le champ converge au point M,

Si $\text{div}\vec{A}(M, t) = 0$: le champ ne converge ni ne diverge en M.

- Exemple du vecteur vitesse:

$$\text{div}\vec{v}(M, t) = \frac{d\mathcal{D}_v}{dV}$$

$$\text{div}\vec{v}(M, t) > 0$$

Du fluide sort du volume élémentaire en M: il se dilate en M

$$\text{div}\vec{v}(M, t) < 0$$

Du fluide rentre du volume élémentaire en M: il se comprime en M

$$\text{div}\vec{v}(M, t) = 0$$

Le fluide ne se comprime ni se dilate

Plus de fluide sort de dV qu'il n'en rentre

Champ de divergence positive
présence d'une « source »

Plus de fluide rentre de dV qu'il n'en sort

Champ de divergence négative
présence d'un « puit »

Champs de divergence nulle

Autant de fluide sort de dV qu'il n'en rentre

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from numpy import ma

X, Y = np.meshgrid(np.arange(-2, 2, .4), np.arange(-2, 2, .4))
U = -Y
V = X
plt.figure()
plt.title('Divergence nulle')
Q = plt.quiver(X, Y, U, V, units='width')
qk = plt.quiverkey(Q, 0.9, 0.9, 2, r'$2 \frac{m}{s}$', labelpos='E',
                  coordinates='figure')
plt.savefig('divergence_nul.png')
```

Bien sûr, la divergence n'est pas nécessairement constante.

$$\operatorname{div}\vec{v}(M_3) > 0$$

M_1

M_2

M_3

$$\operatorname{div}\vec{v}(M_1) < 0$$

$$\operatorname{div}\vec{v}(M_2) = 0$$

Expression de la divergence pour les autres systèmes de coordonnées (fournie)

- Coordonnées cylindriques

Si $\vec{A} = A_r(r, \theta, z)\vec{u}_r + A_\theta(r, \theta, z)\vec{u}_\theta + A_z(r, \theta, z)\vec{u}_z$

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

- Coordonnées sphériques

Si $\vec{A} = A_r(r, \theta, \varphi)\vec{u}_r + A_\theta(r, \theta, \varphi)\vec{u}_\theta + A_\varphi(r, \theta, \varphi)\vec{u}_\varphi$

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial(\sin \varphi A_\varphi)}{\partial \varphi}$$

Théorème de Green-Ostrogradski

- Considérons un volume V macroscopique. On le découpe en petits volumes dV .

- Le flux de $\vec{A}$ sortant de chaque petit élément dV vaut: $d\Phi = \text{div}\vec{A}dV$
- Le flux de $\vec{A}$ sortant de la surface fermée S_c délimitant V est la somme de tous ces flux:

$$\Phi_{\text{sortant}} = \iiint_V \text{div}\vec{A}dV$$

- On en déduit le théorème de Green-Ostrogradski:

$$\oiint_{S_c} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div}\vec{A}dV$$

Résumé

- L'opérateur divergence agit sur un **vecteur** et renvoie un **scalaire**.
- En cartésien, l'expression de la divergence vaut:

$$\operatorname{div}\vec{A}(M, t) = \frac{\partial A_x(M, t)}{\partial x} + \frac{\partial A_y(M, t)}{\partial y} + \frac{\partial A_z(M, t)}{\partial z}$$

- La dimension de $\operatorname{div}\vec{A}$ est la dimension de $\vec{A}$ divisée par des mètres.
- $\operatorname{div}\vec{A}(M, t)$ mesure le flux de $\vec{A}$ sortant d'un petit volume situé au point M.
- Le flux de $\vec{A}$ à travers une surface fermée est égale à l'intégrale sur le volume de la divergence de $\vec{A}$

$$\oiint_{S_c} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div}\vec{A} dV$$