

RÉDUCTION

Éléments propres

- Éléments propres d'un endomorphisme, caractérisation des valeurs propres, cas de la dimension finie.
- Éléments propres d'une matrice carrée, caractérisation des valeurs propres, spectre d'une matrice triangulaire
- Lien entre éléments propres d'un endomorphisme et de ses matrices, correspondances vectorielle/matricielle.
- Stabilité des sous espaces propres $E_\lambda(u)$ par v si v commute avec u .
- Liberté d'une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres 2 à 2 distinctes, les sous-espaces propres sont en somme directe.
- Polynômes d'endomorphisme et de matrices carrées :
Si $u(x) = \lambda x$ alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$.
Si P est un polynôme annulateur de u alors $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(P)$.

Polynôme caractéristique

- Polynôme caractéristique d'une matrice carrée, deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique .
 $\chi_A = X^n - (\text{tr } A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$.
Cas des matrices triangulaires ou triangulaires par blocs.
- $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \text{Rac}_{\mathbb{K}}(\chi_A)$, spectre complexe d'une matrice réelle.
- Polynôme caractéristique d'un endomorphisme (E de dim finie), lien avec spectre. Si F stable par u alors χ_{u_F} divise χ_u .
Théorème de Cayley-Hamilton.
- multiplicité d'une valeur propre , $1 \leq m_\lambda \leq \dim E_\lambda(u)$, cas de la valeur propre simple.
(On a utilisé la convention $m_\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda \notin \text{Sp}(u)$).
Cas de la matrice réelle vue comme matrice complexe :
 $m_\lambda = m_{\bar{\lambda}}$, $\dim E_\lambda(u) = \dim E_{\bar{\lambda}}(u)$.
Si χ_u scindé avec $\chi_u = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$ alors

$$\text{tr } u = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda \lambda \quad \det u = \prod_{i=1}^n \lambda_i = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda^{m_\lambda}$$

Diagonalisation

(E $\mathbb{K}$ -ev de dim finie n)

- Diagonalisabilité des endomorphismes et des matrices carrées, lien entre les deux.

Conditions Nécessaires et Suffisantes de diagonalisabilité :

Les propositions suivantes sont équivalentes

- $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable .
- Il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .
- $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$.
- $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = n$
- χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $\dim E_\lambda(u) = m_\lambda$.
- u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples .
- $\prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$ est un polynôme annulateur de u .

Traductions matricielles en remplaçant u, E par $A, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Condition **Suffisante** de diagonalisabilité :

Si u (ou $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) admet n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$ alors u (ou A) est diagonalisable. Cela équivaut à χ_u (ou χ_A) scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$.

L'endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable sur un sous-espace vectoriel stable est diagonalisable.

*Toute colle commencera par une **question de cours double** :*

- Une définition
- Un énoncé de théorème/règle/critère...