

# DM 11 pour le lundi 16 décembre 2024

## Endomorphismes antisymétriques

Soit  $E$  un espace euclidien. On note  $\langle x, y \rangle$  le produit scalaire de deux vecteurs  $x$  et  $y$ .

Soit  $B$  base orthonormée de  $E$  et  $u$  un endomorphisme de  $E$ .

On dit que  $u$  est antisymétrique si et seulement si

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle.$$

On note  $0_{p,q}$  la matrice nulle à  $n$  lignes et  $p$  colonnes.

1. Montrer que  $u$  est antisymétrique si et seulement si  $\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle = 0$ .  
(on considérera  $\langle u(z), z \rangle$  avec  $z$  bien choisi).
2. Montrer que si  $u$  est antisymétrique alors sa matrice dans  $B$  est antisymétrique.
3. Montrer que si la matrice de  $u$  dans  $B$  est antisymétrique alors  $u$  est un endomorphisme antisymétrique.
4. Montrer que l'ensemble  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  des matrices antisymétriques réelles de taille  $n$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Déterminer sa dimension (on pourra commencer par le cas  $n = 3$ ).
5. Montrer que l'ensemble  $\mathcal{A}(E)$  des endomorphismes antisymétriques de  $E$  est un espace vectoriel et préciser sa dimension.  
On suppose dans la suite que  $u$  est antisymétrique.
6. Montrer  $\det(u) = (-1)^n \det(u)$ . En déduire que si  $u$  est bijectif, alors  $E$  est de dimension paire.
7. Montrer que  $\text{Im}(u) \subset \ker(u)^\perp$ . En déduire que  $\text{Im}(u) = \ker(u)^\perp$ .
8. Montrer que si un sous-espace vectoriel  $F$  est stable par  $u$ , alors  $F^\perp$  est stable par  $u$ .
9. Soit un réel  $\lambda$ . Montrer que si  $\lambda$  est valeur propre de  $u$  alors  $\lambda = 0$ . Montrer que  $u \circ u$  est diagonalisable. Montrer que les valeurs propres de  $u \circ u$  sont négatives ou nulles.
10. Que peut-on dire des valeurs propres d'une matrice antisymétrique?
11. Soit  $e$  un vecteur propre de  $u \circ u$  vérifiant  $u(e) \neq 0$ . Montrer que  $G = \text{vect}(e, u(e))$  est un plan vectoriel stable par  $u$ . Montrer que la matrice de l'endomorphisme induit par  $u$  sur  $G$  dans une base orthonormée de  $G$  est de la forme  $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$  et  $a \neq 0$ .
12. Montrer que  $u$  induit sur  $\text{Im}(u)$  un endomorphisme antisymétrique bijectif. En déduire que  $\text{Im}(u)$  est de dimension paire.
13. Dans cette question on suppose que  $u$  est bijectif et  $\dim(E) = 2k$ . Montrer que si  $k \neq 0$ , il existe  $k$  plans vectoriels  $P_1, \dots, P_k$  orthogonaux deux à deux et stables par  $u$  tels que  $E = P_1 \oplus \dots \oplus P_k$ .
14. Montrer qu'il existe une base orthonormée de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  soit diagonale par bloc de la forme  $\begin{pmatrix} 0_{p,p} & & & \\ & D_1 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & D_k \end{pmatrix}$  avec  $0_{p,p}$ , matrice carrée nulle de taille  $p \leq n$  et  $D_i$  matrice carrée de taille 2 de la forme  $\begin{pmatrix} 0 & -a_i \\ a_i & 0 \end{pmatrix}$  et  $a_i \neq 0$ .

## CORRECTION

1.  $(\Rightarrow) : \forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), x \rangle = -\langle x, u(x) \rangle$  donc  $\langle u(x), x \rangle = 0$ .  
 $(\Leftarrow) : \langle u(x+y), x+y \rangle = 0$  or  $\langle u(x+y), x+y \rangle = \langle u(x) + u(y), x+y \rangle = \langle u(x), x \rangle + \langle u(x), y \rangle + \langle u(y), x \rangle + \langle u(y), y \rangle = \langle u(x), y \rangle + \langle u(y), x \rangle$  donc  $u$  est antisymétrique.
2. Soit  $M = \text{mat}_B(u) = (m_{i,j})$ . La base  $B$  est orthonormée donc  $m_{i,j} = \langle u(e_j), e_i \rangle = -\langle e_j, u(e_i) \rangle = -m_{j,i}$  donc  $M$  est antisymétrique.
3. Soit  $X, Y$  vecteurs coordonnés de  $x, y$  dans  $B$ . On a  $\langle u(x), y \rangle = (MX)^T Y = X^T M^T \times Y = -X^T \times MY = -\langle x, u(y) \rangle$  donc  $u$  est un endomorphisme antisymétrique.
4. Soit  $(A, B) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})^2$ . On a  $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T = -(\lambda A + \mu B)$  donc  $\lambda A + \mu B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ . Soit  $A = (a_{i,j})$ . On a  $A = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} a_{i,j} E_{i,j}$ . Si  $A$  est antisymétrique,  $a_{i,i} = 0$  et  $a_{j,i} = -a_{i,j}$  donc  $A = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} - E_{j,i})$  donc la famille  $(E_{i,j} - E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$  est donc génératrice de  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ .  
 De plus, si  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} - E_{j,i}) = 0$ , alors  $A$  est nulle donc  $\forall (i, j), a_{i,j} = 0$  donc la famille  $(E_{i,j} - E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$  est libre donc base de  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  donc  $\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = 1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$ .
5. Soit  $B$  une base orthonormée de  $E$ . L'application  $\varphi : M \mapsto u$  endomorphisme de  $E$  tel que  $M = \text{mat}_B(u)$  est un isomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dans  $\mathcal{L}(E)$  et l'image de  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  par  $\varphi$  est l'ensemble  $\mathcal{A}(E)$  des endomorphismes de  $E$  donc  $\mathcal{A}(E)$  est un espace vectoriel et  $\dim(\mathcal{A}(E)) = \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$ .
6. Soit  $B$  une base orthonormée de  $E$  et  $M = \text{mat}_B(u)$ . On a  $\det(M^T) = \det(-M) = (-1)^n \det(M)$  et  $\det(M^T) = \det(M)$  donc  $\det(u) = (-1)^{\dim(E)} \det(u)$ . Si  $u$  est bijectif, alors  $\det(u) \neq 0$  donc  $(-1)^{\dim(E)} = 1$  donc  $E$  est de dimension paire.
7. Soit  $y \in \text{Im}(u)$ . Montrons que  $y \in \ker(u)^\perp$ , c'est-à-dire que  $\forall z \in \ker(u), \langle y, z \rangle = 0$ .  $y \in \text{Im}(u)$  donc il existe  $x \in E$  tel que  $y = u(x)$  donc  $\langle y, z \rangle = \langle u(x), z \rangle = -\langle x, u(z) \rangle = -\langle x, 0_E \rangle = 0$ . On en déduit que  $\text{Im}(u) \subset \ker(u)^\perp$ . Par ailleurs,  $\dim(\ker(u)^\perp) = n - \dim(\ker(u)) = \dim(\text{Im}(u))$  donc  $\text{Im}(u) = \ker(u)^\perp$ .
8. On suppose que  $F$  est stable par  $f$ . Montrons que  $F^\perp$  est stable par  $f$ . Soit  $x \in F^\perp$ . Montrons  $u(x) \in F^\perp$  c'est-à-dire que  $\forall y \in F, \langle u(x), y \rangle = 0$ . Soit  $y \in F; t y \in F$ . On a  $\langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle = 0$  car  $x \in F^\perp$  et  $y \in F$  donc  $u(y) \in F$ .
9. Soit  $x$  un vecteur propre associé à  $\lambda$ . On a  $\langle u(x), x \rangle = 0$  donc  $\langle \lambda x, x \rangle = \lambda \|x\|^2 = 0$  donc  $\lambda = 0$  (car  $x \neq 0$ ).  
 On a  $\langle u \circ u(x), y \rangle = -\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, u \circ u(y) \rangle$  donc  $u \circ u$  est un endomorphisme symétrique donc diagonalisable. Soit  $x$  un vecteur propre de  $u \circ u$  associé à  $\lambda$ . On a  $\langle u \circ u(x), x \rangle = -\langle u(x), u(x) \rangle = -\|u(x)\|^2$  et  $\langle u \circ u(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \|x\|^2$  donc  $\lambda \leq 0$ . On a  $u \circ u$  endomorphisme symétrique et  $\text{sp}(u \circ u) \subset \mathbb{R}_-$  donc  $M^2 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et
10. On a  $\dim(G) = 2$ : sinon on aurait  $u(e) = \lambda e$  et donc  $\lambda = 0$  donc  $u \circ u(e) = 0_E$ . De plus  $u(e) \in G$  et  $u(u(e)) = \mu e \in G$  donc  $G$  est stable par  $u$ . On note  $v$  l'endomorphisme induit par  $u$  sur  $G$  et  $b$  une base orthonormée de  $G$ . L'endomorphisme  $v$  est antisymétrique donc  $\text{mat}_b(v)$  est antisymétrique donc de la forme  $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$  avec  $a \neq 0$  car  $v \neq 0$ .
11. Le sous-espace  $\text{Im}(u)$  est stable par  $u$  (classique) On note  $w$  l'endomorphisme (antisymétrique) induit par  $u$  sur  $\text{Im}(u)$ . On a  $\ker(w) = \text{Im}(u) \cap \ker(u) = \text{Im}(u) \cap \text{Im}(u)^\perp = \{0\}$  donc  $w$  est un bijectif ( $\text{Im}(u)$  est de dimension finie). D'après Q6 appliqué à  $w$ ,  $\text{Im}(u)$  est de dimension paire.
12. Montrer par récurrence sur  $k$  qu'il existe  $k$  plans vectoriels  $P_1, \dots, P_k$  stables par  $u$  tels que  $E = P_1 \oplus \dots \oplus P_k$ .  
 Si  $k = 1$ ,  $E = P_1$  est un plan vectoriel stable par  $u$ . Supposons la propriété vraie pour  $k-1$  et  $E$  de dimension  $2k$ . Soit  $e$  un vecteur propre de  $u \circ u$ . Le sous-espace  $P_1 = \text{vect}(e, u(e))$  est un plan stable par  $u$ . Le sous-espace  $P_1^\perp$  est aussi stable par  $u$ . En appliquant l'hypothèse de récurrence à l'endomorphisme induit par  $u$  sur  $P_1^\perp$  (de dimension  $2k-2$ ), il existe des plans vectoriels orthogonaux deux à deux stables par  $u$ ,  $P_2, \dots, P_k$  tels que  $P_1^\perp = P_2 \oplus \dots \oplus P_k$ . On a  $E = P_1 \oplus P_1^\perp = P_1 \oplus \dots \oplus P_k$  et su  $i \geq 2, P_1 \perp P_i$  car  $P_i \subset P_1^\perp$ .

13. On a  $E = \ker(u) \oplus \text{Im}(u)$ . On peut appliquer Q13 à l'endomorphisme  $w$  (cf Q12):  $\text{Im}(u) = P_1 \oplus \cdots \oplus P_k$ . donc  $E = \ker(u) \oplus P_1 \oplus \cdots \oplus P_k$ . En juxtaposant des BON de ces sous-espaces vectoriels, on obtient une BON  $B$  de  $E$  dans laquelle la matrice de  $u$  est diagonale par bloc de la forme voulue.