

DM 12 – Révisions de sup

Principe Chacun de ces exercices, sujets de concours d'écrit ou d'oral des années précédentes, ou exercices importants, utilisent des **notions de sup**, notamment en **analyse**, ou bien sur les **complexes et les polynômes** (ce sont les points de sup que nous revoyons moins en spé).

1 Complexes et polynômes

1.1 Écrit

Exercice 1. *Écrit Mines 22.* **Définition.** Un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ est dit polynôme de Hurwitz si ses racines dans \mathbb{C} appartiennent à $\Re^- = \{z \in \mathbb{C} / \Re(z) < 0\}$.

Définition. Un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ est dit à coefficients strictement positifs s'il est non nul et si, d désignant son degré, $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ où, pour tout $k \in [0, d]$, $a_k > 0$.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Démontrer que si α est une racine d'un polynôme P de $\mathbb{R}[X]$, à coefficients strictement positifs, alors $\alpha < 0$.
2. Démontrer que tout diviseur d'un polynôme de Hurwitz est un polynôme de Hurwitz.
3. Soit P un polynôme de Hurwitz de $\mathbb{R}[X]$ irréductible et à coefficient dominant positif. Démontrer que tous les coefficients de P sont strictement positifs.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $(z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$. On définit les deux polynômes $P(X)$ et $Q(X)$ de $\mathbb{C}[X]$ par :

$$P(X) = \prod_{k=1}^n (X - z_k) \quad \text{et} \quad Q(X) = \prod_{(k,l) \in [1;n]^2} (X - z_k - z_l)$$

4. On suppose $n = 2$ et $P \in \mathbb{R}_2[X]$. Si les coefficients de Q sont strictement positifs, P est-il alors un polynôme de Hurwitz ?
5. Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ dont tous les coefficients sont strictement positifs. Démontrer que les coefficients du produit AB sont également strictement positifs.
6. Démontrer que si P et Q sont dans $\mathbb{R}[X]$, alors on a l'équivalence : P est un polynôme de Hurwitz si et seulement si les coefficients de P et Q sont strictement positifs.

1.2 Oral

Exercice 2. *Mines-Ponts 22.* Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré au moins 2 .

1. On suppose que P est de la forme $P = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)^{\alpha_k}$, où les λ_k sont dans \mathbb{R} et les α_k dans

$$\mathbb{N}^*. \text{ Montrer que } \frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{X - \lambda_k}.$$

2. On suppose que P est scindé sur \mathbb{R} . Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $P'(x) = 0$ et $P(x) \neq 0$. Montrer que $P''(x)P(x) < 0$.
3. Soient x_1 et x_2 deux racines consécutives de P . Montrer que $P'(x_1)P'(x_2) \leq 0$.
4. Soient a et b des réels distincts tels que $P - a$ et $P - b$ sont scindés sur \mathbb{R} . Montrer que P' est scindé sur \mathbb{R} à racines simples.

Exercice 3. *Mines-Telecom 22.* Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$.

Exercice 4. *Centrale 22.* Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $P = X^3 + \omega X^2 - \bar{\omega}X - 1$.

1. Préciser le nombre de racines réelles de P en fonction de ω .
2. Montrer que P admet au moins une racine de module 1.
3. Vérifier que, pour toute racine z de P , $|z| \leq 1 + |\omega|$.

Exercice 5. *Centrale 21.* 1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 2$ simplement scindé sur \mathbb{R} . Montrer que P' est simplement scindé.

2. Le polynôme $8X^8 + 7X^7 + 4X^4 + 3X^3 + 2019X^2 + 2018X + 666$ est-il simplement scindé sur \mathbb{R} ?

Exercice 6. *Mines PC 22.* Soit n un entier impair plus grand que 3. On pose $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \frac{1 - \omega^k}{1 + \omega^k}$ et en déduire la valeur de $\prod_{k=1}^{n-1} \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

2 Analyse réelle

2.1 Écrit

Exercice 7. *Écrit Centrale 2020.* Dans cette partie, on définit les fonctions de Lambert et on étudie certaines de leurs propriétés. On considère, dans toute cette partie, l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & xe^x \end{cases}$$

1. Justifier que l'application f réalise une bijection de l'intervalle $[-1, +\infty[$ sur l'intervalle $[-e^{-1}, +\infty[$.

Dans la suite du sujet, la réciproque de cette bijection est notée W . On rappelle que ceci signifie que, pour tout réel $x \geq -e^{-1}$, $W(x)$ est l'unique solution de l'équation $f(t) = x$ (équation d'inconnue $t \in [-1, +\infty[$).

2. Justifier que W est continue sur $[-e^{-1}, +\infty[$ et est de classe \mathcal{C}^∞ sur $]-e^{-1}, +\infty[$.
3. Expliciter $W(0)$ et $W'(0)$.
4. Déterminer un équivalent de $W(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$ ainsi qu'un équivalent de $W(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
5. Tracer, sur le même dessin, les courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_W représentatives des fonctions f et W . Préciser les tangentes aux deux courbes au point d'abscisse 0 ainsi que la tangente à \mathcal{C}_W au point d'abscisse $-e^{-1}$.
6. Démontrer que l'application f réalise une bijection de l'intervalle $]-\infty, -1]$ sur l'intervalle $[-e^{-1}, 0[$. Dans la suite du sujet, la réciproque de cette bijection est notée V .
7. Pour un paramètre réel m , on considère l'équation (1) d'inconnue $x \in \mathbb{R} : xe^x = m$. Déterminer, en fonction de m , le nombre de solutions de (1). Expliciter les solutions éventuelles à l'aide des fonctions V et W .
8. Pour un paramètre réel m , on considère l'inéquation (2) d'inconnue $x \in \mathbb{R} : xe^x \leq m$. En utilisant les fonctions V et W , déterminer, suivant les valeurs de m , les solutions de (2). Illustrer graphiquement les différents cas.
9. Pour des paramètres réels non nuls a et b , on considère l'équation (3) d'inconnue $x \in \mathbb{R} : e^{ax} + bx = 0$. Déterminer, suivant les valeurs de a et b , le nombre de solutions de (3). Expliciter les solutions éventuelles à l'aide des fonctions V et W .

Exercice 8. Écrit CCINP 24. Soient $a > 0$ et $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \exp(a(x-1)) \end{cases}$. On s'intéresse au comportement de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$z_1 \in]0, 1[\quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, z_{n+1} = f(z_n).$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $z_n \in]0, 1[$ et $z_{n+1} - z_n$ est du même signe que $z_2 - z_1$.
2. En déduire que $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers une limite $\ell \in [0, 1]$ vérifiant $f(\ell) = \ell$.
3. Soit la fonction $\psi : \begin{cases}]0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(x) - a(x-1) \end{cases}$.
Montrer que pour tout $x > 0$, on a : $0 \leq \psi(x) \Leftrightarrow f(x) \leq x$ et $\psi(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = x$.
4. On suppose dans cette question que $a \leq 1$. Étudier le signe de ψ et montrer qu'elle ne s'annule qu'en $x = 1$. En déduire que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.
5. On suppose dans cette question que $a > 1$. Étudier le signe de ψ et montrer que l'équation $f(x) = x$ d'inconnue $x \in [0, 1]$ admet exactement deux solutions α et 1 avec $\alpha \in]0, 1[$ qu'on ne cherchera pas à expliciter. En distinguant les cas $z_1 \in]0, \alpha]$ et $z_1 \in]\alpha, 1[$, montrer que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \alpha$.

2.2 Oral

Exercice 9. CCINP 23. Soit $f : x \mapsto [x] + (x - [x])^2$. Étudier la continuité de f sur \mathbb{R} .

Exercice 10. CCINP 22. Soient $x \in]0, 4[$ et $w = \text{Arcsin}\left(\frac{x}{2} - 1\right) + \frac{\pi}{2}$.

1. Montrer que $\cos(w) = 1 - \frac{x}{2}$.
2. Montrer que $\cos\left(\frac{w}{2}\right)$ et $\sin\left(\frac{w}{2}\right)$ sont positifs.
3. Montrer que $\cos\left(\frac{w}{2}\right) = \frac{\sqrt{4-x}}{2}$ et $\sin\left(\frac{w}{2}\right) = \frac{\sqrt{x}}{2}$.
4. Montrer que $\text{Arcsin}\left(\frac{x}{2} - 1\right) + \frac{\pi}{2} = 2 \text{Arctan}\left(\sqrt{\frac{x}{4-x}}\right)$.

Exercice 11. Mines-Telecom 22. Soit $f : x \mapsto x + \ln(1+x)$.

1. Montrer que f est un bijection de son ensemble de définition sur un intervalle à préciser. On note g la bijection réciproque.
2. Donner $g(0)$ et $g'(0)$.
3. Montrer que g admet un développement limité à tout ordre en 0.
4. Calculer le développement limité de g à l'ordre 3 en 0.

Exercice 12. Navale 23. Soit $f : x \mapsto \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)}$. Préciser le domaine de définition et de continuité de f . Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et 1.

Exercice 13. Mines-Telecom 23. Soit $S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}$. Déterminer un équivalent de S_n par comparaison avec des intégrales, puis en utilisant des sommes de Riemann.

Exercice 14. Mines-Telecom 21. 1. Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x - \ln x = n$ admet une unique solution $x_n \in]0, 1]$.

2. Montrer que $x_n \rightarrow 0$ puis que $x_n \sim e^{-n}$.
3. Obtenir un développement asymptotique de x_n .

Exercice 15. *Mines-Telecom 21.* 1. Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\sum_{k=1}^n x^k = 1$ admet une unique solution dans $[0, 1]$. On la note a_n .

2. Montrer que la suite (a_n) est décroissante et minorée par $1/2$.
3. Montrer que la suite (a_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 16. *Centrale 21.* Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant tel que $P(X^2) = P(X)P(X-1)$.

1. Soit ω une racine de P . Montrer que ω^2 est aussi racine de P .
2. Montrer que les racines de P sont soit nulles, soit de module 1.
3. Montrer que 0 n'est pas racine de P .
4. Déterminer les polynômes solutions.

Exercice 17. *Mines-Ponts 23.* Soient $\varphi \in \mathcal{C}^1([0, 1], [0, 1])$ et $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $x \in [0, 1]$, $|\varphi'(x)| < 1$. Calculez $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(\varphi^n(x)) dx$, où $\varphi^n = \varphi \circ \dots \circ \varphi$.