

TD 23 : ESPACES VECTORIELS NORMÉS

PSI 1 2022-2023

vendredi 17 mars 2023

23.1 Centrale PSI 2012

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\|_\infty = \max_{k \in \mathbb{N}} |a_k|$ si $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$. Soit aussi l'application $\|\cdot\|_1 : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $\|P\|_1 = \sup_{-1 \leq t \leq 1} |P(t)|$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, on définit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ par : $\forall P \in E, f(P) = P(x_0)$.

a. Justifier que $\|\cdot\|_1$ est aussi une norme sur E . Est-elle équivalente à $\|\cdot\|_\infty$?

Dorénavant, pour $n \in \mathbb{N}$, on note f_n la restriction de f à $E_n = \mathbb{R}_n[X]$.

b. Dans $(E_n, \|\cdot\|_\infty)$, calculer $u_n = \|\|f_n\|\|_\infty = \sup_{P \in E_n, \|P\|_\infty=1} |f_n(P)|$ en fonction de x_0 . Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

c. On définit $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $T_0 = 1, T_1 = X$ et $\forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$ (ce sont les fameux polynômes de Tchebychev). Prouver que : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$ et $T_n(\operatorname{ch}(x)) = \operatorname{ch}(nx)$.

d. Dans $(E_n, \|\cdot\|_1)$, on pose $v_n = \|\|f_n\|\|_1 = \sup_{P \in E_n, \|P\|_1=1} |f_n(P)|$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ en fonction de x_0 .

23.2 Mines PSI 2010 d'après RMS

On munit $E = C^0([0; 1], \mathbb{R})$ de la norme de la convergence uniforme $\|\cdot\|_\infty$.

Soit T l'application qui à $f \in E$ associe $T(f) : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $T(f)(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right)$.

a. Montrer que T est continu. Déterminer la constante α optimale telle que $\forall f \in E, \|T(f)\|_\infty \leq \alpha \|f\|_\infty$.

b. Soit $f \in E$ non nulle telle que $f(0) = 0$. Montrer que : $\exists x_0 \in]0; 1], \forall x \in [0; x_0[, |f(x)| < |f(x_0)| = \|f\|_\infty$.

c. En déduire que l'espace propre de T associé à la valeur propre 2 est de dimension 1.

23.3 ENS Cachan PSI 2016 Romain Morgavi

a. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $|\lambda| < 1$, montrer que $\int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{1 + \lambda e^{i\theta}} d\theta = 0$.

b. Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$ et $a \in \mathbb{C}$. Supposons que Q ne possède aucune racine dans $D(a, r)$ (disque fermé de centre a et de rayon r) avec $r > 0$. Montrer que $I(Q) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{Q'(a + re^{i\theta})}{Q(a + re^{i\theta})} re^{i\theta} d\theta = 0$.

c. Que vaut $I(Q)$ si Q ne possède que a comme racine dans $D(a, r)$ d'ordre de multiplicité m ?

Soit $(P_k)_{k \geq 0} \in (\mathbb{R}_n[X])^{\mathbb{N}}$ une suite de polynômes scindés dans \mathbb{R} convergeant vers P . Le but est de montrer que P est scindé dans \mathbb{R} . Supposons par l'absurde que $\exists a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, P(a) = 0$. Posons $r > 0$.

d. Montrer que $P \mapsto \|P\| = \max_{z \in D(a, r)} |P(z)|$ est une norme sur $\mathbb{R}_n[X]$.

e. Montrer qu'il existe une constante M telle que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \|P'\| \leq M \|P\|$.

Soit $C(a, r)$ le cercle de centre a et de rayon r et posons $\mu = \min\{|P(z)| \mid z \in C(a, r)\}$.

f. Montrer que $\exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0, \forall z \in C(a, r), |P_k(z)| \geq \frac{\mu}{2}$.

g. Montrer que $\forall k \geq k_0, \frac{2\pi}{r} |I(P_k) - I(P)| \leq \frac{2}{\mu^2} \cdot (2\pi) \cdot (\|P'\| + M \|P\|) \|P - P_k\|$ et conclure.

23.4 *Centrale Maths1 PSI 2018* Maëlle Casas

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de A de multiplicités au moins égales à 1. On suppose que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers une matrice $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- Que peut-on dire sur les valeurs propres de A ?
- Donner un polynôme annulateur P de degré p de A .
- Soit Q un polynôme annulateur de A . Montrer que toute valeur propre de A est racine de Q .

En déduire que (I_n, A, \dots, A^{p-1}) est libre.

- Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, \exists P_k \in \mathbb{C}_{p-1}[X], A^k = P_k(A)$.
- Montrer qu'il existe un polynôme $U \in \mathbb{C}[X]$ tel que $L = U(A)$.

23.5 *Mines PSI 2018* Titouan Sancier I

Soit $E = \{f \in C^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_+^*) \mid f \text{ bijective et } f' = f^{-1}\}$.

- Trouver une fonction $f \in E$ de la forme $f : x \mapsto cx^\alpha$ où c et α sont réels.
- Soit $f \in E$, donner la limite de f en 0. Prouver que f et f^{-1} sont de classe C^∞ sur \mathbb{R}_+^* .
- Montrer que $f \in E$ admet un unique point fixe sur \mathbb{R}_+^* .

23.6 *X PSI 2021* Clément Lopez II

- Montrer que la fonction \cos admet un unique point fixe sur \mathbb{R} .
- Montrer qu'il n'existe aucune fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f \circ f = \cos$.

23.7 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et la partie $S = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) = n \text{ et } P \text{ scindé à racines simples dans } \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{R}_n[X]$.

Soit $P \in S$ et $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$ ses n racines distinctes réelles. On suppose que le coefficient dominant de P est strictement positif (le cas $\text{dom}(P) < 0$ est similaire). On se donne aussi des réels β_0, \dots, β_n tels que

$\beta_0 < \alpha_1 < \beta_1 < \dots < \beta_{n-1} < \alpha_n < \beta_n$.

- Déterminer les signes de $P(\beta_k)$ pour $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$.
- Que dire des applications $\varphi_k : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $\varphi_k(P) = P(\beta_k)$ pour $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$?
- En considérant $\varphi_0^{-1}((-1)^n \mathbb{R}_+^*) \cap \dots \cap \varphi_{n-1}^{-1}(\mathbb{R}_-^*) \cap \varphi_n^{-1}(\mathbb{R}_+^*)$, que dire de l'aspect topologique de S ?