

ÉNONCÉS EXERCICES CORRIGÉS 1

SÉRIES NUMÉRIQUES

1.1 Séries à termes positifs

- 1.1** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}, x_n = 1 - u_n$. Étudier la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Trouver $k \in]0; 1[$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} \leq kx_n$. En déduire la nature de $\sum_{n \geq 0} x_n$.
- 1.2** Mines PSI 2008 d'après RMS On suppose que la série de terme général $a_n > 0$ est divergente. Soit, pour tout entier $n, S_n = a_0 + \dots + a_n$ et $b_n = \frac{a_{n+1}}{S_n}$. Déterminer la nature de la série de terme général b_n .
- 1.3** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive telle que la série de terme général u_n converge. Étudier la nature des séries de termes généraux $\frac{u_n}{R_n}$ et $\frac{u_n}{R_{n-1}}$.
- 1.4** Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ décroissante de réels positifs telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- a. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, trouver une relation simple entre $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ et $T_n = \sum_{k=1}^n k(u_k - u_{k+1})$. En déduire que $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} n(u_n - u_{n+1})$ sont de même nature et que, quand elles convergent, elles ont la même somme.
- b. En déduire l'existence et la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)^2}$.
- 1.5** Soit $a > 0$, on pose $u_n = n! \prod_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{a}{n}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- a. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ quand $a \neq 1$?
- b. Montrer que : $\forall x \in]0; 1], \ln(1+x) \geq x - x^2$.
- c. En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ quand $a = 1$.
- 1.6** Centrale PSI 2012 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $b_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} = b_n + \frac{a_n}{b_n}$.
- a. Justifier que si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge (dans $\mathbb{R}$) alors on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
- b. Montrer que : $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge $\iff \sum_{n \geq 0} a_n$ converge.
- 1.7** Règle de DUHAMEL-RAABE Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs.
- a. Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ avec $\alpha > 1$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- b. Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ avec $\alpha < 1$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.
- c. Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ alors $\exists A \in \mathbb{R}, u_n \sim_{+\infty} \frac{A}{n^\alpha}$.
- d. Nature de la série de terme général $u_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$.

1.8 Soit deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de termes strictement positifs telles que les $a_n \sim_{+\infty} b_n$.

On suppose que la série $\sum_{n \geq 0} a_n$ est divergente, montrer que $\sum_{k=0}^n a_k \sim_{+\infty} \sum_{k=0}^n b_k$.

1.9 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs.

a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{u_n}{1 + u_n}$, montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature.

b. Même question avec $v_n = \frac{u_n}{u_1 + \dots + u_n}$. On pourra étudier $\ln(1 - v_n)$ dans le cadre de la divergence.

1.10 X MP Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle strictement positive, décroissante, de limite nulle. On suppose que la

suite de terme général $v_n = \left(\sum_{k=1}^n u_k \right) - nu_n$ est bornée. Montrer que la série de terme général u_n converge.

Indication : montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge, puis s'intéresser au reste de la série $\sum_{n \geq 1} (u_n - u_{n+1})$.

1.11 Mines PSI 2007 d'après RMS Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ définie par : $x_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}$.

Donner un équivalent de x_n quand $n \rightarrow +\infty$.

1.12 Centrale PSI 2012 On se donne la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 \in \mathbb{R}$ et : $\forall n \geq 0$, $u_{n+1} = u_n^2 + u_n$.

a. Étudier le comportement de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ selon les valeurs de u_0 .

b. Soit $u_0 \in]-1; 0[$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right)$ pour déduire avec l'exercice 8.3 un équivalent de u_n .

Dorénavant, on se place dans le cas où $u_0 > 0$ et on pose, pour tout entier n , le réel $v_n = \frac{1}{2^n} \ln(u_n)$.

c. Étudier la monotonie de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et justifier que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n \leq \frac{1}{2^{n+1}u_0}$.

En déduire que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel $\alpha > 0$.

d. Montrer que si $p \in \mathbb{N}$ est fixé : $\forall n \geq p$, $v_n - v_p \leq \frac{1}{2^p u_p}$. En déduire que $u_n \sim_{+\infty} e^{2^n \alpha}$.

1.13 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in]0; \frac{\pi}{2}[$ et $u_{n+1} = \sin(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0. Que peut-on dire de la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$?

b. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n^3$ converge.

c. Exploiter $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$ pour montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n^2$ diverge.

d. Déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$ grâce à CESARO.

1.14 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et $u_{n+1} = 1 - e^{-u_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

a. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0. Que peut-on dire de la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$?

b. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n^2$ converge.

c. Exploiter $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$ pour montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

d. Déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$ grâce à CESARO.

1.15 Critère de CAUCHY Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à termes positifs, on suppose que $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}^+$.

a. Montrer que si $\ell > 1$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ est divergente.

b. Montrer que si $\ell < 1$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ est convergente.

c. Observer que, lorsque $\ell = 1$, on ne peut rien conclure.

1.16 Soit $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ une application bijective.

- Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sigma(n)^2}$.
- Même question pour $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sigma(n)}$.

1.17 *Centrale PSI 2013* Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{1}{n^a} \int_0^n \frac{\text{Arctan}(t)}{t^b} dt$ quand cette intégrale existe.

- Déterminer les réels b tels que u_n existe pour tout entier $n \geq 1$.
- Dans les cas précédents, déterminer la nature de la série numérique $\sum_{n \geq 1} u_n$.

1.2 Séries à termes quelconques

1.18 *Centrale PSI 2012* Dans tout cet exercice, on se donne deux réels α et β .

- À quelle condition la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha}$ converge ? Si c'est le cas, quel est le signe de $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha}$?
- À quelle condition la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\beta}$ converge ? Si c'est le cas, montrer que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\beta} \sim \frac{1}{(\beta-1)n^{\beta-1}}$.
- Sous ces conditions, quand la série de terme général $w_n = \frac{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\beta}}{\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha}}$ converge-t-elle ?

1.19 Soit z_n le terme général d'une série complexe convergente ; établir que $\sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n}$ est convergente.

1.20 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $T_n = \sum_{k=1}^n \sin(k)$ et $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k}$.

Montrer que $(T_n)_{n \geq 1}$ est bornée et en déduire que $(S_n)_{n \geq 1}$ converge.

1.21 Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$.

- Montrer que $\forall n \geq 0$, $R_n + R_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$. En déduire un équivalent de R_n en $+\infty$.
- Donner la nature de la série de terme général R_n .

1.22 Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ positives telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{1+n^2 u_n}$.

Montrer que si la série de terme général v_n converge alors la série de terme général u_n diverge.

1.3 Calcul de somme

1.23 *Centrale PSI 2012* On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, le réel : $u_n = \frac{1}{n} \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right)$.

- Justifier que les deux séries $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} (u_{3n-2} + u_{3n-1} + u_{3n})$ ont même nature.
- Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la quantité $\sum_{k=1}^{3n} u_k$ en fonction de H_{3n} et H_n .
- En déduire l'existence et la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

1.24 Calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $u_n = -\frac{2}{n}$ si $n \equiv 0[3]$ et $u_n = \frac{1}{n}$ sinon.

1.25 Justifier l'existence et calculer la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(2n-1)}$.

1.26 *Centrale PSI 2012* On note $d(n)$ le nombre de chiffres de l'écriture de n en base 10.

a. Montrer que $d(n) = \left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(10)} \right\rfloor + 1 = \lfloor \log_{10}(n) \rfloor + 1$. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{d(n)}{n(n+1)}$ converge.

b. Déterminer la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d(n)}{n(n+1)}$.

1.27 *Centrale PSI 2012* Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$. Indication : utiliser la formule de STIRLING.

1.28 *CCP PSI 2007 d'après RMS* Convergence et somme de : $\sum_{n \geq 1} \frac{\lfloor \sqrt{n+1} \rfloor - \lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n}$.

1.29 *CCP PSI 2008 d'après RMS* Soit $R_n = \sum_{k \geq n+1} \frac{1}{k!}$. Montrer que $R_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(n+1)!}$.

Calculer $\sum_{n=0}^p R_n$ puis $\sum_{n=0}^{\infty} R_n$.

1.30 *Mines MP*

Convergence puis calcul de la somme de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}$.

1.4 Séries alternées

1.31 Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 0} u_n$ pour $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n + (-1)^n)}$.

1.32 Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 0} u_n$ pour $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n) + (-1)^n}$.

1.33 *Centrale PSI 2012* Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}_n$ le polygone régulier délimité par les racines complexes n -ièmes de l'unité, puis u_n le demi-périmètre de $\mathcal{P}_n$ et a_n l'aire du domaine délimité par $\mathcal{P}_n$.

Déterminer la nature des séries $\sum_{n \geq 1} n \sin(u_n + n\pi)$ et $\sum_{n \geq 1} n^\alpha \cos\left(\frac{a_n}{2}\right)$.

1.34 *INT PSI 2007 d'après RMS* On considère la suite (u_n) définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et par la relation suivante :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{(-1)^n \cos(u_{n-1})}{n}$. Nature de la série de terme général u_n ?

1.35 *Mines MP* Nature de la série de terme général $\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^a} \right)$ où $a > 0$.

1.36 *Mines MP* Nature de la série de terme général $u_n = \ln \left(\frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{\sqrt{n} + a} \right)$ où $a \in \mathbb{R}_+^*$.

1.37 *CCP PSI 2010 d'après RMS* Nature selon $a \in \mathbb{R}^*$ de la série de terme général $u_n = (n+2)^a - 2(n+1)^a + n^a$?

1.38 Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ si $u_n = \frac{(-1)^n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + (-1)^{n-1}}$.

1.39 *Centrale PSI 2012*

Soit $\alpha > 0$, on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$.

Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$.

1.5 Comparaison série-intégrale

1.40 Soit $\alpha > 1$, on pose $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. On définit aussi $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ et $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

a. Justifier l'existence (et les valeurs) des limites de $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(R_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Rappeler $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ si $\alpha = 2$.

b. Trouver par comparaison série-intégrale un équivalent de R_n quand n tend vers $+\infty$.

c. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{R_n}{S_n}$?

1.41 Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^\alpha}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

Même question avec la série de terme général $(-1)^n u_n$.

1.42 Pour $\alpha > 1$, on pose $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha}$ et $R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$. Étudier, selon α , la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{R_n}{S_n}$.

1.43 *Centrale MP* On pourra introduire dans ce qui suit la fonction $f : t \mapsto \frac{\ln t}{t}$.

a. Donner un développement asymptotique à deux termes de $u_n = \sum_{p=2}^n \frac{\ln p}{p}$.

b. À l'aide de la constante d'EULER, calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$.

1.44 *X MP* Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive et strictement croissante.

Déterminer la nature de la série de terme général $\frac{u_{n+1} - u_n}{u_n}$.

1.45 Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ si $u_n = \frac{(-1)^n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + (-1)^{n-1}}$.

1.6 Produit de Cauchy

1.46 Établir que $e \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{n!}$ si $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1.47 Existence et calcul de $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)3^{-n}$.

1.48 Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Montrer que les séries $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} v_n$ convergent.

Montrer la divergence de la série produit de CAUCHY des séries $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} v_n$.

1.7 Exercices aux oraux des étudiants de PSI1

1.49 X-Cachan PSI 2013 Adrien

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs, $b_n = a_n \sum_{k=0}^n a_k$ et $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$.

a. Montrer que $\sum_{n \geq 0} a_n$ diverge et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

b. Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle, a-t-on toujours $c_n \sim_{+\infty} c_{n+1}$? Montrer que $S_n \sim_{+\infty} S_{n+1}$.

c. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_{n+1}^2 - S_n^2) = 2$.

d. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles positives telles que $u_n \sim_{+\infty} v_n$ et $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

Montrer alors que $\sum_{k=0}^n u_k \sim_{+\infty} \sum_{k=0}^n v_k$. En déduire que $a_n \sim_{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

e. Réciproquement, soit une suite réelle $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $c_n \sim_{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2n}}$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n \sum_{k=0}^n c_k = 1$.

f. Que se passe-t-il si, avec ces hypothèses, on suppose que $b_n = a_n \sum_{k=0}^n a_k^\alpha$?

1.50 Centrale PSI 2013 Gérémy

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note c_n le nombre de ces chiffres en base 10.

a. Nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{c_n}}{n}$.

a. Nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{c_n}}{n \ln(n)}$.

1.51 Mines PSI 2013 Pierre-Simon

Caractériser la convergence de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ avec $u_n = \sum_{i=1}^n (n^2 + i^2)^\alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.

1.52 CCP PSI 2013 Camille

Étudier la convergence de $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \frac{\text{Arctan}(n)}{\sqrt{n} \ln(n)^a}$ où a est un réel positif.

1.53 Mines PSI 2014 Tanguy Sommet

Soit $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et on définit pour $p \in \mathbb{N}^*$ l'entier $n_p = \text{Min}(\{n \in \mathbb{N}^* \mid H_n \geq p\})$.

Donner un équivalent de n_p quand p tend vers $+\infty$.

Bonus : comment démontre-t-on que $H_n \underset{+\infty}{=} \ln(n) + \gamma + o(1)$?

1.54 E3A PSI 2014 Aymeline

a. Donner un développement asymptotique à l'ordre 2 de u_n définie par $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln(k)}{k}$.

b. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

c. (pas dans la planche) À l'aide de la constante d'EULER, calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$.

1.55 Centrale Maths1 PSI 2015 Marin De Bonnières

a. Soit $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ qui tend vers 0. On définit $\beta_n = \prod_{k=1}^n (1 + \alpha_k)$.

La suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$ est-elle nécessairement convergente ?

b. On pose $u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}\right)$. Prouver que $(u_n)_{n \geq 1}$ converge.

c. On pose $v_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right) - \ln(n)$. Montrer que $(v_n)_{n \geq 1}$ converge.

d. Convergence de $\sum_{n \geq 1} u_n$? Indication : on pourra trouver un équivalent de u_n .

1.56 Mines PSI 2015 TERENCE BURCELIN

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, étudier la convergence de $\sum_{n \in A} \frac{1}{n^\alpha}$ où A est l'ensemble des entiers n dont l'écriture en base 10 ne contient pas le chiffre 5.

1.57 Mines PSI 2015 Arnaud Dubessay

Nature, selon $a \in \mathbb{R}$, de $\sum_{n \geq 1} a^{\lfloor \ln n \rfloor}$.

1.58 Mines PSI 2015 Guillaume Leroy

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs.

a. Si la série $\sum_{n \geq 1} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ converge, montrer que $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.

b. Si la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge, soit $\lambda \in]1; +\infty[$, en considérant les ensembles $I = \{n \in \mathbb{N}^* \mid a_n^{1-\frac{1}{n}} \leq \lambda a_n\}$ et

$J = \{n \in \mathbb{N}^* \mid a_n^{1-\frac{1}{n}} > \lambda a_n\}$, montrer que $\sum_{n \geq 1} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ converge et majorer sa somme en fonction de λ .

c. Que dire des séries $\sum_{n \geq 1} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ et $\sum_{n \geq 1} a_n$?

Obtenir une inégalité (avec des racines carrées) sur leurs sommes quand elles existent.

1.59 Centrale Maths1 PSI 2016 Antoine Badet II

Pour $n \geq 3$, on pose $P_n = X^n - nX + 1$.

a. Montrer que : $\forall n \geq 3, \exists! x_n \in]0; 1[, P_n(x_n) = 0$.

b. Trouver a_n de la forme $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$ (avec α à déterminer) tel que $x_n \underset{+\infty}{\sim} a_n$.

c. Trouver un développement asymptotique à deux termes de x_n .

1.60 Centrale Maths1 PSI 2016 Adrien Boudy

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive et décroissante. On suppose pour la première question que pour toute suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ qui tend vers 0, la série $\sum_{n \geq 0} u_n v_n$ converge.

a. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ , puis que $\ell = 0$.

On suppose maintenant que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

b. Montrer qu'il existe une suite d'entiers positifs $(N_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall i \in \mathbb{N}, \sum_{k=N_i}^{N_{i+1}-1} u_k \geq 1$.

c. En déduire qu'il existe $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante et tendant vers 0 telle que la série $\sum_{n \geq 0} u_n v_n$ diverge.

d. Conclure.

1.61 CCP PSI 2016 Alexis Iacono I

On définit les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ par $u_n = \frac{1}{3^n n!} \prod_{k=1}^n (3k-2)$ et $v_n = \frac{1}{n^{3/4}}$.

- a. Montrer qu'à partir d'un certain rang : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{v_{n+1}}{v_n}$.
- b. En déduire que $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

1.62 École Navale PSI 2016 Hugo Tarlé I

- a. Déterminer un équivalent de $u_n = \sum_{k=1}^n \ln^2(k)$.
- b. Nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{u_n}$.

1.63 Centrale Maths1 PSI 2017 Romain Delon

- a. Montrer que : $\forall n \geq 1, \exists ! a_n \in \mathbb{R}, e^{a_n} + n a_n = 2$.
- b. Quelle est la nature de $\sum_{n \geq 1} a_n$?
- c. Quelle est la nature de $\sum_{n \geq 1} (-1)^n a_n$?

1.64 Mines PSI 2017 Élio Garnaoui I

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $u_n = \operatorname{Arcsin} \left(\frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right) - \frac{\pi}{6}$ et $\alpha > 0$.

1.65 Mines PSI 2017 Claire Raulin I

Soit $\alpha > 0$, étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \sin \left(\frac{n\pi}{5} \right)$.

1.66 CCP PSI 2017 Tom Huix I

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, trouver une CNS sur P pour que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si $u_n = \sqrt[4]{n^4 + n^2} - \sqrt[3]{P(n)}$.

1.67 E3A PSI 2017 Joseph Dumoulin

Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $0 < u_0 < 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

- a. Calculer la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- b. Déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$. Indication : considérer $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$ (analogie avec $y' = -y^2$) et utiliser le théorème de CESARO (dont l'énoncé était rappelé).

1.68 ICNA PSI 2017 avec préparation Aloïs Blarre

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ continue et bijective telle que f^{-1} est continue et $\forall x \in [0; 1], f(2x - f(x)) = x$.

- a. Calculer $f(0)$ et $f(1)$. f est-elle croissante ou décroissante ?
- b. Soit $x_0 \in [0; 1]$ tel que $x_1 = f(x_0) \neq x_0$ et $(x_n)_{n \geq 0}$ telle que $x_{n+1} = f(x_n)$. Calculer $x_n - x_0$.
- c. En déduire f .

1.69 Petites Mines PSI 2017 Cléa Maricourt I

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 \ln(1+t^n) dt$.

- a. Calculer u_0 et u_1 .
- b. Montre que $\forall x \geq 0, \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.
- c. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.
- d. Donner la nature des séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$.

1.70 ENS Ulm/Cachan PSI 2018 Elio Garnaoui I

Soit un réel $\alpha > 0$, une fonction $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante, continue et telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. On pose,

pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, le réel $u_n = \int_{(n\pi)^{1/\alpha}}^{((n+1)\pi)^{1/\alpha}} x^{\alpha-1} f(x) \sin(x^\alpha) dx$.

- a. Montrer que la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- b. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- c. Montrer que $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} f(x) \sin(x^\alpha) dx$ converge.

1.71 Centrale Maths1 PSI 2018 Jean-Baptiste Malagnoux

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle positive et décroissante telle que $u_0 = 1$. On pose $\forall n \geq 1, p_n = u_{n-1} - u_n$.

- a. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour que $\sum_{n \geq 1} p_n$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1$.
- b. Sous quelle condition a-t-on l'équivalence : $(\sum_{n \geq 0} u_n \text{ converge}) \iff (\sum_{n \geq 1} n p_n \text{ converge})$.
- c. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , positive et décroissante. Quelle condition sur f nous donne l'équivalence suivante : $(f \text{ intégrable sur } \mathbb{R}_+) \iff (t \mapsto t f'(t) \text{ intégrable sur } \mathbb{R}_+) ?$

1.72 Centrale Maths1 PSI 2018 Paul Simon

Soit $t \in \mathbb{R}$.

- a. Déterminer la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t \ln(x))}{x} dx$.
- b. Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(t \ln(n))}{n}$.

Question de cours : énoncer le théorème de comparaison série-intégrale.

1.73 Mines PSI 2018 Elisabeth Carreau-Gaschereau I

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \int_0^x (\pi |\sin(t)| - 2) dt$.

- a. Montrer que F est bornée sur $\mathbb{R}$.
- b. Montrer la convergence de $(u_n)_{n \geq 1}$ si on pose $u_n = \int_{n\pi}^{+\infty} \frac{\pi |\sin(t)| - 2}{t} dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- c. Montrer la convergence de $\sum_{n \geq 0} u_n$.

1.74 Mines PSI 2018 Amélie Guyot II

Nature de la série de terme général $u_n = (\sqrt{n^2 + an + 2} - \sqrt{n^2 + bn + 1})^n$ selon les valeurs des réels a et b .

1.75 Mines PSI 2018 Sonia-Laure Hadj-Sassi I

a. Étudier la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = e^{u_n} - 1$.

Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \ln(e^{v_n} - v_n)$.

b. Montrer la convergence de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, de $\sum_{n \geq 0} v_n$. Déterminer la valeur exacte de $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

1.76 Mines PSI 2018 Antoine Secher II

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $u_n = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{n}\right) - \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Étudier les convergences des séries numériques $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} (-1)^n u_n$.

1.77 Petites Mines PSI 2018 Marie-Jeanne Paul II

Soit un réel $a > 0$. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 0} (\operatorname{Arctan}(n+a) - \operatorname{Arctan}(n))$?

1.78 ENS Cachan PSI 2019 Louis Destarac

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive et $\alpha > 1$ tels que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n - u_{n+1}}{u_n^\alpha} = \ell > 0$.

On cherche à montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si et seulement si $\alpha < 2$.

a. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante à partir d'un certain rang N .

b. Si $\alpha < 2$, montrer que $\forall n \geq N$, $\frac{u_n - u_{n+1}}{u_n^{\alpha-1}} \leq \int_{u_{n+1}}^{u_n} \frac{1}{t^{\alpha-1}} dt$.

En déduire que $\sum_{n \geq 0} \frac{u_n - u_{n+1}}{u_n^{\alpha-1}}$ converge ; puis que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

c. Si $\alpha \geq 2$, montrer que $\sum_{n \geq 0} \frac{u_n - u_{n+1}}{u_{n+1}^{\alpha-1}}$ diverge ; puis que $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

1.79 ENS Cachan PSI 2019 Mathis Girard

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive et décroissante tendant vers 0 telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$

et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} - u_{n+1} \geq u_{n+1} - u_n$. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k u_k$.

a. Montrer que $(|R_n|)_{n \geq -1}$ est monotone (R_{-1} est la somme de la série).

b. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{2} \leq |R_n| \leq \frac{u_n}{2}$.

c. Déterminer un équivalent de R_n .

d. Déterminer un équivalent de $\sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \frac{\ln(k)}{k}$.

1.80 ENS Cachan PSI 2019 Thomas Méot

Soit Φ une fonction continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$.

On suppose que $\forall k \geq 0, \exists (a_0, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^{k+1}, \Phi(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_k}{x^k} + \frac{\varepsilon_k(x)}{x^k}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_k(x) = 0$.

- a. À quelles conditions $\sum_{n \geq 1} \Phi(n)$ converge-t-elle ?
- b. À quelles conditions $\prod_{n \geq 1} \Phi(n)$ converge-t-il ?
- c. À quelles conditions $\sum_{n \geq 1} \prod_{i=0}^n \Phi(i)$ converge-t-elle ?
- d. Pour quelles valeurs de α la série $\sum_{n \geq 1} \prod_{k=1}^n (2 - e^{\frac{\alpha}{k}})$ converge-t-elle ?

1.81 Mines PSI 2019 Paul Louzier II

Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \sqrt{\frac{x_n + 1}{2}}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 - x_n$.

- a. Étudier la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- b. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$.

1.82 Mines PSI 2019 Léo Simplet II

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement supérieurs à -1 . On pose, pour $n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n}{\prod_{k=0}^n (1 + u_k)}$.

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 0} v_n$.

1.83 CCP PSI 2019 Thomas Crété I

- a. Montrer l'existence, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, du réel $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$.
- b. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)!R_n = 1$.
- c. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 0} \sin(2\pi en!)$?

1.84 Centrale Maths1 PSI 2021 Mathilde Arnaud

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $f(x) = xe^x$.

- a. Tracer le graphe de f . Montrer que f est bijective. Tracer le graphe de f^{-1} .

Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$, on définit la suite $(u_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}(a)e^{u_{n+1}(a)} = u_n(a)$.

- b. Étudier la convergence de la suite $(u_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$.
- c. Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 0} u_n(a)$.

Question de cours : Rappeler la formule de TAYLOR reste intégral.

1.85 Mines PSI 2021 Robin Gondeau I

On admet que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$ où γ est une constante réelle.

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$ et, pour tout entier $n \geq 1$, $u_{n+1} = \frac{2n+2}{2n+5} u_n$.

a. Montrer qu'il existe une suite convergente $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\ln(u_n) = -\frac{3}{2} \ln(n) + w_n$.

b. En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$.

c. Montrer que $\forall n \geq 0$, $2 \sum_{k=1}^{n+1} k u_k + 3 \sum_{k=1}^{n+1} u_k = 2 \sum_{k=0}^n k u_k + 2 \sum_{k=0}^n u_k$.

d. En déduire la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

1.86 Mines PSI 2021 Yuan Le Guennic III

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{2\}$, étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 0} e^{\frac{nz}{z-2}}$ selon la valeur de z .

1.87 Mines PSI 2021 Guillaume Touly III

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels positifs telle que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, que dire de la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{u_n}{n^\alpha}$?

1.88 CCINP PSI 2021 Maëva Berland I

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle positive. On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 \in \mathbb{R}_+$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} (u_n + \sqrt{u_n^2 + a_n^2})$.

a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq \frac{a_n}{2}$.

b. En déduire que la convergence de $\sum_{n \geq 0} a_n$ implique la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

c. La réciproque est-elle vraie ? Indication : on pourra considérer $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_n = \frac{n}{n+1}$.

1.89 CCINP PSI 2021 Alexandre Marque et Adèle Robert II

Déterminer la nature des séries suivantes :

a. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

b. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \int_0^n e^{-t^2 n^2} dt$.

1.90 Mines PSI 2022 Margaux Millaret II

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{n^{\frac{n+1}{2}}}{n! e^n}$.

a. Montrer que $\sum_{n \geq 1} \ln \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right)$ converge.

b. En déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que $n! \underset{+\infty}{\sim} C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$.

c. Donner sans preuve la valeur de C . Puis le prouver avec les intégrales de WALLIS.

1.91 CCINP PSI 2022 Amandine Darrigade et Thomas Lanne I

Soit les trois suites réelles $(u_n)_{n \geq 1}$, $(v_n)_{n \geq 1}$, $(w_n)_{n \geq 1}$ et $(x_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{n} u_n, \quad w_n = \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}} \quad \text{et} \quad x_n = (-1)^n w_n.$$

a. Justifier que $(u_n)_{n \geq 1}$ est bien définie et qu'elle tend vers 0.

b. Justifier que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge.

c. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} w_n$?

d. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} x_n$?

1.92 CCINP PSI 2022 Louis Lacarrieu II

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels positifs et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \frac{a_n}{(1+a_1) \times \cdots \times (1+a_n)}$.

a. Calculer $u_1 + u_2$. Généraliser.

b. Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

c. Dans cette question, on suppose que $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

1.93 Mines-Télécom PSI 2022 Jade Mirassou II

Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit, en cas d'existence, $u_k = \int_0^{\pi/4} (\tan(x))^k dx$.

a. Étudier la monotonie de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

b. Déterminer la limite de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

c. Donner une expression simple de $u_k + u_{k+2}$ pour tout entier $k \in \mathbb{N}$.

d. Calculer u_0 et u_1 . En déduire des expressions de u_{2n} et u_{2n+1} sous forme de somme.

e. En déduire la convergence et la valeur de la somme de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

1.94 ENS Cachan PSI 2023 Raphaël Dénier

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $u_n > 0$, $v_n > 0$.

Pour tout entier $n \geq N$, on pose $w_n = v_n - \frac{v_{n+1}u_{n+1}}{u_n}$.

a. On suppose que $\exists c \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall n \geq N$, $w_n \geq c$ et que $\sum_{n \geq N} \frac{1}{v_n}$ converge, montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

b. On suppose que $\forall n \geq N$, $w_n \leq 0$ et que $\sum_{n \geq N} \frac{1}{v_n}$ diverge, montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

c. On suppose que $\exists c \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall n \geq N$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 - \frac{1+c}{n}$, montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

d. On suppose que $\forall n \geq N$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 - \frac{1}{n}$, montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

e. Soit $A \in \mathbb{R}$, $s > 1$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée tels que $\forall n \geq N$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{A}{n} + \frac{f(s)}{n^s}$. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si et seulement si $A > 1$.

f. Pour quels $\alpha > 0$ la série $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} \right)^\alpha$ converge ?

1.95 Centrale Maths1 PSI 2023 Maddie Bisch

- a. Existe-t-il une suite géométrique $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $g_{n+1} - g_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{g_n}}$?
- b. Existe-t-il $(A, \alpha) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ tel qu'en posant $v_n = An^\alpha$, on ait $v_{n+1} - v_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{v_n}}$?
- Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{\sqrt{u_n}}$.
- Soit $\beta > 0$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, le réel $p_n = \left(\frac{1}{u_n}\right)^\beta - \left(\frac{1}{u_{n+1}}\right)^\beta$.
- c. Montrer que $\sum_{n \geq 0} p_n$ est une série convergente à termes positifs telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$.
- d. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt{n} \leq u_n \leq 2n$.
- e. Trouver un réel m tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1}^m - u_n^m) = \lambda \neq 0 \in \mathbb{R}$. En déduire avec CESARO que $u_n \underset{+\infty}{\sim} \left(\frac{3}{2}\right)^{2/3} n^{2/3}$.
- f. Déterminer les valeurs de $\beta > 0$ pour lesquelles $\sum_{n \geq 0} p_n u_n$ est convergente.

1.96 Mines PSI 2023 Tom Graciet II

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

- a. Déterminer le développement asymptotique de H_n à la précision $o(1)$.
- b. En déduire la limite de $(H_{2n} - H_n)_{n \geq 1}$.
- c. Retrouver la limite de $(H_{2n} - H_n)_{n \geq 1}$ avec une somme de RIEMANN.
- d. Grâce au développement de H_n , calculer $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(2n-1)}$ et $S_3 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^2}$.

1.97 CCINP PSI 2023 Armand Dépée I

Soit les trois suites réelles $(u_n)_{n \geq 1}$, $(v_n)_{n \geq 1}$, $(w_n)_{n \geq 1}$ et $(x_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{n} u_n, \quad w_n = \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}} \quad \text{et} \quad x_n = (-1)^n w_n.$$

- a. Justifier que $(u_n)_{n \geq 1}$ est bien définie et qu'elle tend vers 0.
- b. Justifier que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge.
- c. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} w_n$?
- d. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} x_n$?

1.98 Mines PSI 2024 Amélia Arangoits I

Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $x_1 \in \mathbb{R}_+^*$ et $\forall n \geq 1$, $x_{n+1} = x_n + \frac{n}{x_n}$.

- a. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ est bien définie et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.
- b. Montrer que $\forall n \geq 2$, $x_n \geq n$. En déduire que $x_n \underset{+\infty}{\sim} n$.
- c. Montrer qu'il existe un réel c tel que $x_n \underset{+\infty}{=} n + c + o(1)$.
- d. Montrer que $c = 0$.

1.99 Mines PSI 2024 Guilhem Thébault II

Soit $r \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$ et $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$, on pose alors $x(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n r^n$.

Montrer que l'application x ainsi construite est injective.

1.100 CCINP PSI 2024 Martin Mayot II

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$.

- a. Étudier la convergence et la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- b. Étudier la convergence de $\sum_{n \geq 0} u_n^3$. Indication : considérer $u_{n+1} - u_n$.
- c. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n^2$ diverge. Indication : considérer $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$.
- d. Déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$ grâce au théorème de CESARO (question rajoutée).
Indication : considérer $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$.

1.101 Mines-Télécom PSI 2024 Tom Sanchez I

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'équation $(E_n) : x^n + x\sqrt{n} - 1 = 0$.

- a. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, (E_n) admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$ qu'on notera x_n .
- b. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ converge vers 0.
- c. Quelle est la nature de $\sum_{n \geq 1} x_n$?

1.8 Officiel de la Taupe

1.102 *OdIT 2012/2013 Centrale PSI planche 128 I*

Démontrer le critère de condensation de CAUCHY : si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle, positive et décroissante, alors $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge si et seulement si $\sum_{n \geq 0} 2^n a_{2^n}$ converge.

En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{\sqrt{n(\ln n)^2}}$. Retrouvez ce résultat sans utiliser ce critère.

Mêmes questions pour la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n(\ln n)(\ln(\ln n))}$.

1.103 *OdIT 2012/2013 CCP PSI planche 212 I et CCP PSI planche 277 I*

- Montrer que l'équation $x^n + \sqrt{n}x - 1 = 0$ possède une unique solution $x_n \in [0; 1]$.
- Étudier la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et montrer qu'elle converge vers 0.
- Trouver un équivalent de x_n et étudier la convergence de $\sum_{n \geq 0} x_n$.

1.104 *OdIT 2013/2014 Mines PSI planche 193 II*

Convergence de la série de terme général $u_n = \text{Argch}(n) - \text{Argsh}(n)$.

1.105 *OdIT 2014/2015 Mines PSI planche 170 I* On donne $a_0 > 0$.

- Étudier la convergence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $a_{n+1} = 1 - e^{-a_n}$.
- Nature des séries de terme général $(-1)^n a_n$ et a_n^2 .
- Nature de $\sum_{n \geq 0} a_n$ (on pourra étudier $\sum_{n \geq 0} \ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$).

1.106 *OdIT 2014/2015 CCP PSI planche 274 II*

On dispose d'un alphabet de n lettres avec $n \geq 1$.

On note M_n le nombre de mots contenant au plus une fois la même lettre. Montrer que $M_n = \lfloor n!e \rfloor$.

1.107 *OdIT 2014/2015 CCP PSI planche 292 I*

- Déterminer un polynôme P de degré 3 tel que $\sigma_n = \sum_{k=1}^n k^2 = P(n)$.
- On pose $a_n = \frac{1}{\sigma_n}$, montrer que $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.
- On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n} - H_n) = \ln(2)$.
- En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

1.108 *OdIT 2014/2015 ENTPE-EIVP PSI planche 323 I*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = \frac{\cos(n)}{n}$ et $b_n = \frac{\sin(n)}{n}$ et on suppose que $\sum_{n \geq 1} b_n$ est absolument convergente.

- Donner une relation entre $\sin(n-1)$ et $\cos(n)$ et en déduire que $\sum_{n \geq 1} a_n$ est convergente.
- Montrer que $|\cos(n)| + |\sin(n)| \geq 1$. Que conclure ?

1.109 *OdIT 2015/2016 X-Cachan PSI planche 44*

Soit Φ continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, telle que $\forall k \geq 0, \Phi(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_k}{x^k} + \frac{\varepsilon_k(x)}{x^k}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_k(x) = 0$.

À quelles conditions sur les $a_i, \sum_{n \geq 1} \Phi(n)$ converge-t-elle ?

À quelles conditions sur les $a_i, \prod_{n \geq 1} \Phi(n)$ converge-t-il ?

À quelles conditions sur les $a_i, \sum_{n \geq 1} \prod_{i=0}^n \Phi(i)$ converge-t-elle ?

Pour quelles valeurs de $\alpha, \sum_{n \geq 1} \prod_{i=1}^n \left(2 - e^{\frac{\alpha}{i}}\right)$ converge-t-elle ?

1.110 *OdIT 2015/2016 Mines PSI planche 116I*

On définit une suite (u_n) par $u_1 > 0$ et $u_{n+1} = f_n(u_n)$ avec $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}$.

Si elle existe, déterminer la limite de (u_n) .

Montrer que $\forall n \geq 2, u_n \leq \frac{1}{n}$. Montrer que (nu_n) est croissante et trouver un équivalent de u_n .

1.111 *OdIT 2015/2016 Mines PSI planche 121I* Calculer $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$.

1.112 *OdIT 2015/2016 CCP PSI planche 233II*

On rappelle que la série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge et que sa somme vaut $-\ln(2)$.

Montrer qu'il existe a, b, c réels tels que $\frac{1}{4x^3 - x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{2x - 1} + \frac{c}{2x + 1}$.

Montrer que $\sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right)$ et $\sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k}\right)$ convergent et calculer leurs sommes.

Montrer que $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{4k^3 - k}$ converge et calculer sa somme. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{4x^3 - x}$ converge-t-elle ? Si oui, la calculer.

1.113 *OdIT 2015/2016 ENSEA planche 282I*

Montrer que $P_n(x) = \left(\sum_{k=1}^n x^k\right) - 1$ admet une unique racine $x_n \geq 0$ et étudier la suite (x_n) .

1.114 *OdIT 2015/2016 Télécom SudParis planche 284II*

Soit une suite de terme général $u_n > 0$ vérifiant $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ quand n tend vers $+\infty$ avec $\lambda > 1$.

Montrer que $\sum u_n$ converge (on pourra faire un développement limité à l'ordre 1 de $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ où $v_n = \frac{1}{n^\alpha}$).

1.115 *OdIT 2016/2017 Mines PSI planche 118II*

Convergence de la série de terme général $u_n = \int_0^1 \cos(nt^2) dt$.

1.116 *OdIT 2016/2017 Mines PSI planche 121I abordable dès la 1^{ère} année*

Par une comparaison série-intégrale, trouver un équivalent de $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln(k)}{k}$, défini pour $n \geq 2$.

Étudier la monotonie et la convergence de la suite de terme général $v_n = u_n - \frac{1}{2} \ln^2(n)$.

On admet que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$; montrer que $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k \ln(k)}{k} = \ln(2) \left(\gamma - \frac{\ln(2)}{2}\right)$.

1.117 OdIT 2016/2017 Centrale PSI planche 165 abordable dès la 1^{ère} année

On définit une suite de réels $(x_n)_{n \geq 0}$ par $x_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}$ (1).

Donner la nature de $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{x_n}$. Quel lien y a-t-il entre x_{n+1} et $\sum_{k=0}^n \frac{1}{x_k}$? Trouver un équivalent de x_n .

1.118 OdIT 2016/2017 CCP PSI planche 206I

Montrer que la suite de terme général u_n , donné par $u_0 \in [0; \pi]$ et $u_{n+1} = 1 - \cos(u_n)$, converge vers 0. Déterminer la nature de la série de terme général u_n .

1.119 OdIT 2016/2017 CCP PSI planche 214II

Soit, pour $\alpha > 1$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ et $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. Montrer que $R_n \sim_{+\infty} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ au voisinage de $+\infty$.

Étudier la convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{R_n}{S_n}$ suivant la valeur de α .

1.120 OdIT 2016/2017 CCP PSI planche 219I et OdIT 2015/2016 CCP PSI planche 235I

Montrer que la série de terme général $u_n = \ln(2n + (-1)^n) - \ln(2n)$ converge mais pas absolument.

1.121 OdIT 2016/2017 ENSEA PSI planche 250II abordable dès la 1^{ère} année

Convergence de $\sum_{n \geq 1} ((n + (-1)^n)^\alpha - n^\alpha)$ pour $\alpha \in]0; 1[$.

1.122 OdIT 2017/2018 Mines PSI planche 116I

Convergence et somme de $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{(1+2i)^n}$.

1.123 OdIT 2017/2018 CCP PSI planche 207I, abordable dès la première année

Donner un équivalent de $u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ quand n tend vers $+\infty$.

1.124 OdIT 2017/2018 CCP PSI planche 208II

Convergence de $\sum_{n \geq 2} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$ pour $\alpha > 0$.

1.125 Compléments OdIT 2017/2018 Mines PSI planche 175III

Nature de $\sum_{n \geq 0} a^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}$ pour $a \in \mathbb{R}_+^*$.

1.126 Compléments OdIT 2017/2018 CCP PSI planche 452I et 453I

On note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $a_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^2}$, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n+1} - H_n) = \ln 2$ et que $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.

Déterminer a, b, c réels tels que $a_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{2n+1}$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

1.127 Compléments OdIT 2017/2018 ENSEA PSI planche 581I

Convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)|^x dx$. Montrer que $\forall t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \sin t \geq \frac{2}{\pi}t$.

Nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$. Nature de $\int_1^{+\infty} |\sin(x)|^x dx$.

1.128 *OdIT 2018/2019 Mines PSI planche 115II et compléments Centrale PSI planche 169*

- a. Trouver un équivalent de $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k}$ quand n tend vers $+\infty$.
- b. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \underset{+\infty}{=} \frac{1}{2}(\ln n)^2 + c + o(1)$.
- c. Montrer que $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \frac{\ln k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{\ln 2}{k} - \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\ln k}{k}$.
- d. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ (utiliser un développement asymptotique de la série harmonique).

1.129 *Compléments OdIT 2018/2019 ENTPE PSI planche 430I*

- a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) = xe^x - n$ admet un unique zéro u_n strictement positif.
- b. Montrer que $\forall n \geq 3$, $1 \leq u_n \leq \ln n$. Puis que $u_n \underset{+\infty}{\sim} \ln n$ quand n tend vers $+\infty$.
- c. Trouver un équivalent de $u_n - \ln n$.

1.130 *Compléments OdIT 2018/2019 IMT PSI planche 442II*

Nature de la série de terme général $u_n = (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n + (-1)^n}\right)$.